



NOUVEAU TRAITÉ
DES MALADIES
DES YEUX.

OÙ L'ON EXPOSE LEUR
Structure, leur Usage, les Causes de leurs
Maladies, leurs Symptômes, les Remè-
des & les Opérations de Chirurgie qui con-
viennent le plus à leur guérison.

A V E C

DE NOUVELLES DECOUVERTES
Sur la Structure de l'Oeil, qui prou-
vent l'Organe immédiat de la Vue.

Par MR. DE SAINT-YVES,

Chirurgien Oculiste de Saint Côme.

NOUVELLE ÉDITION.

Augmentée de l'Histoire d'un Remède
pour les maux des Yeux, & contre la
morsure du chien enragé. *De Hart Loeve*

Traduit de l'Anglois par M. CANTWEL.

Par L^{re} Hieronymi Glasz et D. en Prof Med.
1792.



A AMSTERDAM ET A LEIPZIK,
Chez ARKSTÉE & MERKUS.

M. DCC. LXVII.

NOTES

ON THE

THEORY OF

THE

THEORY OF

THEORY OF

THEORY OF

THEORY OF

THEORY OF

THEORY OF

THEORY OF

THEORY OF

THEORY OF

THEORY OF

THEORY OF

THEORY OF

THEORY OF

THEORY OF

THEORY OF

THEORY OF

THEORY OF

THEORY OF

THEORY OF

THEORY OF

THEORY OF

THEORY OF

THEORY OF

THEORY OF



A SON ALTESSE
SÉRÉNISSIME
MONSEIGNEUR
LE DUC.



MONSEIGNEUR,

*Le Nom illustre de VOTRE AL-
TESSE SÉRÉNISSIME est si res-
pectable , que je n'oserois le mettre à
la tête de cet Ouvrage , sans la sup-
plier de m'en accorder la permission.
La confiance dont Elle a bien voulu*

*m'honorer , autorise la liberté que
je prens de le lui consacrer. Ce se-
ra beaucoup pour moi , MONSEI-
GNEUR que VOTRE ALTESSE
SÉRÉNISSIME veuille accepter ce
foible hommage de ma vive reconnois-
sance. S'il est infiniment au - dessous
de la dignité de VOTRE AL-
TESSE SÉRÉNISSIME , il
est du moins la marque du profond
respect avec lequel j'ai l'honneur d'être ,*

MONSEIGNEUR ,

DE VOTRE ALT. SÉRÉNISSIME ,

**Le très-humble & très-obéissant
Serviteur ,**

DE SAINT-YVES.



P R E F A C E.

LE Corps humain est composé d'un si grand nombre de parties , disposées avec tant de sagesse , que l'on ne sauroit assez adorer la main savante de son Auteur , qui a donné à l'Homme les Organes des Sens , pour que l'Âme distingue par leur moyen dans les Objets qui l'environnent , ce qui peut lui être contraire ou favorable. De tous les sens si nécessaires à la conservation de l'Homme , , la Vue est celui dont il semble avoir un plus indispensable besoin ; & sans entrer ici dans un trop long détail sur ses avantages , on n'a qu'à considérer le triste état de ceux qui en sont privés , & les cruelles inquiétudes que donnent les moindres indispositions de son Organe. C'est ce qui m'a porté à choisir

dans la vaste étendue de la Chirurgie , cette partie qui m'a paru jusqu'à présent peu approfondie , mais digne de toute l'attention d'un Homme laborieux & appliqué ; & je me suis fixé à la connoissance particulière de l'Oeil & de ses Maladies. L'examen exact que j'ai fait de ses parties & de leurs usages , m'a donné lieu de quitter des opinions que j'avois ci-devant adoptées comme les autres Phisiciens , & de travailler à lever les doutes qui ont paru jusqu'à present sur l'Organe immédiat de la Vue , aussi-bien que sur les différentes natures des Cataractes qui n'ont pas été assez expliquées par les Auteurs , qui d'ailleurs pouvoient manquer de connoissance , faute d'expérience & de réflexion. Je dirai de plus , qu'il y a des Pesonnes qui ont tellement négligé cette partie de la Chirurgie , qu'ils ont regardé & même traité comme Charlatans ceux qui en font leurs principales occu-

pations. Cependant cet Art a des règles & aussi difficiles à apprendre qu'aucune des autres parties de la Chirurgie , comme j'espère le faire voir dans ce Traité ; car à considérer le grand nombre des Maladies qui attaquent l'Oeil , & celui des Opérations délicates que leur guérison exigent , il semble qu'à cause de la difficulté de cette Science , c'est peu faire que de s'y appliquer entièrement.

Le désir d'être universel dans un Art , qui autant de parties qu'en a la Chirurgie , est très louable ; mais s'il est vrai de dire , comme on n'en sauroit douter , que chacun de ses parties soit d'une très-grande étendue ; on doit convenir qu'il est presque impossible d'y exceller également. C'est aussi ce qui a obligé plusieurs de s'attacher uniquement à une des parties de la Chirurgie. En effet il n'est pas étonnant que l'expérience souvent réitérée , de quantité de Faits particuliers , qui

ont passé par les mains de ceux qui ne s'attachent qu'à une partie singulière de la Chirurgie, leur ait donné des connoissances plus étendues qu'aux autres; mais que l'on soit universel dans quelque Art, ou que l'on n'en traite qu'une seule partie, lorsque chacun dans son genre contribue au bien général, & qu'il fait part au Public de ce qu'il fait lui pouvoir être utile, il ne s'acquitte pas moins de ce qu'il doit à la Société, & le Public ne doit pas moins lui en être redevable.

Je n'ignore pas à quel danger on s'expose, en donnant un Livre au Public; je fais ce que l'on doit craindre de cette espèce d'Hommes, qui incapables de rien produire, se font un mérite de trouver des fautes dans l'Ouvrage d'autrui, aussi-bien que de ceux qui honteux d'avoir passé toute leur vie dans des idées fausses, ne peuvent se résoudre à convenir qu'ils se sont trom-

pés , qui conduits par leur amour propre , ne connoissent d'autres ressources que de tenter les moyens d'obscurcir les Vérités qu'ils n'ont pu découvrir. Mais je fais aussi que parmi ces excellens Maîtres , auxquels la Chirurgie est redevable de la perfection où elle a été portée, il s'en trouve plusieurs dont la droiture & l'équité égalant les lumieres, cherchent la Vérité & la respectent par tout où ils la rencontrent.

Ainsi le désir de remplir autant qu'il m'est possible , ce que chacun doit à la Société , me détermine à suivre l'exemple de tant de bons Auteurs , qui peut-être auroient privé le Public de plusieurs Ouvrages très-utiles , s'ils avoient écouté leurs répugnances ; & j'espère qu'en lui donnant de bonne foi & sans art , ce qui m'a paru vrai , il m'excusera sans peine sur tout ce qui feroit à désirer dans cet Ouvrage , dans lequel je lui fais part des connoissances que j'ai

acquises par mon travail, qui pourront servir de moyens aux autres, pour en acquérir encore de plus grandes, & précautionner le Public contre le danger auquel les Malades s'exposent, en se servant de Remedes donnés au hazard, & souvent même par gens aussi ignorans de la structure de l'Oeil & de ses Maladies, que de la Vertu des Remedes qu'ils distribuent avec tant d'affurance.

Pour donner une forme convenable à ce Traité, je l'ai divisé en deux Livres; dont le premier est précédé d'une Description des Parties de l'Oeil, de leurs Usages & des Regles particulieres pour connoître les Principes de la Science dont j'écris, qui consistent dans la connoissance de l'état & des différentes altérations de la Vue; après quoi je commence d'abord par les Maladies des parties externes de l'Oeil. De plus je donne une Méthode de faire l'Opération de la Fistule lacrimale,

par laquelle on évite presque toujours le Larmoyement. Je donne aussi la maniere de guérir plusieurs Maladies de l'Oeil , par l'application de la Pierre infernale , dont l'usage n'avoit pas été pratiqué avant moi dans ces occasions.

Le second Livre renferme les Maladies des différentes parties qui composent le Globe de l'Oeil ; on y trouvera un détail particulier des différentes espèces d'Ophthalmies , & un nouveau Siftême sur la maniere dont se forme la Cataracte. Je communique dans ce même Livre ma maniere d'operer pour la Cataracte , lorsqu'elle est placée dans la Chambre antérieure de l'Oeil. Outre cela, j'y traite de deux Maladies qui arrivent à la Retine , & qui jusqu'aujourd'hui n'avoient point passé pour avoir leur siége dans cette partie ; comme aussi de plusieurs espèces de Gouttes sereines , avec une Méthode générale de panser les Yeux.

Je ne parle que des Maladies que j'ai vues & traitées moi-même. Je passe aussi sous silence celles qui ne sont pas de grande conséquence. A l'égard des maladies qui ne se rencontrent que rarement & dans les cas singuliers , j'y ai joint des Observations de pratique , pour en donner plus de connoissance , & pour prévenir de pareils cas , s'ils venoient à se rencontrer.


J'ai tâché , autant que j'ai pu , de rendre ce Traité méthodique , & de m'expliquer d'un stile simple & intelligible , afin qu'il fût à la portée de tout le monde , mais principalement des jeunes Chirurgiens qui voudront s'y appliquer. Je n'ai même donné que des Remedes les plus simples & les plus aisés à composer ; & si je m'en suis réservé quelqu'un , ce n'est qu'en faveur de mon Eleve ; persuadé d'ailleurs , que la pratique pourra faire découvrir à ceux qui voudront s'y appliquer entie-

P R E F A C E. xiiij

rement , ce que l'Art a de plus caché. Ainsi j'espere que ceux qui seront curieux de conserver leur Vue autant qu'il est possible , trouveront aussi dans ce Traité les moyens non seulement d'empêcher qu'elle ne s'altère , mais encore de la conserver dans sa plus grande vigueur , & de la rétablir lorsqu'elle souffrira quelque diminution.

Je recevrai avec plaisir les Objections que le Public voudra me faire sur ce Traité. Je lui en rendrai compte , & je tâcherai de lui donner toute la satisfaction possible dans un autre Ouvrage particulier.





AVERTISSEMENT.


Sur cette nouvelle Edition.

LA première Edition de cet excellent Traité a été publié à Paris en 1722. Le Public a eu le tems de porter son jugement sur cet Ouvrage, & il en a reconnu tout le mérite. On n'a fait que rendre justice à son Auteur mort à Paris le troisiéme d'Août 1731. C'est un préjugé en faveur de cet habile Chirurgien, de n'avoir publié ses belles découvertes, qu'après trente années d'expériences. Sans entrer dans un détail ennuyeux de ce que d'autres avoient écrit avant lui sur la matiere qu'il traite, il se contente de rapporter ses propres Observations, & ne parle guerre que des cas dont il a été lui-même témoin. Il

étoit trop sincere & trop honnête homme pour en imposer à ses Lecteurs , & en même tems trop grand ennemi des Charlatans pour se faire valoir par des promesses trompeuses. Il reconnoît de bonne foi qu'il y a plusieurs Maladies dont on ne doit jamais entreprendre la guérison , parce qu'elles ne cèdent en effet à aucun remède. Il blâme hautement la conduite de certains Chirurgiens que l'amour du gain porte à tout entreprendre. Un Auteur du caractère de Monsieur de Saint-Yves , consommé comme il l'étoit dans la pratique des Opérations de Chirurgie , ne pouvoit donner au Public un excellent Ouvrage. Comme ce Traité étoit devenu rare , & que d'ailleurs il étoit recherché avec empressement , on a cru qu'une nouvelle Edition ne manqueroit pas d'être bien reçue de tous les Medecins & des Chirurgiens. La première étoit remplie d'un nombre prodigieux de fautes , & même de fautes considérables. On en avoit donné la liste ,

xvj AVERTISSEMENT.

*mais une liste incomplete. On a eu
soin , dans cette derniere Edition ,
de corriger toutes ces fautes , &
un grand nombre d'autres qui n'a-
voient pas été marquées. Le Public
jugera par-là si cette Edition doit
l'emporter sur la précédente.*





REPONSE

*De Mr. DE SAINT-YVES,
à une Lettre Critique de son
Traité des Maladies des Yeux ,
inserée dans le Supplément du
Mercure du Mois de Mai 1722 ,
sous le nom de Mr. Mauchard ,
& pour servir d'Addition à son
Traité des Maladies des Yeux.*

L'Auteur de la Lettre Critique
mise dans le Mercure du Mois
de May 1722 , page 105 , au
sujet du nouveau Traité des
Maladies des Yeux , que j'ai donné au
Public , a été en premier lieu Disciple
de Mr. Heister , Professeur en Anato-
mie à Helmstadt , & ensuite Eleve de
Mr. de Woolhouse , lequel en voulant
critiquer mon Livre , prétend établir
une espèce de Cataracte par l'altération
de l'Humeur Aqueuse ; mais j'ai assez
démonstré en parlant des différentes na-

tures des Cataractes , l'erreur & la fausseté de cette opinion.

La chose la plus surprenante , est qu'il commence sa Critique en avançant une fausseté qui saute aux yeux de tout le monde : savoir , que j'avoue dans ma Préface que j'aurois été plus heureux dans mes Ecrits & dans mes Recherches , si je n'avois pas commencé à m'y appliquer si tard & dans un âge si avancé. Que pensera le Lecteur d'un Critique devenu interpolateur dans l'année de l'impression d'un Livre , & du vivant de son Auteur : sinon qu'il n'a avancé cette fausseté , que pour me faire paroître aussi vieux que son dernier Maître , ne sachant pas que j'ai commencé l'exercice de la Chirurgie à l'âge de dix-sept ans , & qu'à vingt-deux ans je me suis appliqué à la connoissance des Maladies des Yeux & à leur guérison ; & qu'il y a à présent trente ans que j'exerce cette Profession à Paris ? Il pourra connoître par cette vérité , si j'ai commencé , comme il le marque , dans un âge trop avancé. Je passe sous silence plusieurs faux rapports qui se trouvent dans sa Lettre & dont on peut juger par ce que je viens de dire , & en les confrontant avec mon Livre même.

Ce Livre fait assez connoître la mau-

vaïse intention de l'Auteur de la Critique ; parce qu'il fait voir assez clairement la fausseté de son opinion prise de la lecture de beaucoup d'anciens Auteurs , & la vérité de la mienne fondée sur l'Anatomie , & sur le grand nombre de mes Expériences. C'est pourquoi je ne me suis point servi de citations d'Auteurs dans mon Livre ; parce que , ce que j'ai dit , part de source , étant uniquement mes Expériences depuis bien des années , que j'ai rédigées & mises dans mon Livre , afin d'ôter une Science si utile & si nécessaire au Public , d'entre les mains des Charlatans qui s'en sont de tout tems emparés.

Je ne prétends point en disant ceci , y comprendre plusieurs qui de nos jours ont excellé dans cette Science , & dont le mérite & l'habileté ont été reconnus & estimez avec justice de tout le monde.

Avant que de venir aux preuves qu'il n'y peut avoir de Cataractes par l'altération seule de l'Humeur Aqueuse , il faut répondre à deux Articles ; le premier , que l'Auteur de la Lettre dit que j'ai pris dans Mr. Brisseau qu'il n'y a point de chambre postérieure à l'Oeil pour contenir l'humeur aqueuse , mais il se trompe ; car j'avoue franchement que je n'y ai fait attention que l'hiver de l'an-

née 1721. Alors plusieurs Savans de l'Academie Royale des Sciences , après avoir fait gâler des Yeux en tout sens , ont reconnu qu'il n'y avoit presque point ou très-peu d'Humeur aqueuse dans la Chambre postérieure de l'Oeil , comme on le verra dans leurs Mémoires.

Le second Article est , que l'Auteur de la Lettre prend pour un mauvais pas où l'Opérateur s'engage , lorsque la pointe de l'aiguille se trouve piquée dans le Corps de la Cataracte ; & qu'a-près l'avoir détachée pour lui faire quitter l'Aiguille , l'on frappe d'un doigt sur la tempe , afin que l'ébranlement de l'Aiguille fasse quitter le corps dans lequel elle est piquée , pour pouvoir la placer dans le lieu où l'on doit , avant de retirer l'Aiguille de l'Oeil.

On voit bien qu'il a peu souvent exercé cette opération ; car s'il avoit abbattu depuis trente années soixante ou quatre-vingt Cataractes par an , comme il m'en a passé par les mains , il auroit sans doute remarqué que de cent il y en a toujours une ou deux où le cas arrive , si l'Opérateur les prend dans leur maturité ; ainsi de frapper avec le doigt sur la tempe , comme je l'ai marqué , c'est un moyen qui loin d'être dangereux , est unique ; car si en pareil cas , on retiroit l'Aiguille

de l'Oeil , ce corps ne la quitteroit qu'en la sortant , & faute d'avoir été placée en bas , il n'ageroit dans l'Humeur aqueuse , & par conséquent il pourroit se ratacher , ce qui rendroit l'opération infructueuse.

A l'égard de ce que j'ai dit , que l'Opérateur doit prendre garde aux différens mouvemens de l'Oeil des Malades pendant l'opération , je l'ai fait , non pas pour être tombé dans cet accident , mais pour en avertir ceux qui ne sont pas versés dans cette opération , & qui faute d'être attentifs aux mouvemens de l'Oeil pourroient blesser l'Iris & perdre l'Oeil du Malade , comme il est arrivé ici à Paris à de pauvres gens , que l'on sacrifie imprudemment & impunément aux premiers essais des Apprentifs de quelque mois ; c'est ce que je suis prêt à prouver , quand les Supérieurs attentifs au bien public me l'ordonneront.

Quand l'Auteur de la Lettre dit , que j'ai substituée à la place de la Cataracte membraneuse l'Empiême ou supuration intérieure de l'Oeil , il se trompe ; car j'ai fait remarquer dans mon Traité , que quand cette supuration de l'Oeil occupe toute la Choroïde , jusqu'au Nerve optique , alors l'Oeil s'atrophie & forme une espèce de Cataracte incurable accompa-

gnée du rétrécissement de la prunelle ,
comme on le peut voir à la page 257
de mon Livre.

Que si cette supuration n'attaque que
la partie antérieure de la Choroïde ,
nommée Iris , non seulement l'Oeil ne
s'atrophie point , mais il demeure dans
sa grosseur naturelle , & la matière de
l'engorgement & de l'obstruction des
veines & des artères de l'Iris , se tourne
en pus , qui fuit & s'épanche entre
le Cristallin & l'Iris , & forme une Ca-
taracte membraneuse , telle que je l'ai
décrite.

L'Auteur de la Lettre se trompe en-
core , en disant que l'inflammation de
la Choroïde , il y a une opération que
j'ignore , puisque j'ai marqué cette opé-
ration dans le Chapitre général de la
guérison de l'Ophthalmie page 149 , où
j'ai donné trois différentes manières de
faire son opération.

A l'égard des raisons qu'il n'y a point
de Cataracte par l'altération seule de
l'Humeur Aqueuse , il seroit inutile
de répondre à cette Critique , ayant mis
dans mon Traité des preuves assez con-
vaincantes qu'il ne se forme aucune Ca-
taracte par l'altération de sa seule Hu-
meur Aqueuse ; si l'Auteur de la Lettre
n'avoit pas apporté pour preuve , qu'il

se forme dans l'Oeil une Cataracte de cette nature , que l'on n'a point répondu aux différentes pièces de Mr. de Woolhouse contre Mrs. Brisseau & Antoine , & aux Expériences qu'il avance comme des preuves authentiques de son opinion , disant que ces différentes pièces ont été imprimées en plusieurs langues , ce qui fait qu'il s'est flatté d'avoir entraîné tous les Savans de l'Europe dans son parti ; pour faire connoître au Lecteur si le sentiment de Mr. Woolhouse a été capable d'entraîner tous les Savans dans son parti , il n'a qu'à examiner que cette Critique est fondée sur deux principes faux que son Auteur veut établir ; savoir , qu'il n'y a que deux Cataractes guérissables par l'opération , l'une qu'il appelle Glaucome , & l'autre Membraneuse. Cette dernière , selon lui , se forme par la seule altération de l'Humeur Aqueuse , autant que je le peux découvrir par ses écrits qui sont très-équivoques.

Par rapport au Glaucome , il faut remarquer premièrement , que les Anciens Auteurs ont pris pour la même maladie Glaucome & Cataracte , comme on peut voir dans Hippocrate même.

Secondement , que dans la suite des tems on a reconnu le Glaucome bien différent de la vraie Cataracte , d'autant

que le Glaucome est incurable par l'opération ; & si on l'a faite , ce n'a été que pour ôter la difformité , sans rendre la Vue.

Plusieurs Modernes ont été du sentiment que le Glaucome étoit une altération de l'Humeur Vitrée ; mais j'ai toujours remarqué , que l'opération dans ce cas , rend la transparence à l'Oeil sans donner la Vue , & sans qu'après l'opération il paroisse aucune marque d'opacité dans l'Humeur Vitrée.

C'est pourquoi j'ai établi cette maladie telle que je l'ai reconnue par mes Expériences , ayant donné le nom de Glaucome à une Cataracte Cristalline accompagnée & même précédée de Goute seréine , comme l'on peut voir page 205 de mon Traité.

Il faut donc conclure que l'Auteur de la Lettre se trompe , en disant que l'on rend la Vue par l'opération que l'on y peut faire , & qu'il confond la Cataracte & le Glaucome , comme ont fait les Anciens.

Examinons à présent la Cataracte membraneuse , laquelle selon lui est un corps ou membrane qui se forme par l'altération de la seule Humeur Aqueuse qu'il prétend être guérissable par l'opération , & dans ce cas rendre

dre la Vue après ladite opération.

Je réponds à cela , que s'il étoit possible qu'il se formât dans l'Oeil une Cataracte de cette nature , elle se formeroit plutôt dans la Chambre antérieure de l'Oeil , que dans la postérieure , où il n'y a point où très-peu d'Humeur Aqueuse.

Or , on ne remarque jamais de Cataracte naître dans la Chambre antérieure de l'Oeil ; il faut nécessairement tirer la conséquence , qu'il ne se forme jamais de Cataracte par l'altération seule de l'Humeur Aqueuse.

De plus , s'il étoit vrai , qu'il se formât une Cataracte par l'altération de l'Humeur Aqueuse , on ne pourroit l'abatre sans détruire le Cristallin , dont la forme lenticulaire s'abouche au trou de la Prunelle ; c'est ce que non seulement plusieurs Modernes ont observé , mais aussi l'illustre Abaquapendente , également habile en Anatomie & en Chirurgie , qui a fait lui-même plusieurs fois , il y a plus de cent ans , l'opération de la Cataracte ; lequel avoue la même chose dans son excellent Traité des Opérations Chirurgicales.

Quant aux preuves que l'Auteur de la Lettre Critique prétend tirer du silence de Mrs. Brisseau & Antoine , il doit savoir

que son premier Maître, Mr. Heister, y a répondu assez proluxement ; & quand Mr. de Woolhouse prétend faire croire au public que Mr. Heister s'est dédit, c'est une autre fausseté, car nonobstant qu'il a dit qu'il admettoit des Cataractes membraneuses, il ajoute qu'elles sont très-rares, & il ne convient pas qu'elles se forment par l'altération de l'humeur aqueuse.

Au reste l'Apologie de Mr. Heister, & son Traité suivant intitulé *Vindiciæ*, montre assez qu'il a répondu à toute la Critique de Mr. Woolhouse. J'y renvoye le Lecteur principalement au Traité *Vindiciæ*, qui est assez rare à Paris, puisque l'Auteur de la Lettre a osé le citer, pour prouver la retractation de l'Adversaire le plus obstiné. C'est ainsi que l'on instruit ce nouveau disciple à nommer son ancien Maître ; on y verra que Mr. Heister prouve par ses différens Traitez imprimez, & fait vivement sentir à Mr. de Woolhouse que son opinion est bien différente de celle de Mrs. Brisseau & Antoine disant que si Mr. de Woolhouse n'avoit pas compris cela, il auroit du moins dû manifestement le comprendre par la seconde Lettre de l'année 1715, imprimée dans son Apologie de 1717, & principalement de ces mots page 87.

que la maladie que les Anciens prenoient vulgairement pour Cataracte , consiste le plus souvent *plerumque* dans le Cristallin , & beaucoup plus fréquemment que dans une Membrane.

Quoique Mr. Heister fasse connoître par ce passage qu'il y a des Cataractes membraneuses , ce n'est pas à dire qu'il ait chanté la palinodie , comme le prétend Mr. de Woolhouse ; il faudroit pour cet effet qu'il eût reconnu le Glaucome guérissable par l'opération , comme le prétend Mr. de Woolhouse. Or , tous les écrits de Mr. Heister , contre Mr. de Woolhouse , ne tendent qu'à lui faire entendre que la Cataracte guérissable par l'opération , n'est pas un Glaucome , mais seulement une Cataracte par l'opacité du Cristallin , qui arrive beaucoup plus fréquemment que la Cataracte membraneuse , sans s'expliquer de la nature de cette Cataracte membraneuse , que Mr. de Woolhouse prétend se former par l'altération de l'humeur aqueuse. Or , ayant reconnu par mes expériences , que cette Cataracte étoit produite par une congestion de pus assemblé & épaissi en forme de membrane entre l'Iris & le Cristallin , telle que je l'ai décrite dans mon Livre ; il est vrai que je suis le premier qui aye découvert les Causes de la Cataracte

membraneuse & du Glaucome , telles que je les ai décrites ; & par ce moyen je prétends lever les difficultés & les contestations qui se sont rencontrées sur cette matière , comme je l'ai marqué dans ma Préface , tant par rapport à la confusion des Anciens , qu'à la dispute qui s'est élevée entre les Modernes depuis plus de quinze ans , puisque j'ai fait connoître par mon Livre les vraies Cataractes dans lesquelles l'opération réussit , de même que les fausses où l'opération ne réussit pas , aussi bien que celles qui sont douteuses , c'est-à-dire celles où l'opération apporte quelquefois la guérison , mais non pas toujours. Il faut donc que Mr. de Woolhouse rende raison & fasse connoître à tous les Savans de l'Europe , en quoi consiste l'altération de la seule Humeur Aqueuse , capable de former une membrane entre l'Iris & le Cristallin ; puisqu'il ne veut pas admettre sa formation par le pus , ou autre matière susceptible de coagulation épanchée dans cet endroit. Cependant depuis le tems qu'il pratique l'opération de la Cataracte , il doit avoir remarqué , quand on abbat une Cataracte purulente , le pus s'épanche derrière l'Iris , & trois semaines ou environ après la matière purulente se trouve épaisie en membrane. Cette espèce de

membrane a beaucoup de ressemblance avec la Cataracte membraneuse , que j'ai décrite dans mon Livre , en traitant des fausses Cataractes.

Il faut encore ajouter ici , que Mr. Antoine a répondu à la Critique que Mr. de Woolhouse avoit fait de son Livre ; mais sa Réponse n'a pas été imprimée , parce que feu Mr. Mery premier Chirurgien de l'Hôtel-Dieu de Paris , & Membre de l'Academie Royale des Sciences , à qui Mr. Antoine l'avoit envoyée pour la faire imprimer , ne l'a pas jugé à propos , par rapport aux termes trop durs contre Mr. de Woolhouse , qu'il jugeoit devoir n'être pas mis dans sa réponse d'une Critique : il est aisé de trouver cette Réponse dans ses papiers.

Pour moi , mes Observations & Expériences m'ont tellement convaincu de la fausseté de la prétendue Cataracte membraneuse , par l'altération de l'Humeur Aqueuse , que je suis tout prêt d'en faire les funérailles , comme Mrs. Drelin-court & Nuch , célèbres Professeurs dans l'Université de Leyde , ont fait à l'occasion de la Glande pinéale.

Examinons enfin les Expériences de Mr. de Woolhouse , rapportées dans la Lettre Critique ; de toutes ces Expériences , je prend celle qui paroît la plus

forte , savoir celle de l'Hopital de Mme. de Montespan , dont voici la Relation que l'Auteur de la Lettre critique en fait page 113.

Mr. de Woolhouse produisit un Fait & Expérience très authentique & bien circonstanciée , qui se trouve à la page 27 des ses *Dissertations Critiques* , touchant une Cataracte membraneuse qu'il avoit exprimée au nommé Gabriel Cocq , à l'Hôpital de Mme. de Montespan , près St. Germain en Laye. Le Malade mourut quelques années après à la Charité dudit lieu. La Cataracte étant remontée en partie , Mr. de Woolhouse cerna cet œil du Cadavre en présence de Mr. Conneftable , Medecin ordinaire du feu Roi Jacques d'Angleterre , & il l'ouvrit en présence de Mrs. le Chevaliers Walgrane , premier Medecin , Conneftable , & Wood Medecin en second , & on y trouva une petite membrane coriace , placée entre l'Iris & le ligament ciliaire ; l'Humeur cristalline étant bien saine & transparente , excepté une ternissure au milieu , causée par le frottement du corps étranger.

Je répondrai à ce Fait par le récit d'un autre très-sembable , que Mr. Morand le fils , Chirurgien Major de l'Hôtel Royal des Invalides , & Membre de l'Academie

Royale des Sciences, m'a communiqué en m'écrivant ainsi le 31 du mois de Mars 1721. Je fis l'Opération aux deux Yeux du nommé Jean-François Fraizard, Soldat & Invalide; le succès fut tel, que cet Homme distinguoit fort bien les objets qui se présentoient à lui; & qu'étant sorti de l'Infirmierie, il se conduisoit sans peine & sans secours de personne.

Ce même Soldat étant mort d'Hydropisie le 30 de Mars de la présente année 1722, j'ai voulu profiter d'une occasion si favorable pour examiner ce que j'avois abbatu avec mon aiguille, & je détachai les Yeux des fosses orbitaires.

Cela se trouva justement dans un tems de vacances pour l'Academie, de façon que l'examen de ces deux Yeux ne pouvoit être différé, sans risque de les perdre, ou au moins de les altérer, c'est pourquoi je priai Mrs. Winslow & Petit, tous deux Academiciens, d'honorer de leur présence l'ouverture que j'en devois faire le troisième jour d'Avril; & ces deux célèbres Anatomistes furent temoins des faits suivans que l'ouverture de ces Yeux nous donna lieu de remarquer, savoir :

I. Que les deux Cristallins avoient été détachés du chaton de l'humeur vitrée, qu'ils étoient tous deux opaques, durs,

diminuez de volume , & assez parfaitement semblables à deux petites Lentilles jaunâtres , mais différemment placez dans le fond de l'Oeil , l'un dessous l'Humeur Vitrée , entre la membrane vitrée , & la Retine ; l'autre cantonnée de côté dans l'hémisphère postérieure , & au bas de l'humeur vitrée , dans laquelle à la moindre compression faite au Globe de l'Oeil du côté du nerf optique , ce Cristallin repassoit aisément du fond au devant de cette même humeur , au milieu de laquelle il sembloit nager.

II. Que dans les deux Yeux la Retine avoit acquis une consistance plus solide que dans l'état naturel , changement qui n'avoit peut-être rien de commun avec l'abattement du Cristallin , & qu'on pourroit conjecturer être une maladie particulière.

III. Que la membrane qui couvre le chaton de l'Humeur vitrée , ne faisoit point d'enfoncement comme à l'ordinaire ; de sorte que le chaton étoit effacé , & avoit repris une forme lenticulaire comme le Cristallin ; de plus , que cette même membrane étoit parsemée de plusieurs points blanchâtres que nous regardâmes unanimement comme la cicatrice de quelques légères entamures que l'Aiguille pouvoit avoir fait dans l'opération ; cette

dernière circonstance s'étant trouvée dans ces deux Yeux.

Ce sont-là , Monsieur , les observations que vous m'avez demandées ; j'ai l'honneur de vous les communiquer avec bien du plaisir , & d'être avec un parfait attachement , Monsieur , votre très-humble & obéissant Serviteur. Signé , Morand le fils.

En confrontant l'Expérience de Mr. de Woolhouse avec celle de Mr. Morand , il est facile de remarquer que le Cristallin avoit été abbatu dans la Cataracte de Mr. de Woolhouse , comme dans celle de Mr. Morand ; cela est très-manifeste par la cicatrice de la membrane du chaton de l'Humeur Vitrée ; que Mr. Morand avoit observé , & qui se rapporte à ternissure de Mr. de Woolhouse.

Pour faire connoître évidemment que la ternissure de Mr. de Woolhouse n'est autre chose qu'une cicatrice semblable à celle de Mr. Morand , on n'a qu'à examiner les paroles mêmes de la Relation On y trouva , dit-on , une petite membrane coriace , placée entre l'Iris & le ligament ciliaire , l'Humeur cristalline étant bien saine & transparente , excepté une ternissure au milieu , causée par le frottement du corps étranger. Mr. de Woolhouse ne donne aucune marque

d'avoir examiné le chaton de l'humeur vitrée de cet œil ; & l'Expérience de Mr. Morand confirme celles de beaucoup d'autres ; savoir , que le chaton de l'Humeur Vitree reprend la forme du Cristallin après l'abattement de la Cataracte. De-là il s'ensuit que Mr. de Woolhouse a pris pour un Cristallin sain & transparent , ce qui n'en avoit que l'apparence. De plus Mr. de Woolhouse dit que la ternissure étoit au milieu de ce Cristallin , qu'elle étoit causée par le frottement du corps étranger ; après avoir marqué que ce corps étranger , qu'il vient d'appeller une petite membrane coriace , n'étoit pas au milieu , mais entre l'Iris & le ligament ciliaire. De-là il s'ensuit encore assez naturellement que la ternissure du milieu ne dépendoit pas du corps étranger qui en étoit éloignée ; mais qu'elle étoit causée par l'opération même , & que la membrane coriace étoit le Cristallin desséché & diminué de volume , comme il est marqué dans l'observation de Mr. Morand. Au reste , il n'est pas étonnant que dans l'ouverture des yeux operez , on ait quelquefois trouvé une espèce de lambeau membraneux , sans forme de Cristallin ; mais cela n'est arrivé qu'à ceux à qui on a haché & brisé la Cataracte avant sa maturité ,

comme je dirai à la fin de ma Replique.

A l'égard de l'Histoire que l'Auteur de la Critique rapporte de Mr. Pinfon , touchant la dissection des Yeux d'une fille aveugle , il marque que dans l'un le Cris-
tallin étoit molasse , & qu'en l'abbatant il s'en alloit en morceaux , & que l'O-
pérateur ne s'y attendoit pas.

Dans l'autre il dit , qu'il avoit trouvé une membrane qui étoit d'une dureté si considérable , & qui étoit si adhérente aux Ligamens ciliaires , que l'on auroit plutôt rompu & déchiré l'Iris que de la détacher. Il n'y a autre chose à dire sur le premier Oeil , que ce que j'ai dit dans mon Livre ; quant au second , il paroît parfaitement conforme à ce que j'ai dit de la Cataracte membraneuse dans mon Traité : savoir , qu'elle n'est pas guérissable par l'opération , & que c'est une fausse Cataracte ; on n'a qu'à voir la description que j'en ai donnée.

Je finirai ma réponse à la Lettre Critique , par une remarque sur la manière dont l'Auteur dit que Celse faisoit l'opération de la Cataracte , qui est de la hacher & briser. L'Auteur de la Lettre a tronqué le passage de Celse , » qui dit ;
» qu'il faut abbatre la Cataracte toute
» entière , & que si elle remonte après
» l'avoir abbattue , il faut la briser en

- » plusieurs parcelles avec l'aiguille ; par-
- » ce que dit-il , ses parcelles ainsi divi-
- » fées s'enveloppent plus facilement , &
- » offusquent moins la Vue. »

L'auteur de la Lettre n'a pas marqué que Celse ne recommande cette dernière manière d'opérer , que quand la Cataracte abbattue à l'ordinaire , ne se tient pas dans la place où l'Opération l'avoit mise. Il faut remarquer que Celse n'a pas déterminé la nature de la Cataracte où l'on est obligé de hacher & de briser , parce qu'alors cette science étoit peu connue ; mais les Opérateurs modernes ont observé que l'on ne devoit faire ce hachement & brisement , que dans le cas où la Cataracte se trouve molle , & quand l'Opérateur s'est trompé dans sa maturité ; lorsque ce cas arrive , on a beau chercher le Cristallin après la mort dans l'Oeil operé , on ne l'y trouve plus , à cause qu'il a été divisé , & on trouve que l'Humeur Vitrée a pris une forme lenticulaire vis-à-vis le trou de la Prunelle , que l'on prend aisément pour le Cristallin , comme il arrivé en plusieurs expériences alleguées dans la Lettre Critique ; faute d'avoir bien examiné l'Humeur Vitrée dans ces sortes d'expériences.



APPROBATION

De Monsieur Burette , Conseiller , Medecin & Sous-Bibliothécaire du Roi , Docteur-Régent en la Faculté de Médecine de Paris , Lecteur & Professeur au Collège Royal de l'Académie Royale des Inscriptions & Belles Lettres , Journaliste des Savans , & Censeur Royal des Livres.

J'A I lu par ordre de Monseigneur le Chancelier , un Manuscrit qui a pour titre : *Nouveau Traité sur les Maladies des Yeux ; &c. par Monsieur de Saint-Yves , Chirurgien Oculiste ; & j'ai cru que l'impression en seroit utile au Public. Fait à Paris ce 16. Avril 1721.*

Signé , BURETTE.



APPROBATIONS.

De Messieurs Winslow & Sylva , Docteurs-Régens de la Faculté de Medecine de Paris , nommés par ladite Faculté pour l'Examen de ce Livre.

NOUS soussignés Docteurs-Régens en la Faculté de Medecine dans l'Université de Paris , commis par la Faculté pour examiner le Livre intitulé ; *Nouveau Traité des Maladies des Yeux , par le sieur de Saint-Yves , Chirurgien Oculiste.* Après l'avoir lu avec beaucoup d'attention , nous avons trouvé que cet Ouvrage répond à la grande réputation de son Auteur ; & nous avons jugé que l'impression en seroit agréable aux connoisseurs , & fort utile au Public. A Paris ce 28 Aout 1721.

Signés , WINSLOW & SYLVA.



APPROBATION

De Monsieur Emmery.

VU l'Approbation des Docteurs ci-dessus , la Faculté permet l'impression dudit Livre. Donné à Paris ce 20 Janvier 1722.

Signé , EMMERY , Doien.



A P P R O B A T I O N

De Monsieur Helvetius , Conseiller du Roi , Inspecteur général de ses Armées & Hopitaux en Flandres , Docteur-Régent de la Faculté de Medecins en l'Université de Paris , de l'Académie Royale des Sciences.

J' A I lu avec attention un Manuscrit intitulé : *Traité des Maladies de l'Oeil.* La Description Anatomique que l'Auteur y fait avec exactitude & précision de toutes les parties de cet Organe , la netteté avec laquelle il en expose les Maladies , leurs différentes causes , & les secours les plus efficaces pour y remédier me font juger que l'impression de cet Ouvrage est très-utile au Public. Fait à Paris ce 13. Janvier 1722.

Signé , J. HELVETIUS.



APPROBATION

De Monsieur Arnaud , Chirurgien ordinaire du Parlement , ancien prévôt des Chirurgiens Jurés de Paris , & ancien Démonstrateur en Chirurgie & en Anatomie au Jardin Royal des Plantes.

J'AI lu avec attention le present Livre. L'Ouvrage m'a paru digne d'un Auteur sage & consommé dans cette partie de la Chirurgie. Il a suivi la meilleure Méthode des Auteurs qui veulent écrire utilement pour faire de bons Eleves.

Il donne d'abord une idée de la véritable Structure de la Partie ; il en tire des conséquences raisonnées pour l'intelligence de la fonction de la Vue , des Maladies qui peuvent intéresser cet Organe , & de la Chirurgie convenable à leurs guérifons. Sa pratique est conforme à nos Principes & aux meilleures Observations anatomiques. Je ne suis point surpris des rares talens de l'Auteur ; il y a long-tems qu'il nous en a donné des preuves à n'en point douter. J'espere qu'un pareil Livre fera de bons Eleves , & qu'on peut le

mettre au nombre des plus nécessaires
qu'il y ait dans la République des Lettres.

Signé , ARNAUD.



APPROBATION

*De Monsieur Petit , Chirurgien Juré à
Paris , ancien Prévôt de sa Compag-
nie , Démonstrateur en Chirurgie , &
de l'Académie Royale des Sciences.*

DES Oculistes qui ont écrit de no-
tre tems , les uns se sont contentés
de distribuer la Liste des Opérations qu'ils
disent avoir faites , mais ne les ont point
décrites ; d'autres ont fait des Recueils
de Lettres à leur louange , ils s'annon-
cent remplis de Secrets qu'ils se réservent.
On voit clairement qu'ils n'ont en vue
que leurs intérêts particuliers , aussi ne
doit-on regarder leurs Ecrits que comme
de pures Affiches.

Monsieur DE SAINT-YVES au con-
traire donne dans ce Traité une exacte
Description de l'Oeil , & des Maladies
qui l'affligent ; il expose fidèlement les
Remedes , & décrit les Opérations qui
lui ont réussi ; il montre le désir qu'il a

d'être utile au Public. Cependant quelque bon que me paroisse son Ouvrage , je ne crois pas que le Public soit en reste avec lui ; il devoit cette reconnoissance à la justice que tout le monde lui rend depuis plusieurs années.

Signé , PETIT.



TABLE

DES CHAPITRES

CONTENUS DANS CE TRAITÉ.



DESCRIPTION DE L'ŒIL.

CHAP. I.	D E l'Oeil en général , & des parties qui environnent le Globe.	Page 1.
CHAP. II.	Des muscles de l'Oeil.	7
Chap. III.	Du Globe de l'Oeil & de ses parties.	9.
Chap. IV.	Des nerfs qui se distribuent à toutes les parties de l'Oeil.	15.
Chap. V.	Distribution des Vaisseaux sanguins qui fournissent la nourriture aux membranes , & entretiennent les corps transparens du Globe de l'Oeil.	19.
Chap. VI.	Des Vaisseaux qui reportent le superflu du sang & des liqueurs qui ont servi aux membranes & aux corps transparens du Globe de l'Oeil.	21.
Chap. VII.	De l'usage des différentes parties de l'Oeil qui modifient les rayons visuels.	23.
Chap. VIII.	De l'Organe immédiat de la Vue , & des principes pour connoître ses altérations.	28.
Chap. IX.	Des trois sortes de vues.	30.

T A B L E



P R E M I E R E P A R T I E.

Des Maladies de l'Oeil.

Chap. I.	D E l'Anchylops ou abcès du grand angle.	39.
Chap. II.	De l'Oegilops ou fistule lacrimale.	45.
Chap. III.	Des Fistules des Paupieres.	58.
Chap. IV.	De l'Orgeolet , de la grêle & gravelle des Paupieres.	63.
Chap. V.	Des Verrues ou porreaux des Paupieres.	66.
Chap. VI.	Du cancer des Paupieres.	68.
Chap. VII.	De la galle & des dartres des Paupieres.	73.
Chap. VIII.	Du dérangement des Cils , nommé Trichiaise.	76.
Chap. IX.	De la paralisie de la paupiere supérieure.	80.
Chap. X.	De l'éraillage des Paupieres.	85.
Chap. XI.	De l'inflammation & de l'érésipelle des paupieres.	89.
Chap. XII.	De l'hydropisie des paupieres.	91.
Chap. XIII.	Des Atheromes.	92.
Chap. XIV.	Des tumeurs adipeuses.	94.
Chap. XV.	Du renversement de la paupiere inférieure.	96.
Chap. XVI.	De l'union contre nature des paupieres.	98.
Chap. XVII.	Des hydatides ou phlyctenes des paupieres & de la conjonctive.	103.
Chap. XVIII.	Des excroissances de chair qui se trouvent entre les paupieres & le Globe de l'Oeil.	105.

DES CHAPITRES.

- Chap. XIX. Des abcès qui se forment entre le
Globe de l'Oeil & l'orbite. 106.
Chap. XX. Des amas d'humeurs qui se font der-
rière le Globe de l'Oeil. 109.
Chap. XXI. Opération d'une tumeur singulière
dans l'orbite. 113.
Chap. XXII. Des excroissances de chair qui vien-
nent sur le Globe de l'Oeil. 115.
Chap. XXIII. De l'Onglet ou pterygion. 118.
Chap. XXIV. Des Yeux louches. 121.



SECONDE PARTIE.

Des Maladies qui attaquent le Globe de l'Oeil.

- Chap. I. **D**E la grosseur demesurée du Glo-
be de l'Oeil. 128.
Chap. II. Des Maladies qui suivent les coups re-
çus à l'Oeil. 133.
Chap. III. De l'Ophthalmie en général. 136.
Chap. IV. Division de l'Ophthalmie, renfermée
dans les articles suivans. 138.
Article I. De l'Ophthalmie sèche. 139.
Article II. De l'Ophthalmie humide. *ibid.*
Article III. De l'Ophthalmie qui suit le Rhume. 140.
Article IV. De l'Ophthalmie avec chassie sèche. *ib.*
Article V. De l'Ophthalmie qui occupe le Globe
de l'Oeil du côté des Angles. 141.
Article VI. De l'Ophthalmie avec bourgeons sur
le Globe de l'Oeil. *ibid.*
Article VII. De l'Ophthalmie, avec de petits ab-
cès sur la cornée & la conjonctive. 142.
Article VIII. De l'Ophthalmie érépélateuse. *ib.*
Article IX. De l'Ophthalmie la plus violente ap-
pellée Chemosis. 143.

T A B L E

Article X. De l'Ophthalmie vénérienne.	145.
Article XI. De l'Ophthalmie de la Choroïde.	ibid.
Article XII. De l'Ophthalmie causée par des ordures dans l'Oeil.	146.
Article XIII. De l'Ophthalmie par des coups reçus à l'Oeil.	ibid.
Article XIV. De l'Ophthalmie par la rupture des vaisseaux qui rampent sur la conjonctive.	147.
Chap. V. Du Prognostic des Ophthalmies.	ibid.
Chap. VI. De la guérison des Ophthalmies, renfermées dans les articles suivans.	149.
Article I. De la guérison de l'Ophthalmie sèche.	151.
Article II. De la guérison de l'Ophthalmie humide.	152.
Article III. De la guérison de l'Ophthalmie qui suit le rhume.	156.
Article IV. De la guérison de l'Ophthalmie avec chassie.	ibid.
Article V. De la guérison de l'Ophthalmie qui occupe le globe du côté des angles.	157.
Article VI. De la guérison de l'Ophthalmie avec bourgeons.	ibid.
Article VII. De la guérison de l'Ophthalmie avec de petits abcès sur la Cornée & la Conjonctive.	158.
Article VIII. De la guérison de l'Ophthalmie éréthelateuse.	ibid.
Article IX. De la guérison de l'Ophthalmie, appelée Chemosis.	159.
Article X. De la guérison de l'Ophthalmie vénérienne.	161.
Article XI. De la guérison de l'Ophthalmie de la Choroïde.	162.
Article XII. De la guérison de l'Ophthalmie, causée par des ordures dans l'Oeil.	163.
Article XIII. De la guérison de l'Ophthalmie, causée par des coups reçus à l'Oeil.	164.

DES CHAPITRES.

Article XIV. De la guérison de l'Ophthalmie ; causée par la rupture des vaisseaux qui rampent sur la conjonctive.	165.
Chap. VII. De l'Ophthalmie qui suit la petite ve- role.	166.
Chap. VIII. Des remèdes pour l'Ophthalmie , qui suit la petite verole , & les accidens qui l'accom- pagnent.	167.
Chap. IX. De l'abcès de l'Oeil.	171.
Chap. X. Des Ulceres de la Cornée.	175.
Chap. XI. Des Staphylomes.	178.
Chap. XII. De l'Albugo.	182.
Chap. XIII. De la Cataracte en général.	184.
Chap. XIV. De la vraie Cataracte.	187.
Chap. XV. Des Cataractes douteuses , renfermées dans les Articles suivans.	195.
Art. I. De la Cataracte membraneuse.	196.
Art. II. De la Cataracte filandreuse.	201.
Art. III. De la Cataracte par des coups.	202.
Art. IV. De la Cataracte causée par l'altération du Cristallin	204.
Chap. XVI. Des fausses Cataractes renfermées dans les Articles suivans.	205.
Art. I. Du Glaucome.	ibid.
Art. II. De la Cataracte branlante.	210.
Chap. XVII. Des causes des Cataractes.	ibid.
Chap. XVIII. Des signes des Cataractes.	218.
Chap. XIX. De ce qu'il faut faire avant l'opéra- tion de la Cataracte.	226.
Chap. XX. De la maniere de faire l'opération de la Cataracte.	229.
Chap. XXI. De la maniere d'operer aux Catarac- tes qui sont dans la chambre de l'humeur aqueu- se.	235.
Chap. XXII. De la maniere de surmonter les ac- cidens qui arrivent dans l'opération de la Cata- racte.	240.
Chap. XXIII. Des moyens de remédier aux acci-	

TABLE DES CHAPITRES.

<i>ciens qui suivent l'opération de la Cataracte.</i>	250.
Chap. XXIV. <i>De l'abcès superficiel du Cristallin.</i>	257.
Chap. XXV. <i>Des maladies de la Retine.</i>	258.
Chap. XXVI. <i>De l'Atrophie de la Retine.</i>	261.
Chap. XXVII. <i>De la Goutte sereine parfaite.</i>	262.
Chap. XXVIII. <i>De la Goutte sereine imparfaite.</i>	240.
Chap. XXIX. <i>Sur les manieres de panser les Yeux.</i>	273.
Chap. XXX. <i>Des moyens de soulager la vue par les lunettes.</i>	282.
Chap. XXXI. <i>De la difference des lunettes.</i>	284.
Chap. XXXII. <i>Des moyens de s'exemier de l'usage des lunettes.</i>	285.
Chap. XXXIII. <i>Des causes accidentelles qui peuvent blesser la vue.</i>	287.
Chap. XXXIV. <i>De l'opération qui convient à l'Oeil , pour y appliquer un Oeil postiche.</i>	289.

Fin de la Table des Chapitres.

NOUVEAU



NOUVEAU TRAITÉ DES MALADIES DES YEUX.

PREMIERE PARTIE.



DESCRIPTION DE L'ŒIL.

CHAPITRE I.

*De l'Oeil en général , & des parties qui
accompagnent le Globe.*



OMME ce Traité n'a pour objet que les Maladies de l'Oeil , c'est-à-dire , l'état contre nature de cet Organe , il semble qu'il soit nécessaire de donner auparavant une idée de sa structure & de l'usage des parties qui le composent. On peut distinguer ces parties en deux Classes. La première , renferme celles qui environnent le Globe de l'Oeil ; la seconde , comprend celles qui le composent. Les parties qui environnent le Globe , sont

A

2 TRAITÉ DES MALADIES

les os qui forment l'Orbite , les paupieres , la Glande , la Caruncule Lacrimale , & les Graisses , auxquelles on peut ajouter le Conduit Nazal. Celles qui composent le Globe , sont les muscles , les Membranes communes & propres , & les humeurs , ou les Corps transparens qu'elles renferment.

L'Orbite est une cavité osseuse destinée pour l'Oeil. Elle a une ouverture fort large , & un fond étroit & percé d'un trou qu'on appelle optique. Elle est composée de sept Os ; le Coronal en fait la partie supérieure ; l'Os Maxillaire , & l'Os de la Pommette en font la partie inférieure , & une partie des côtés. La portion du Maxillaire , qui s'élève vers le grand Angle de l'Oeil , avec l'Os *Unguis* forment la cavité où est situé le Sac lacrimal. La portion de l'Os Ethmoïde , communément appelé l'Os *Planum* , en fait la partie postérieure , & latérale interne du côté du grand Angle. L'Os Sphénoïde en fait la partie latérale & postérieure du côté du petit Angle : Enfin , une petite portion de l'Os du Palais , fait la partie inférieure , & la plus reculée du fond de l'Orbite.

Les paupieres qui servent à couvrir la partie antérieure du Globe de l'Oeil, sont toutes les deux composées de la peau, bordées

DES YEUX. PART. I.

3

chacune d'un Cartilage nommé Tarfe , & des Poils qu'on appelle Cils ; & enfin , elles ont des Muscles pour les mouvoir. La peau des paupieres est plus lâche que par-tout ailleurs. Le Cartilage de la Paupiere supérieure est plus large que celui de l'inférieure , ayant environ cinq lignes de largeur dans son milieu , & diminue peu-à-peu vers les Angles , étant néanmoins plus étroit du côté du nez , que du côté de la Tempe. Le Cartilage de la Paupiere inférieure a environ deux lignes de largeur , qu'il conserve dans presque toute son étendue : l'épaisseur de ces Cartilages augmente à mesure qu'ils approchent vers le bord des Paupieres. L'union de ces Cartilages du côté du nez se nomme le Grand Angle ; celle du côté des tempes se nomme le petit Angle.

Les Paupieres ont deux Muscles : savoir , un Propre , & un Commun. Le premier , appartient à la Paupiere supérieure , & sert à la relever ; & le second , est commun aux deux Paupieres , & son usage est de les fermer. Le premier nommé le Releveur de la Paupiere supérieure , prend son origine au fond de l'Orbite au-dessus du Trou Optique , & va en s'élargissant se terminer au Cartilage de cette même Paupiere. Le second , est composé des fibres demi-circulaires ,

4 TRAITÉ DES MALADIES

qui ont leur attache à la circonference de l'Orbite , & à un tendon assez fort au grand Angle de l'Oeil , & aux deux Paupieres qu'elles recouvrent jusqu'à leur Cartilage , où elles se terminent ; en sorte qu'en agissant elles ferment l'Oeil en approchant les Paupieres.

Les Paupieres sont revêtues intérieurement d'une Membrane qui est attachée à leurs bords , & qui recouvre ensuite la partie antérieure du Globe pour aller se terminer au bord de la Cornée transparente. Elle est aussi attachée au bord de l'Orbite : c'est d'où vient qu'on la regarde comme une suite du Péricrane. Cette Membrane commune au Globe & aux Paupieres , est connue sous le nom de la Conjonctive. En l'examinant avec soin , on la trouve recouverte d'une seconde Membrane , qui est plus fine que la première , ce qui est une espece d'Epiderme , qui paroît s'étendre insensiblement sur la Cornée transparente. Il paroît derriere la Conjonctive une autre Membrane formée par l'union des Aponévroses ou Tendons plats des Muscles dont nous parlerons ci-après ; c'est principalement celle qui forme le Blanc de l'Oeil.

Il y a au bord intérieur de chaque Paupiere , aux endroits où elles se touchent pour se fermer , une rangée de points en

maniere de trous , qui sont les extrémités de plusieurs petits Canaux qui fournissent une humeur , qui , à raison de son onctuosité , s'oppose à la chute des larmes sur les Joues , & les détermine vers le Nez pour passer par des Canaux dont nous parlerons. Lorsque cette humeur devient épaisse , elle fait ce qu'on appelle la Cire ou la Chassie.

La Glande Lacrimale est située à l'entrée de la partie supérieure de l'Orbite du côté du petit Angle. Elle fournit continuellement par plusieurs petits Canaux , dont les ouvertures se remarquent intérieurement à quelque distance les unes des autres , le long de la Paupiere supérieure ; elle fournit , dis-je , une serosité qui mouillant continuellement la partie antérieure de l'Oeil , ne facilite pas moins les mouvemens de cette Paupiere , qu'elle entretient la transparence de la Cornée. Le residu de cette serosité est reçu par deux ouvertures particulieres , situées au bord intérieur du Cartilage de chaque Paupiere , à environ trois lignes de distance du grand Angle. On les appelle Points Lacrimaux , qui sont comme des Pavillons de deux petites Trompes en forme de Canaux qui se réunissent vers le Nez dans un Conduit commun fort court. Ce Conduit s'ouvre dans une petite Poche

6 TRAITÉ DES MALADIES

longuette , appelée Sac Lacrimal , situé dans une Goutiere formée par la rencontre de l'Os Unguis , avec l'Os Maxillaire. Cette Poche répond à un Conduit membraneux , appelé Conduit Lacrimal , qui se termine par une espece d'Entonnoir dans la partie inférieure des Narines au-dessous des lames inferieures du Nez , & au-dessus de la Voute du Palais. Le Conduit dont je viens de parler , est renfermé dans un Canal osseux , appelé Canal Nazal , qui est creusé dans l'Os Maxillaire , & recouvert en partie de l'Os Unguis. C'est par-là que la serosité Lacrimale reçue par les Points Lacrimaux se dégorge dans le Sac dont nous venons de parler , pour sortir ensuite par le Nez , ou couler par derriere le Palais dans le Pharinx , où elle se mêle avec la salive.

Il paroît au grand Angle de l'Oeil un Bouton rougeâtre , communément appelé Caruncule Lacrimale , dont l'usage est de diriger le cours des larmes dans les Points Lacrimaux , en faisant à leur égard l'Office de Digue. Ce même corps étant examiné de près , paroît glanduleux , & filtrer une humeur presque semblable à celle des Glandes Ciliaires. Les Paupieres en recouvrant une partie du Globe servent à le garantir contre l'impression

des corps extérieurs , à quoi peuvent aussi contribuer les Cils , & par leurs mouvemens à étendre également la ferofité de la Glande Lacrimale fur la Cornée pour entretenir fa transparence. Les Paupieres outre cela , dirigent le furplus de cette ferofité dans les points Lacrimaux. On peut dire enfin , qu'elles fervent à modifier les rayons d'une lumiere trop éclatante.

La grande quantité de graiffe dont l'Oeil eft entouré , ne fert pas moins à le garantir contre la dureté des parois de l'Orbite , & à entretenir la fouplesse des Mufcles qui le meuvent , qu'à le maintenir dans une situation convenable pour exécuter fes mouvemens.



CHAPITRE II.

Des Mufcles de l'Oeil.

LE Globe de l'Oeil a fix Mufcles que l'on a nommés , à raifon de leur direction , Droits & Obliques. Les Droits font au nombre de quatre , & les Obliques de deux. Les premiers ont reçu divers noms , eu égard à leurs ufages. C'eft d'où vient qu'on a nommé le premier le Releveur ou le Superbe , le fecond Abaiffeur ou l'Humble , le troifième eft l'Adducteur , & le quatrieme l'Abducteur.

8 TRAITÉ DES MALADIES

Ces quatre Muscles prennent leur origine du fond de l'Orbite à la circonférence du Trou Optique , & s'avancent jusqu'au-delà du milieu du Globe où ils s'infèrent par des Tendons larges & minces , qui s'unissent tous ensemble entre la Cornée opaque & la Conjonctive , & recouvrant le reste du Globe , ils s'avancent jusqu'à la Cornée transparente , où ils se terminent. Des deux Obliques , l'un est grand & l'autre petit. Le Grand prend son origine du fond de l'Orbite , à côté du Muscle Adducteur , vient passer par une Poulie cartilagineuse , située vers le bord de l'Orbite au-dessus du grand Angle , & forme ensuite un Tendon grêle , qui passe sur le Globe , pour se terminer à sa partie postérieure du côté du petit Angle , proche le Muscle abducteur. Le Petit Oblique tire son origine près du bord de l'Orbite à côté du Conduit Nasal , & s'avancant obliquement du côté du petit Angle , passe sous le Globe de l'Oeil , pour aller rencontrer dans sa partie postérieure le Tendon du Grand Oblique.

L'usage des Muscles droits est en partie marqué par les noms differens qu'on leur a donnés. Lorsque tous ces Muscles agissent en même tems & également , ils retiennent le Globe de l'Oeil dans un parfait équilibre ; mais s'il arrive que deux de

ces Muscles les plus voisins agissent ensemble , ils font faire pour lors à l'Oeil un mouvement oblique. Par exemple , si le Réléveur & l'Adducteur agissent en même tems , ils tourneront l'Oeil obliquement en haut , & vers le grand Angle , ainsi des autres ; & si ces muscles agissent successivement , ils font faire une espece de mouvement circulaire au Globe. A l'égard des Muscles obliques , sans parler ici des différentes opinions que l'on a sur leur usage , je m'arrête à celle de Mr. Cowper , comme étant fondée sur leur véritable direction , & je dis avec lui que quand ces Muscles agissent en même tems ils portent le Globe directement en dehors , & à fleur de tête ; mais lorsque le grand Oblique agit seul , il fait avancer l'Oeil obliquement en bas , & le petit Oblique étant seul en contraction , le pousse obliquement en haut.



CHAPITRE III.

Du Globe de l'Oeil , & de ses parties.

ON distingue pour l'ordinaire , les Membranes de l'Oeil , en communes , & en propres. On appelle Communes , non seulement celle qui joint le Globe aux Paupieres , laquelle nous avons

nommé Conjonctive , aussi bien que celle des Tendons des quatre Muscles droits, que nous avons dit former le Blanc de l'Oeil ; mais encore celles qui recouvrent toutes les humeurs. On donne le nom de Propres à celles qui recouvrent chaque humeur en particulier.

La premiere des Membranes du Globe de l'Oeil est appelée Cornée , à raison de sa consistance. Cette Membrane renferme toutes les parties qui composent le Globe ; elle est transparente par devant , & opaque dans le reste de son étendue ; c'est d'où vient qu'on a nommé le milieu de sa partie antérieure , Cornée transparente , & le reste de son étendue , Cornée opaque ou sclerotique , dont l'épaisseur diminue à mesure qu'elle approche de la portion transparente. Il faut remarquer que la convexité de celle-ci est plus saillante que le reste du Globe. On peut diviser l'une & l'autre portion de cette Membrane en plusieurs lames appliquées les unes sur les autres. Cette Membrane est aussi adhérente par sa partie postérieure au Nerf Optique , dont on parlera dans la suite ; elle paroît en être une continuation ; & dans le reste de son étendue , elle est attachée d'espace en espace à la Choroïde par des vaisseaux sanguins. La seconde Membrane est connue en gé-

néral sous le nom d'Uvée , ou de *Choroïde*. On peut la distinguer en deux portions. La plus considérable tapisse toute la surface intérieure de la *Cornée opaque* à laquelle elle est fort adhérente , à l'endroit de son union avec la *Cornée transparente* , par plusieurs fibres , qui paroissent tendineuses , & qui forment une espece de *Bande circulaire* fort étroite , nommée *Ligament* ou *Cercle ciliaire*. Je nommerai avec plusieurs *Anatomistes* cette portion *Choroïde*. La seconde portion compose la portion colorée qui paroît au travers de la *Cornée transparente* , & que l'on appelle *Iris* , au milieu de laquelle se trouve une ouverture ronde nommée *Pupille* ou *Pru-nelle*.

La *Choroïde* peut se diviser en deux *Lames* principales , depuis le *Nerf optique* , jusqu'au *ligament ciliaire*. La *Lame interne* produit à l'endroit de ce *Ligament* des replis rayonnés & ondojants en forme d'*Etoile* , qu'on peut nommer *Productions ciliaires* , à cause de quelque ressemblance avec les *Cils*. Ces replis ou alongemens sont chargés d'un *lacis* très fin de *Vaisseaux capillaires* qui viennent de ceux de la *Choroïde* , comme nous dirons dans la suite en parlant de la nourriture des corps transparens. La *Lame interne* est induite en dedans , de même que la *Lame*

extérieure l'est en dehors , d'un velouté noir , aussi bien que la partie postérieure de l'Iris. Quelques-uns prennent ce Velouté pour une Membrane. La seconde portion , ou l'Iris , est plus épaisse que la première , & est garnie de Fibres charnues disposées en maniere de rayons. Ces Fibres sont comme autant de Muscles qui partant de la grande circonference de l'Iris , se terminent vers le Trou de la Prunelle , où elles aboutissent à un Muscle circulaire étroit & moins épais , dont la petite circonference fait la Prunelle , laquelle se dilate par le moyen des fibres rayonnées , & se retressit par les Circulaires. Il y a un espace ou intervalle entre l'Iris & la Cornée transparente , que l'on appelle Chambre antérieure , & une autre derrière l'Iris que l'on nomme postérieure. Ces deux espaces renferment une humeur appelée aqueuse , c'est pourquoi on les nomme Chambres de l'humeur aqueuse.

La troisieme Membrane appelée Retine , est une production du Nerve optique. Les deux Nerve optiques prennent leurs origines des Eminences du Cerveau , appelées les Couches des Nerve optiques , d'où ils s'avancent en devant , & s'unissent au-dessus de la Selle de l'Os Sphénoïde près de l'Entonoir : & se séparant ensuite sortent du Crâne par les Trous optiques pour

aller s'insérer chacun à son Oeil , à la partie postérieure de la Cornée opaque. Le Corps de chaque Nerf optique est recouvert de la Dure & de la Pie-mere : celle là l'enferme en maniere de guaine , laquelle s'unit à la Cornée opaque sans la produire. La pie-mere , forme des Cellules , divisées d'espace en espace , qui contiennent une Substance moilleuse , semblable à celle du Cerveau. Le Nerf optique en entrant dans l'Oeil devient comme étranglé , & forme un petit blanchâtre , de la circonference duquel naît la Retine qui tapisse la surface interne de la Choroïde , jusqu'au Cercle ciliaire , où elle semble se terminer. Elle paroît être une matiere blanchâtre , & presque transparente , à peu près semblable à du pain à chanter mouillé , mais beaucoup plus transparente ; elle a plusieurs vaisseaux , dont on parlera dans la suite.

Les Corps transparens du Globe de l'Oeil , communément appelés Humeurs , sont au nombre de trois , savoir le Corps Vitré , le Cristallin , & l'Humeur aqueuse. Le Corps vitré est immédiatement environné de la Retine , laquelle est comme le moule de la plus grande partie de la surface , dont la portion antérieure est enfoncée en maniere de Chaton pour loger le Cristallin. Le Corps vitré est composé

14 TRAITÉ DES MALADIES

de plusieurs Pelicules membraneuses très fines & transparentes , qui sont arrongées ensemble de telle maniere , qu'elles forment quantité de petites Cellules remplies d'une humeur presque semblable au Blanc d'Oeuf ; outre cela , le Corps vitré est recouvert d'une Membrane délicate qui est attachée à la Retine , à l'endroit du Cercle ciliaire , où l'on voit des rayons noirs tout autour du Cristallin , mal-à-propos nommé Fibres ou Procès ciliaires ; car ce ne sont que des Canelures , dans lesquelles les Productions ciliaires , dont nous avons parlé ci-dessus , sont enchassées , & qui retiennent le Velouté noir de ces Productions , après qu'on les en a tirées en séparant la Choroïde. Cette membrane paroît se diviser antérieurement en deux Lames , dont l'une passe par derrière le Cristallin , & l'autre en devant , & le tient enchassé dans l'Humeur vitrée.

Le Cristallin est un Corps lenticulaire , plus convexe par derriere que par devant , composé de plusieurs couches vasculeuses & très transparentes , arrangées les unes sur les autres , à peu près comme les pellicules d'un Oignon. Il est placé dans le Chaton de l'Humeur vitrée , entre les Lames de la Membrane de cette Humeur , dont nous venons de parler ; il est situé au milieu de la partie antérieure du Corps

vitré , vis-à-vis le Trou de la Prunelle , à quelque distance de l'Iris , formant par cet intervalle la Chambre postérieure de l'Humeur aqueuse , comme nous avons dit ; & conjointement avec l'Humeur vitrée , il occupe presque toute la cavité du Globe de l'Oeil. L'humeur aqueuse est une sérosité très coulante , limpide & transparente, quoiqu'un peu visqueuse, qui remplit exactement les deux Chambres qui communiquent ensemble par la Prunelle. La Chambre postérieure est très petite , & elle contient peu d'Humeur aqueuse.

Toutes les parties que je viens de décrire ont des Nerfs , des Arteres , & des Veines, dans le détail desquels je vais entrer.



CHAPITRE IV.

Des Nerfs qui se distribuent à toutes les parties de l'Oeil.

LEs parties externes de l'Oeil , savoir , la Peau de la Paupiere supérieure , la Portion supérieure du Muscle orbiculaire , la Glande lacrimale , & le Sac Lacrimal reçoivent des Nerfs de la première branche de la cinquième Paire. Elle entre dans l'Orbite par la fente Sphénoïdale , où elle se divise en trois

16 TRAITÉ DES MALADIES

rameaux ; favoir , un supérieur qui passe par dessus l'Oeil , pour gagner le Trou furcilier , ou l'Echancrure , que l'on trouve souvent au lieu du Trou par où ce rameau sort de l'Orbite , & se distribue , non-seulement à la peau , & à la portion supérieure du Muscle orbiculaire , mais encore au Front & à ses Muscles.

Des deux autres rameaux , l'un est du côté interne , & l'autre de l'externe. Le Rameau interne se tourne obliquement vers le grand Angle de l'Oeil , & en passant , jette un filet qui rentre dans le Crâne par un petit trou nommé Orbitaire interne , se plonge aussi à travers l'Os Ethmoïde , & distribue par plusieurs filets dans la Membrane pituitaire du Nez ; ensuite le rameau continue sa route vers le grand Angle pour se distribuer au Sac Lacrimal , à la portion voisine du Muscle orbiculaire , & à la peau. Ce Rameau donne encore un petit Nerf , qui communique avec les Moteurs de l'Oeil , pour former un petit Ganglion , comme nous dirons dans la suite. Le Rameau externe du Nerf ophthalmique se jette vers le petit Angle , se ramifie dans la Glande lacrimale , & fournit aux parties voisines.

Les parties externes de l'Oeil reçoivent encore des Nerfs de la seconde

branche de la cinquieme Paire. Cette branche appelée Maxillaire supérieure, sort du Crâne par un trou particulier du même nom, & donne d'abord un filet qui perce l'Os de la Pomette pour se distribuer à la portion voisine du Muscle orbiculaire, & à la peau; elle jette un autre rameau qui descend pour se distribuer aux Dents Molaires, & à la partie postérieure du Palais. Ensuite cette branche s'insinue dans le Canal osseux qui est à la partie inférieure de l'Orbite, & ayant fourni des Nerfs aux Sinus maxillaires, & aux Dents, elle sort par le Trou orbitaire externe, sous le Muscle orbiculaire, & communique avec quelques filets de la portion dure du Nerve auditif.

Les Muscles de l'Oeil tirent leurs Nerve de la troisieme, quatrieme, & sixieme Paire, appelée ordinairement Pathétique. La sixieme qui est l'origine du Nerve intercostal, n'est que pour le Muscle abducteur de l'Oeil.

Les autres Muscles ont leurs Nerve de la troisieme Paire, à qui les Anatomistes ont donné le nom de Moteurs. Cette Paire en entrant dans l'Orbite, se divise en quatre rameaux, un pour le Muscle relèvement de l'Oeil, lequel fournit au relèvement de la Paupiere su-

périeure , un pour l'Abaisseur , un pour l'Adducteur , & un pour le petit oblique. Outre cette division , elle donne encore un rameau qui communique avec le petit Nerf de la branche Ophtalmique , dont nous avons parlé , & forme avec lui un petit Ganglion lenticulaire. Ce Ganglion produit plusieurs filets nerveux , lesquels se jettent tout autour du Nerf optique , percent la Cornée opaque , se glissent entre cette membrane , & la Choroïde , & vont se distribuer à l'Iris , dont chacun en passant sur la Choroïde , lui fournit des filamens nerveux qui paroissent s'y épanouir , à peu près de la même manière que les Nerfs cutanés aboutissent dans le tissu de la peau.

Après que chaque filet nerveux a fourni à la Choroïde les filamens dont nous venons de parler , ils continuent leurs routes vers l'Iris , où ils se divisent encore en deux filamens , dont l'un va se terminer au Cercle ciliaire , & l'autre aux Muscles rayonnés de l'Iris.





CHAPITRE V.

De la distribution des Vaisseaux sanguins qui fournissent la nourriture aux Membranes, & entretiennent les Corps transparens du Globe de l'Oeil.

LEs Artères Carotides fournissent à chaque Oeil des branches, dont le nombre n'est pas toujours le même, qui passe au travers de la Cornée opaque, principalement de sa partie postérieure, vers le Nerf optique : elles se glissent dans son épaisseur, & lui ayant fourni des vaisseaux, la percent par plusieurs rameaux qui se distribuent à la Choroïde, & dont les principaux s'avancent presque directement entre les lames de cette membrane pour aller gagner l'Iris. Ces rameaux forment par leur concours de côtés & d'autres dans l'épaisseur ou la duplicature de l'Uvée, un Cercle arteriel qui n'est pas uni, mais plissé d'espace en espace en dedans & en dehors. La partie antérieure du Cercle arteriel fournit quantité de Vaisseaux capillaires à l'Iris & à ses Muscles. Elle fournit encore une infinité de Vaisseaux fort fins & courts, qui se terminent à la partie antérieure ou extérieu-

re de la circonférence de l'Uvée , près du bord de la Cornée transparente , & qui s'ouvrent immédiatement dans la Chambre antérieure pour fournir l'Humeur aqueuse , selon Mr. Hovius , à qui on doit cette découverte. La partie postérieure du Cercle arteriel produit principalement le Tissu vasculaire qui forme les Productions ciliaires , vulgairement appellées Procès , & donne des vaisseaux imperceptibles au Cercle ou Ligament ciliaire qui est à la circonférence du Cristallin , & voisine l'Humeur vitrée , & ses Membranes particulières. Les ramifications des grosses branches , qui ont percé la Cornée opaque , se distribuent différemment aux lames de la Choroïde en maniere de lignes demi circulaires entassées & mêlées les unes avec les autres , & y produisent le Velouté noir qui teint sa surface intérieure , & celle de l'Uvée. Elles en donnent aussi à la Retine , & l'ayant traversée , jettent quantité de Capillaires extrêmement fins qui entretiennent l'Humeur vitrée & sa membrane. La Retine a encore des vaisseaux dont le tronc sort du Nerve optique.





C H A P I T R E V I.

Des Vaisseaux qui reportent le superflu du sang , & des Liqueurs qui ont servi aux Membranes , & aux Corps transparens du Globe de l'Oeil.

LE superflu de la nourriture de toutes ces parties , revient par des canaux veineux proportionnés à chacune en particulier , lesquels se réunissent de côté & d'autre dans la duplicature de la Choroïde , en de petits troncs veineux qui se jettent dans la Cornée opaque , & après en avoir reçu plusieurs Veines capillaires , la traversent de dedans en dehors , & vont se réunir aux jugulaires. L'humeur aqueuse étant versée immédiatement dans la Chambre antérieure par des ouvertures arterielles particulieres , retrouve des Vaisseaux veineux particuliers dans la Chambre postérieure , vers la circonference de la surface interne de l'Uvée , qui la reportent dans les Vaisseaux sanguins. Ainsi , à mesure que cette Humeur entre dans l'Oeil par les Vaisseaux qui la portent , elle en trouve d'autres qui lui donnent issue pour sortir de l'Oeil , & en même tems faciliter le passage du sang dans

22 TRAITÉ DES MALADIES

les Veines capillaires , selon Mr. Hovius. Cet Auteur a encore trouvé des Vaisseaux particuliers pour la nourriture de la Cornée transparente , lesquels viennent de ceux de la Glande lacrimale , de la Graisse & des Muscles , se glissent dans la Tunique conjonctive , & s'insinuent entre les pellicules de la Cornée transparente.

Le résidu de ce Suc nourricier retourne en partie par de pareils vaisseaux proportionnés, pour aller trouver les Veines , & en partie suinte par les pores de la surface externe de la Cornée transparente , pour nettoyer cette surface & entretenir sa polissure.

On remarque que si ayant retiré un Oeil humain de son Orbite , on vient à le comprimer , on verra sortir au travers de la Cornée transparente une infinité de gouttes d'humeur , qui paroissent comme une rosée sur la partie externe de cette Membrane.

Il est à propos , à cette occasion , de faire une réflexion sur la découverte de Mr. Hovius , touchant les Artères qui apportent l'Humeur aqueuse , & les Veines qui la reportent. Cette découverte ayant été faite par l'injection d'une liqueur dans les Artères & les Veines , il semble que l'on pourroit croire que cet-

te injection peut forcer les Vaisseaux fins & délicats des yeux, & par conséquent, faire paroître une fausse route au lieu d'une vraie. Pour moi je croirois qu'il est plus vraisemblable que l'Humeur aqueuse se produit dans l'Oeil par une espèce de transudation au travers des Humeurs Vitrée & Cristalline ; & que ce n'est autre chose que la portion la plus fine & la plus limpide du Suc nourricier de ses Corps transparens, laquelle, ayant rempli l'espace qui est entre le Cristallin, & la Cornée transparente, s'échape au travers des Pores de cette Membrane, pour faire place à l'Humeur qui se produit de nouveau ; c'est ce qu'on fera encore plus disposé à croire, si on fait attention que la partie antérieure de l'Humeur vitrée renferme toujours dans ses Cellules une Humeur aqueuse.



CHAPITRE VII.

De l'usage des différentes parties de l'Oeil, qui modifient les Rayons visuels.

TOUTES les parties qui composent le Globe de l'Oeil, concourent principalement à la Vision. Mais pour bien entendre comment elles y ont part, il est nécessaire de faire remarquer, que tous les

différens points des Objets éclairés renvoyent en tous sens la Lumière par une infinité de Lignes appellées Rayons , dont une partie passant au-travers des Humeurs , ou Corps transparens de l'Oeil , vont faire leurs impressions sur la Choroïde , d'où elles se transmettent jusqu'au Cerveau , par le moyen des Nerfs. Il faut observer que tous les Rayons , en passant au-travers des Corps transparens de l'Oeil , ne suivent pas leur première direction. En effet ; comme les surfaces & la consistance des Corps qu'ils traversent , sont différens , & que la plupart des Rayons tombent obliquement sur ces surfaces , ils doivent nécessairement se détourner en s'éloignant , ou en s'approchant de la Ligne perpendiculaire. Ces changemens de directions sont connus des Physiciens , sous les noms de Réfractions , qui sont telles que lorsqu'un Rayon de lumière tombe obliquement sur la surface d'un Corps transparent qui a plus de consistance que celui qui vient de traverser , pour lors il se rompt ou se détourne en s'approchant de la Perpendiculaire ; si au contraire le Corps transparent , sur la surface duquel il tombe , a moins de consistance que celui qui vient de traverser , pour lors il se détourne en s'éloignant de la Perpendiculaire. Ces changemens différens n'arrivent aux Rayons

yons de lumiere , que parce que leur passage au travers des Corps transparens , est d'autant plus libre , que ces Corps ont plus de consistance.

Nous avons dit que de chaque Point d'un Objet éclairé , par une infinité de Rayons de lumiere , qui s'étendent en tous sens. Ceux d'entre eux qui tombent sur la portion de la Cornée , qui répond à la Prunelle , feront un Cone , dont la pente est dans l'Objet , & la base sur la Cornée. Ces Rayons en traversant les Corps transparens de l'Oeil , y souffrent différentes réfractions , & par ce moyen , ils se rapprochent tous dans le fond de l'Oeil , & y forment enfin autant de petits Cones opposés aux premiers , & arrangés de maniere , que leurs bases répondent à celles des premiers , & que leurs pointes se terminent au fond de l'Oeil. On peut appeler les premiers , Cones objectifs , & les derniers oculaires. Les pointes des Cones oculaires tombant sur le fond de l'Oeil , représentent l'image de l'Objet. Les uns & les autres , par le concours de leur bases , forment , pour ainsi dire , des Faixceaux optiques , qui se croisent en divers sens , en traversant les Corps transparens de l'Oeil , principalement le Cristallin ; de sorte que les Cones objectifs d'un côté , produisent les Cones oculaires du côté op-

posé; par exemple, les objectifs supérieurs forment les oculaires inférieurs, & des oculaires du côté droit, partent les objectifs du côté gauche; tandis que les objectifs qui vont directement, ne souffrant aucune réfraction, font des Cones oculaires de la même direction. C'est ce croisement, & l'assemblage des differens Faix coniques, qui peignent l'image des Objets renversés dans le fond de l'Oeil. Les Phisiciens dépeignent ordinairement chacun de ces Cones par trois Lignes ou Rayons qui partent d'un point de l'Objet éclairé, s'écartent à mesure qu'ils s'avancent vers la Prunelle, & qui ensuite se rapprochent pour ne faire qu'un seul point dans le fond de l'Oeil, semblable à celui qui part de l'Objet; & pour ne point embarrasser leurs figures, ils n'expriment que trois Cones de la maniere que nous venons de dire qu'ils sont croisés, comme je l'ai expliqué. Il y en a qui se contentent d'exprimer chacun de ces Cones par une simple Ligne; de sorte que dans leurs figures, on ne voit que trois Lignes qui se croissent entre l'Objet, & le fond de l'Oeil.

Le plus ou le moins de convexité du Cristallin, fait que l'assemblage des Points des Cones oculaires tombe ou en-deçà, ou en-delà du fond de l'Oeil, & par conséquent, y produise des images confuses.

La trop grande convexité du Cristallin les assemble trop-tôt ; & les personnes qui sont dans ce cas, appelés Miopes, & se servent utilement de Lunettes concaves, dont la propriété étant d'écarter les Rayons de lumière, fait qu'ils ne s'unissent que dans la distance convenable. S'il arrive au contraire que le Cristallin ait peu de convexité, les Cones oculaires ne se réunissent pas assez-tôt. Ceux à qui cela arrive, sont appelés Presbites, & trouvent leur soulagement dans les Lunettes convexes, dont la propriété étant de rassembler les Rayons de lumière, fait qu'ils s'unissent dans la distance convenable.

La Prunelle se dilate par le moyen de ses Fibres rayonnées, pour recevoir beaucoup de lumière dans un jour foible, & dans une distance éloignée de l'Objet ; elle se resserre par le moyen de ses Fibres circulaires, pour y laisser entrer peu de Rayons dans un grand jour, & dans une distance prochaine de l'Objet.

Après avoir expliqué, en peu de mots, l'usage des Parties qui modifient les Rayons visuels, il faut passer à l'Organe immédiat de la Vision.



C H A P I T R E V I I I.

De l'Organe immédiat de la Vue , & des Principes pour connoître ses Altérations.

ON fait que les Phisiciens ont deux Opinions sur l'Organe immédiat de la Vue. Mr. Descartes & ses Sectateurs prétendent , que c'est la Retine qui reçoit l'impression de la Lumiere réfléchie des Objets éclairés ; & que par le moyen de ses fibres , elle se transmet jusqu'à l'endroit destiné pour la perception de l'Objet. Mr. Mariotte & plusieurs autres , prétendent au contraire , que c'est la Choroïde qui reçoit l'impression de la Lumiere , & que ses filamens nerveux , qu'ils disent être une production de la Pie-mere , la transmettent ensuite jusqu'à leurs origines.

Ayant acquis par la pratique des maladies des Yeux , certaines connoissances par rapport à la Vision ; j'ai reconnu par le seul examen des Altérations de la Vue , que la Retine n'étoit pas son Organe immédiat , comme on le verra ci-après , & qu'elle sert seulement à modifier le passage des Rayons lumineux , pour faire leurs impressions sur la Choroïde , dont les Filamens nerveux la

transmettent ensuite jusqu'au Cerveau , & qu'ainsi l'opinion de Mr. Mariotte abandonnée par plusieurs Physiciens est la meilleure. A la vérité , les raisons qu'il a avancées pour soutenir son sentiment , n'étoient pas assez fortes pour convaincre les Esprits les plus éclairés. Mr. Pecquet qui a prétendu renverser son opinion , l'a fait par des raisons si foibles , qu'elles laissent toujours un doute.

J'ai remarqué par un très grand nombre d'Observations , que les differens degrés de foiblesse de Vue , sont accompagnés de pareils degrés de foiblesse de mouvement de l'Iris ; desorte que par l'examen de ces mouvemens , j'ai presque toujours jugé infailliblement du degré de la Vue , sans que le malade m'en ait prévenu. De plus , j'ai remarqué que quand il y a perte de Vue , l'Iris demeure pour l'ordinaire , ou dilatée , ou rétreffie , sans aucun mouvement manifeste dans tous les degrés de lumière.

Pour découvrir la vérité de l'une ou de l'autre de ces Opinions sur l'Organe immédiat de la Vue , j'ai cru que ces Remarques de pratique ne suffisoient point pour donner assez d'éclaircissement au Public , sans y joindre quelque Expérience de Physique , & quelque Observation sur la structure de la partie. Pour cet

effet , j'ai choisi l'expérience suivante. Si on prend un Oeil , & après avoir ôté du derrière du Globe , à côté de l'entrée du Nerf optique , tout ce qui recouvre la Choroïde , de sorte que celle-ci demeurant en son entier , on expose dans un lieu obscur une Bougie allumée devant la Prunelle de cet Oeil , on la voit se peindre renversée sur la Choroïde ; & si on ôte ensuite au même endroit la Choroïde , sans déranger la Resine , & qu'on présente après cela la lumière comme ci-devant , on la voit se peindre sur un papier huilé , placé à environ deux lignes au-delà de la Retine.

Toute simple que soit cette Expérience , elle paroît prouver , comme j'ai déjà dit , que la Choroïde est l'Organe immédiat de la Vision , & que la Retine , par sa transparence , donne simplement un passage modifié aux Faisceaux des Rayons de lumière.

Ainsi , on pourroit comparer la Retine à une Glace de Miroir , qui ne fait que donner passage à la lumière : & la Choroïde , au tein qui reçoit les images des Objets au travers de la Glace , & sans lesquelles Objets ne se représenteroient point. La découverte suivante , qui montre une union étroite de la Choroïde avec le Nerf optique , confirme encore mon sentiment.

Si on fend le Nerf optique en deux , conjointement avec les Membranes du Globe de l'Oeil , on trouvera que la Choroïde est enchassée dans le Nerf optique , autour de la naissance de la Retine , par des lames très fines entremelée avec la substance du Nerf optique , ce que l'on distingue par la couleur différente ; cela paroît plus clairement dans l'Oeil de Bœuf , que dans celui de Cheval & de l'Homme. On voit même dans le Bœuf des traces de la Choroïde , dans celle de la Cornée opaque.

De plus , connoissant que la lumiere qui fait ses impressions sur la Choroïde , produit aussi dans l'Iris des mouvemens de dilatation , ou de constriction , j'ai cru que cette double opération ne pouvoit se faire que par le moyen de quelques Filamens nerveux , qui se distribuent conjointement à la Choroïde & à l'Iris. C'est ce qui m'a porté à examiner avec exactitude les Filamens nerveux qui partent du petit Ganglion lenticulaire , formé par l'union d'une branche de la troisième , & d'une de la cinquième Paire des Nerfs. Ce Ganglion produit plusieurs Filamens nerveux qui rampent autour du Nerf optique , percent ensuite la Cornée opaque , & se glissent entre cette Membrane & la Choroïde ; mais avant de se distribuer à l'Iris , ils se divisent en plusieurs Filamens , dont les

uns vont se perdre dans l'Iris , & les autres dans la Choroïde , où ils paroissent s'y épanouir à peu près de la même manière que les Nerfs cutanés aboutissent dans le tissu de la peau.

Cette distribution des Nerfs , jointe aux connoissances des mouvemens de l'Iris , m'ont porté à croire que la Choroïde est le principal Organe qui reçoit l'impression des Rayons lumineux réfléchis des Objets , & que c'est là , où les images se peignent de la manière que je l'ai expliqué.

Je regarde la Retine comme une espèce d'Epiderme , qui modifie cette impression , & amortit , pour ainsi dire , sa vivacité , qui , sans elle , causeroit autant de confusion sur cet Organe , qu'il en arriveroit sur ceux du Toucher , du Gout , & de l'Odorat , sans la Membrane fine , & uniforme qui les recouvre. En effet , la composition de la Retine , semble découvrir son usage ; puisqu'elle est transparente , & mollassé , & que la Lumière passe au travers , comme on l'a vu par l'Expérience que j'ai faite. Ainsi on peut croire que cette Membrane ne sert pas plus à la Vue , que l'Epiderme à la peau , pour le sentiment du Toucher. D'ailleurs , comme la Retine n'est que la substance moilleuse du Nerf optique , on a lieu de présumer qu'elle est incapable à raison de sa moles-

se , de transmettre au Cerveau l'impression des Rayons lumineux.

C'est sur cette correspondance de la Vue , avec les mouvemens de l'Iris , qu'est fondé principalement mon sentiment sur la Vision. En effet , ces differens mouvemens de l'Iris , qui suivent la force & la foiblesse de la Lumiere , semblent dépendre des differentes impressions que les lumineux font sur la Choroïde , qui ébranle en même tems les Filamens nerveux , qui partent du petit Ganglion commun de la troisieme & cinquieme Paire des Nerfs , & qui en allant à l'Iris , se ramifient sur la Choroïde ; de sorte que selon la force ou la foiblesse de l'impression de la Lumiere sur les Filamens de la Choroïde , les Nerfs de l'Iris communiquant avec ceux de la Choroïde , font en même tems plus ou moins mouvoir ses fibres ; savoir , les Rayonnées , pour dilater la Prunelle ; ou les Circulaires pour la rétreffir. Ainsi , il paroît que la Retine n'ayant aucune communication avec l'Iris , pour lui donner ces mouvemens , doit céder cet avantage à la Choroïde , dont l'Iris est une production.

Enfin , les differentes Observations que j'ai faites sur les mouvemens de l'Iris , m'ont déterminé à donner des Régles pour connoître la force , la foiblesse ou la perte entière de la Vue ; puisqu'il se trouve fort

34. TRAITÉ DES MALADIES

souvent des Maladies dans les Yeux , qui semblent ne pouvoir pas être apperçues ; parce que l'Oeil malade paroît sain comme l'autre. On en fait la difference & l'examen en fermant les deux Paupieres du Malade, & en frottant en rond le dessus de la Paupiere d'un Oeil avec un pouce : ensuite on ouvre cet Oeil exposé à la Lumiere , & on examine , si l'Iris a son mouvement de ressort en rétréchissant , ou en dilatant la Prunelle , & à quel degré elle a ce mouvement. Si c'est , par exemple , d'un quart de la moitié , ou point du tout. En renfermant l'Oeil sur lequel on a fait ces Observations , on ouvre l'autre , & on l'examine de la même maniere. Il n'y a qu'un quart de Vue dans l'Oeil , lorsque l'Iris n'a qu'un quart de mouvement de constriction ; s'il a la moitié de ce mouvement , l'Oeil n'a que la moitié de la Vue ; si la Prunelle se trouve entièrement dilatée , & que l'Iris n'ait aucun mouvement de constriction , la Vue de cet Oeil est ordinairement perdue.

Il y a une autre Règle dans un cas contraire ; savoir , lorsque la Prunelle se trouve rétrécie , & qu'étant examinée de même , on ne voit aucun mouvement dans l'Iris , ce qui est opposé à la dilatation dont je viens de parler. Dans le rétré-

cissement de la Prunelle , la Vue est perdue , comme dans sa dilatation ; & selon ce que l'Iris a de mouvement dans le dernier cas , on peut juger de la force , ou de la foiblesse de la Vue , comme dans le premier. Il faut remarquer que lorsque je parle du rétrécissement de la Prunelle , je n'entend pas qu'elle soit entièrement fermée , mais seulement en partie.

La cause de ces différens états de l'Iris vient d'une espèce de Paralysie de ses Muscles ; sa trop grande dilatation est une suite de Paralysie du Muscle circulaire ; & sa trop grande constriction a pour cause sa Paralysie du Muscle rayonné. On ne doit attribuer la cause générale de ces Paralysies , qu'à l'obstruction des Nerfs de la Choroïde , qui donnent le mouvement à ces petits Muscles , par la communication qu'ils ont avec leurs Nerfs.

Il arrive , quoique rarement , que la Prunelle se trouve presque sans mouvement , tant dans sa dilatation , que dans sa constriction , & que néanmoins la Vue subsiste , quoique foible. Il faut remarquer dans ce cas , qu'il y a Paralysie des Filamens nerveux de l'Iris , & que l'impression de l'Objet se porte au Nerve optique , par le moyen de son union étroite avec la Choroïde. J'ai toujours observé que la Paralysie de la Choroïde entraîne

36 TRAITÉ DES MALADIES

avec elle celle de l'Iris , & que la Paralysie des filets nerveux de l'Iris , n'endommage point la Choroïde , quoique la Vue se trouve foible dans ce dernier cas ; ce qui me paroît venir que de la trop grande dilatation , ou constriction de la Prunelle , qui admettant , ou trop , ou trop peu de rayons , empêche la perfection de la Vision.



CHAPITRE IX.

Des trois sortes de Vues.

ON divise communément la Vue en trois espèces ; savoir , en bonne Vue , en Vue de Miopes , & en Vue de Presbites.

La bonne Vue , est celle par laquelle on voit bien à lire à un pied de distance. Dans cette Vue , le Cristallin est dans sa perfection ; on distingue de loin , comme dans la Presbite , mais moins finement. Cette Vue a trois degrés ou Foyers ; le premier , est d'un demi-pied ; le second , est d'un pied ; & le troisième , un peu plus.

La Vue des Miopes a le Foyers fort court ; ils voyent distinctement de près , il leur faut même peu de lumière pour lire ; mais de loin ils voyent trouble , & n'appërçoivent pas les Objets à une cer-

taine distance peu considérable. On attribue la cause de cet état de Vue au Cristallin qui est trop vouté.

Il y a dans les Miopes trois degrés ou Foyers principaux. Les uns ne voyent à lire qu'en approchant l'Objet contre le Nez ; les autres le tiennent à deux ou trois travers de doigt plus loin. Il y en a enfin , qui éloignent l'Objet d'un demi-pied & même plus. Lorsque les Miopes veulent distinguer quelque objet éloigné, ils ont besoin de Lunettes concaves.

La Vue des Presbites a le Foyer fort long ; ils voyent distinctement de loin, & trouble de près ; on attribue la cause de cet état de Vue au Cristallin trop applati. Elle a aussi trois degrés ou Foyers ; le premier , est à un pied & demi de distance ; le second , est à deux & demi ; le troisième est plus étendu ; c'est pourquoi ils ne sauroient lire de près sans Lunettes. Cette Vue est ordinaire aux Vieillards ; & elle est entièrement opposée à celle des Miopes qui voyent bien de près , & trouble de loin.

De ces trois espèces de Vue , il y en a deux qui varient. La bonne se change quelquefois en Miopes , sur-tout aux personnes qui lisent beaucoup , ou qui s'appliquent aux Ouvrages fins ; elle est sujette à se changer en Presbite dans un

âge avancé. La Vue des Miopes ne se change jamais ni en bonne , ni en Presbite ; celle des Presbites se change souvent en bonne Vue. Ces différentes variations de Vues , n'arrivent que par les différens changemens , dont la convexité du Cristallin est susceptible. Quand le Suc nourricier qui doit servir à entretenir cette convexité , est assez fluide pour passer jusques dans les extrémités des Vaisseaux les plus fins du Cristallin , il entretient son état parfait ; si au contraire ce Suc est plus épais , il ne peut pas s'y insinuer si abondamment ; c'est pourquoi sa convexité s'affaisse plus ou moins , selon les différentes qualités du Suc.





LIVRE I. DES MALADIES DE L'OEIL.

CHAPITRE I.

*De l'Anchilops , ou Abscès du
grand Angle.*

L'ANCHYLOPS est une tumeur
située au grand Angle de l'Oeil,
presque toujours au-dessous de
l'union des Paupieres , qui dé-
génere en Abscès ; il en est de
deux sortes l'une avec douleur , & l'autre
presque sans douleur.

Celui qui est avec douleur est souvent
accompagné de Fievre très-violente , qui
continue jusqu'à ce que la matiere formée
ait trouvé issue.

L'Anchilops où il y a peu de douleur ,
est ordinairement sans Fievre ; l'élévation
du grand Angle est petite , la couleur de
la peau n'est même que peu changée.

Cette Tumeur est produite par plusieurs
causes ; premierement , par la Lymphes qui
passe de l'Oeil, dans le Nez, par les Points

lacrimaux. En effet , si cette liqueur qui doit enfler ces petits Canaux , vient à aquerir quelque qualité vicieuse , ou que les parties par où elle doit passer se bouchent , elle deviendra par son séjour nécessairement la cause d'un Abscès au grand Angle.

Cette Lymphes s'altère en deux manieres : la premiere , lorsqu'à raison de son acrimonie , elle ronge les parois intérieurs du Sac lacrimonial ; & par-là occasionne un suintement de matiere purulente , laquelle entrant dans le Conduit lacrimonial , le bouche ; la Lymphes lacrimoniale trouvant ainsi son passage intercepté , remplit le Sac , le gonfle , & en fait élever la portion supérieure , ce qui se connoît par une éminence au-dessous de l'union des Paupieres ; de sorte qu'en pressant cette élévation , la matiere regorge par les Points lacrimaux.

L'épaississement , ou la viscosité qui survient à la Lymphes lacrimoniale , est la seconde façon dont elle s'altère. Pour lors ne pouvant passer par le Conduit nasal , elle séjourne dans le Sac lacrimonial , d'où dépend son élévation pareille à celle dont je viens de parler ; avec cette difference néanmoins , qu'en pressant la Tumeur , la liqueur s'échappe par le Nez , ce qui n'arrive point dans la Tumeur qui dépend de la premiere cause.

Quelquefois il n'y a aucun vice dans la Lymphé lacrimale , mais il survient une inflammation aux Membranes qui forment le Conduit lacrimonal ; pour lors ce Conduit se trouvant bouché par le gonflement de son Tissu spongieux , la serosité séjourne dans le Sac lacrimonal , s'aigrit & excorie ses parois , d'où résultent les mêmes accidens dont je viens de parler.

La plénitude du Sac lacrimonal par le séjour de la Lymphé , soit qu'elle s'échappe par le Nez ou par l'Oeil , étant pressée avec le doigt , est appelée Hidropisie par quelques-uns ; mais ce nouveau nom ne convient pas assez à cette Maladie , puisque toute Hidropisie suppose l'épanchement d'une liqueur dans une cavité , d'où elle n'a point d'issue. Or , dans le cas dont il s'agit , la matiere contenue dans le Sac lacrimonal sort aussi-tôt qu'il est comprimé ; il arrive même dans la plupart des Malades , que la lymphé trouve issue d'elle-même par le Nez pendant le sommeil ; de sorte que le matin le Sac se trouve vuide , mais trois heures après le lever des Malades , le Sac se remplit ; c'est pourquoi il font obligés de le vuider. Il semble par cette Observation , que pendant que le Malade est debout , le Sac fait un pli qui bouche son Conduit inférieur.

Lorsque le Sac lacrimonal se trouve rem-

pli de la maniere que je l'ai marqué ci-dessus , & que la liqueur qu'il contient , est si épaisse , qu'elle ne peut sortir , ni par les Points lacrimaux , ni par le Conduit lacrimal , elle devient la cause d'une Inflammation violente , qui dégénere en Abscès , & fait la Maladie dont nous parlons.

Les signes de l'Anchilops formé , sont suffisamment démontrés , par ce que j'en viens de dire ; mais il est difficile de le connoître dans ses commencemens. Cependant le cours des Larmes venant à cesser par leurs voies ordinaires , ou à passer avec moins de facilité , on apperçoit une Humeur limoneuse au grand Angle , accompagnée d'une légère Inflammation , de Cuison , ou Démangeaison , & Larmolement ; Simptômes qui arrivent dans la plupart des Fluxions.

Lorsqu'en pressant sur le grand Angle de l'Oeil , on voit sortir une Liqueur blanchâtre par les Points lacrimaux , ou que l'élévation du Sac lacrimal se manifeste , on doit craindre que la Liqueur contenue dans cette Poche ne s'aigrisse , & qu'elle ne soit suivie d'Abscès.

Tous les Abscès du grand Angle dégénèrent ordinairement en Fistule lacrimale , & quelquefois en Cancer , lorsque l'Humeur qui les produit est maligne.

Il faut bien distinguer si l'Abcès communiqué dans le Sac lacrimonal, ou s'il n'est que superficiel entre la Peau & le Muscle orbiculaire ; dans ce dernier cas, il n'est nullement à craindre qu'il dégénère en Fistule, à moins que la matière se trouve entre le Muscle & le Sac.

Lorsqu'on s'apperçoit par les Signes précédens, que la Lymphé s'embarrasse dans le Sac lacrimonal, il faut y remédier de bonne heure, de crainte que la Maladie ne devienne plus grande ; c'est pourquoi on doit faire saigner le Malade, & lui faire prendre tous les matins un Bouillon fait avec le Veau, le Cerfeuil, la Buglosse, la Bourache, la Chicorée, & les Ecrevisses ; & on aura soin de le purger de tems en tems. On peut faire usage de Bains domestiques & d'autres Remedes capables de changer la disposition de la Lymphé. C'est ici principalement que convient l'usage des injections par les Points lacrimaux ; mais il faut remarquer, que quand le Sac est considérablement dilaté, on doit le comprimer un peu avec le doigt pendant qu'on seringue ; sans quoi l'Injection loin d'être utile, deviendroit pernicieuse, en ce que la liqueur qu'on pousse dans le Sac, le dilateroit encore davantage sans cette précaution.

Après que l'on s'est servi de la Seringue

cinq ou six jours , si la liqueur injectée par les Points lacrimaux ne tombent pas dans la Gorge , ou qu'elle ne passe point par le Nez , son usage devient inutile , ce qui me confirme qu'elle ne convient que dans les simples embarras du Sac , & non dans la Fistule lacrimale.

Le bandage qui comprime le Sac lacrimonal dans son élévation est plus efficace que la Seringue , d'autant qu'il pousse continuellement la liqueur vers son ouverture inférieure. On se sert en même tems de l'Eau de la Reine d'Hongrie , pour frotter extérieurement l'élévation trois fois le jour.

On lavera le dedans de l'Oeil avec du Vin chaud , dans lequel on aura mis quelques gouttes du Baume du Commandeur de Pernes. On mettra tous les soirs sur le grand Angle une Compresse trempée dans ce Vin. Il y en a qui guérissent par cette pratique , lorsque l'obstruction du Conduit lacrimonal est peu considérable , & que l'Os Unguis n'est point altéré.

L'Abbé de Grace guérissoit quelquefois les Fistules & les Abscess du grand Angle avec son Emplâtre. Il en mettoit un qui couvroit tout l'Oeil , & le faisoit porter pendant un mois , ayant soin d'essuyer l'Oeil soir & matin , & de mettre un nouvel Emplâtre tous les jours.

Lorsqu'il survient dans l'un des cas ci-dessus une Inflammation au Sac lacrimonal, quand même elle seroit produite par un dépôt qui se fait sur cette partie, on doit avoir soin de saigner le Malade, & d'appliquer des Remèdes capables de prévenir l'augmentation du dépôt. On peut se servir pour cet effet de la Moelle de Pomme cuite mêlée avec le blanc d'Oeuf, ou bien moitié Cassie mondée, & moitié Pomme cuite mêlée ensemble. Lorsque l'abcès est percé, si l'Os Unguis n'est point altéré, on guérira l'Ulcère avec l'Emplâtre de l'Abbé de Grace, ayant soin de purger le Malade suivant la nécessité. Lorsque l'on juge que la matiere contenue dans le Sac lacrimonal s'est changée en pus, il ne faut pas attendre qu'elle se fasse jour d'elle-même, parce que son séjour pourroit causer une Carie aux Os voisins; c'est pourquoi on en fera l'ouverture avec une lancette, en observant la direction des Fibres du Muscle orbiculaire, & on pansera la Playe avec l'Emplâtre de l'Abbé de Grace.



CHAPITRE II.

De l'Ægilops ou Fistule lacrimonale.

QUOIQUE l'on entende en général par le mot de Fistule, un Ulcère

4 TRAITÉ DES MALADIES

plus ou moins profond , dont l'entrée est étroite , & le fond large , accompagné de Callosité dans toute son étendue ; l'Expérience fait voir cependant que l'Ulcere du grand Angle nommé Fistule lacrimale , quelqu'ancien qu'il soit , se trouve rarement avec Callosité ; encore n'est elle que dans la portion de la peau du Muscle orbiculaire qui recouvre le Sac lacrimal.

On peut dire que la Fistule lacrimale est une Ulcération du Sac lacrimal , accompagnée quelquefois de celle de la peau qui le recouvre , ou de l'altération des Os qui l'entourent ; & souvent sans que la peau ni les Os voisins se trouvent altérés.

On voit par-là , qu'on peut établir en général deux sortes de Fistules lacrimales : la premiere est accompagnée de l'Ulcération de la peau , & appelée Ouverte ; la seconde , où la Peau n'est point ulcerée , est nommée Fistule Bornée ou Cachée , dans laquelle on voit quelquefois une éminence à l'endroit du Sac lacrimal ; & d'autres fois il n'en paroît aucune , ce qui a donné lieu d'appeller aussi cette dernière Fistule Platte.

Lorsque la Liqueur qui séjourne dans le Sac lacrimal n'a point d'acrimonie , l'os *Unguis* ne se trouve point altéré ; mais au contraire si les Malades portent depuis long-tems leur Fistule , la matiere s'aigrit

dans le Sac, en ronge les parois, carie l'Os *Unguis* & l'Os Maxillaire, s'écoule enfin jusqu'à la partie inférieure de l'Orbite qu'elle altère très-souvent. Je nommerai cette dernière espèce, Fistule compliquée.

Dans cette Maladie, il survient de tems en tems une Inflammation au grand Angle, qui se communique quelquefois à tout l'Oeil. Cette Inflammation arrive lorsque l'Humeur qui cause la Fistule devenant plus âcre & plus maligne, irrite l'Oeil, en regorgeant par les Points lacrimaux.

Ces Fistules jettent plus de matière en certains tems qu'en d'autres, souvent elles n'en rendent que très-peu, & quelquefois elles en rendent beaucoup. Ces accidens varient, selon que le sang se trouve plus ou moins vicié.

On doit admettre ici pour causes des Fistules lacrimales toutes celles que nous avons dit occasionner l'Anchilops; car nous savons que plusieurs de ces Fistules en sont des suites. On en voit outre cela qui succèdent aux Maladies Vénériennes, au Scorbut & aux Ecouelles; on en voit enfin, qui sont la suite de la petite Vérole.

On connoît la Fistule lacrimale borgne, si en pressant l'endroit du grand Angle qui répond au Sac lacrimal, on voit sortir une matière purulente par les Points lacrimaux

& on connoitra par la qualité de la matière qui en sortira , s'il y a Carie. En effet , si le Pus est verdâtre ou noirâtre , c'est une preuve que les Os sont considérablement altérés ; & si le pus est abondant , quoique louable , quand même il n'y auroit point de Carie à l'os , il y en surviendra bientôt. On jugera aisément de la Fistule lacrimale ouverte par la Sonde & par la qualité de la matiere qui en sort.

Quant au Pronostic de la Fistule lacrimale , lorsque les personnes affligées de cette Maladie ont des Fluxions fréquentes , elle est difficile à guérir , non seulement à raison de l'acrimonie de l'Humeur , mais encore par la multiplicité des Sinus qui accompagnent presque toujours la Fistule. Si au-contraire les Malades sont exemts des douleurs & des récidives fréquentes de Fluxions , & que la matiere qui coule de la Fistule soit peu abondante & bien conditionnée , la Guérison en est moins difficile. Les Fistules qui procèdent d'un Levain écrouelleux , vénérien , &c. ne peuvent être guéries qu'en détruisant les mauvais Levains qui les entretiennent.

Pour la Guérison de la Fistule lacrimale , si elle est borgne , on peut tenter pendant quelques jours l'usage des Injections par les Points lacrimaux ; mais si elles ne réussissent

réussissent point , on doit faire l'ouverture du Sac , & injecter par cette ouverture ; après quoi on appliquera sur la Fistule l'Emplâtre de l'Abbé de Grace , que l'on continuera jusqu'à Guérison , si les Os voisins ne sont point cariés ; car pour lors il en faut venir à l'Opération que nous décrirons ci-après.

Tous ceux qui ont fait l'Opération de la Fistule lacrimale depuis les anciens jusqu'aux Modernes , ont cru que sa Guérison dépendoit de la destruction de l'Os *Unguis* carié. Les premiers , pour éviter l'érailement de la Paupiere inférieure , dont ils attribuoient la cause à la perte du Tendon du Muscle orbiculaire , ont toujours fait l'ouverture de la Fistule au-dessous de ce Tendon. Parmi les Modernes , les uns suivent la Méthode des Anciens , les autres prévenus que l'incision du Tendon de l'orbiculaire n'a aucune part à cet érailement , ne font aucune difficulté de le couper , lorsque l'étendue de la Carie les oblige à le faire.

Les uns & les autres ayant découvert l'Os *Unguis* , travaillent à en détruire la Carie par le Bouton de feu qu'ils appliquent deux ou trois fois au travers de la Canulle. Ils sont satisfaits de leur Opération , lorsqu'ils apprennent des Malades qu'ils sentent dans le Nez une odeur de

brulé , ou qu'il s'écoule par la narine du sang ou des sérosités. Ensuite ils pansent la Plaie avec des Tentés assez longues à la vérité pour entretenir le commerce qu'ils ont établi entre le Nez & la Fistule. Mais le peu de soin qu'ils ont d'entretenir la longueur & la grosseur de la Tente , jusqu'à ce que les parois du nouveau Conduit soient cicatrisés , rend souvent leur Opération inutile ; parce que les Larmes entrant toujours dans les Points lacrimaux , sans trouver issue par le Nez , elles ne sont pas long-tems à produire un nouveau mal , presque aussi grand que le premier.

Il y a plusieurs inconvéniens qui accompagnent cette Opération ; le premier est , qu'en faisant l'incision au-dessus du Tendon de l'orbiculaire , on peut couper l'Arrière Angulaire , principalement en opérant une Fistule plate. Le Malade pour lors court risque de perdre la Vue , comme on l'a vu arriver , si le Chirurgien n'observe de ne point comprimer le Globe de l'Oeil dans l'application de l'Appareil qu'il est obligé de mettre au grand Angle , pour arrêter l'Hémorragie que l'ouverture de l'Arrière occasionne.

Le second inconvénient est l'érailllement de la Paupière inférieure , qui arrive par la destruction de la Peau qui unit les deux Paupières , soit qu'elle soit occasionnée

par l'action de la matiere qui s'écoule de l'Ulcere , ou par la chaleur du Cautere dont on s'est servi pour la Carie.

Le troisiéme inconvenient est le Larmolement qui suit toujours l'Opération , où l'on n'a pas eu soin d'entretenir le commerce établi entre l'Oeil & le Nez. En effet , il est aisé de voir que la Glande lacrimale fournissant continuellement sa Lymphes , & les Points lacrimaux ne pouvant s'en décharger à raison de la Cicatrice de l'extrémité de leur conduit , il faut nécessairement que cette Liqueur s'écoule sur les joues.

Quand on veut entreprendre l'Opération de la Fistule lacrimale , il est nécessaire d'y préparer le Malade. Cette préparation doit être différente , selon que l'Humeur qui cause la Fistule est plus ou moins viciée. Car si la matiere qui en sort est peu abondante , & qu'elle soit louable , qu'il n'y ait point de récidives fréquentes de Fluxions , la Saignée & la Purgation sont seules suffisantes pour cette préparation : mais si au-contraire l'Humeur qui en sort excite par son acrimonie de fréquentes Fluxions à l'Oeil , il faudra une préparation plus ample , & corriger tous ces accidens avant d'en venir à l'Opération. Dans ce cas , outre la Saignée & la Purgation , il sera nécessaire de faire user d'un Regi-

me exact au Malade , qui consiste à ne boire point de Vin , à prendre tous les matins un Chopine de Petit-lait mêlé avec du Sirop violat , pendant quinze jours ou trois semaines. On est quelquefois obligé de mettre le Malade dans le Bain domestique , & de réitérer plusieurs fois la Saignée & la Purgation , jusqu'à ce que l'Oeil n'ait plus aucune rougeur ; d'autant que si on venoit à travailler à cette Opération pendant que le sang est âcre & vicié , on donneroit occasion à un dépôt sur l'Oeil , qui pourroit le faire abcéder , ou y attirer d'autres accidens plus fâcheux encore que la Fistule.

Lorsque le Malade sera ainsi préparé , on en viendra à l'Opération. Si la Fistule est ouverte , & que l'ouverture ne soit point assez grande , on la dilatera avec l'Eponge préparée , le Bistouri ou la Lancette , selon que l'on jugera à propos.

Si la Fistule est borgne , on fera son Incision au-dessous du Tendon du Muscle orbiculaire ; à moins que la Poche qui renferme la matiere ne fasse une éminence qui s'étende au-dessus de ce Tendon. Pour lors , il faudroit commencer son Incision dans cet endroit , & la continuer en bas , jusqu'environ trois lignes au-dessous de ce Tendon , en donnant à cette Incision la forme d'un Croissant , dont la partie convexe répondra au Nez , & la con-

cave à l'Oeil , & dont le milieu enfin répondra au Tendon de l'orbiculaire , en s'éloignant le plus qu'on pourra de l'union des Paupieres. Si la matiere ne paroît être qu'au-deffous du Tendon , on se contentera de faire une Incision avec la Lancette , en commençant immédiatement au-deffus du bord de l'Orbite , en enfonçant la Lancette dans le Sac , & en dilatant la playe obliquement de bas en haut , ce qu'on continuera , jusqu'à une ligne de distance du Tendon ; & on y mettra ensuite une Eponge preparée jusqu'au lendemain pour arrondir le trou. On prend alors ses mesures avec le Stilet pour reconnoître le bas de l'Os *Unguis* alteré ; l'ayant reconnu , on tiendra le Stilet ferme sur l'endroit , & on introduira la Canulle par le haut de ce stilet , la faisant descendre jusqu'à l'extrémité où il porte.

Ayant bien assuré la Canulle , il faut retirer le Stilet , & prendre le Bouton de feu , que l'on fera passer dans la Canulle le plus vite qu'il sera possible , en l'appuyant sur l'endroit qu'on voudra cauteriser. Aussitôt que l'Os est percé , il faut retirer le Bouton de feu & la Canulle presque en même tems. Si le sang coule par le Nez , c'est une preuve que l'Opération est bien faite ; aussi bien que si l'Air sort par la playe , lorsque le Malade serre le Nez , & fait en

54 TRAITÉ DES MALADIES

même tems des efforts pour se moucher.

On y met une Tente d'une longueur suffisante , pour passer au-delà de l'ouverture faite à la Membrane qui recouvre la partie intérieure , ou inférieure de l'Os *Unguis* , & un Emplâtre par-dessus , avec une Compresse trempée dans un Collire rafraîchissant sur l'Oeil.

Si l'on étoit obligé de faire l'incision au-dessus du Tendon du Muscle orbiculaire , comme la partie supérieure de l'Os de la Machoire est pour l'ordinaire cariée , on est obligé avant de percer l'Os *Unguis* , de porter deux ou trois fois le Bouton de feu sur cette partie de l'Os Maxillaire altéré ; ensuite , on appliquera le Bouton de feu sur l'Os *Unguis* , à l'endroit ci-dessus marqué. On pansera le Malade comme je l'ai dit. Le lendemain , il faut lever l'Emplâtre , essuyer la plaie , & y en mettre un nouveau. Le troisieme jour , on retirera la Tente , & on aura un Tuyau de plume ouverte par les deux bouts pour l'introduire dans la Playe , jusque sur l'Os que l'on a percé. Il faut une autre Tente dont on trempera l'extrémité dans un Caustic liquide , & on l'introduira dans le Tuyau de Plume , jusqu'à ce que l'endroit trempé dans la liqueur passe dans le trou de l'Os *Unguis* , & aille se rendre sur le Palais. On retirera le Tuyau qui a servi

à défendre l'Oeil & le Sac lacrimonal de l'action du Caustic , & on remettra l'Emplâtre. Le lendemain , on y mettra une Tente plus grosse , & on continuera à l'augmenter jusqu'à ce qu'on en puisse introduire une un peu moindre qu'une grosse Plume à écrire.

Quand on est parvenu à ce point , on continue à panser la playe , & à y mettre des Tentés , jusqu'à ce que l'on juge non seulement que les Os soient exfoliés , mais encore , qu'il se soit formé une Membrane sur toute la circonférence intérieure du nouveau Canal. On retire pour lors la Tente , & on laisse refermer la playe extérieure. Par ces Moyens , l'Oeil demeure en tel état , qu'il y a des personnes auxquelles on ne sauroit presque s'appercevoir qu'elles aient eu de Fistule lacrimonale.

L'Ouverture que l'on fait à la Peau & au Muscle orbiculaire , pour entrer dans le Sac lacrimonal , ne doit avoir que le moins d'étendue qu'il est possible ; car en ayant trop , elle laisse toujours une Cicatrice désagréable. D'ailleurs , une longue Incision ne sauroit jamais donner un plus grand jour à la partie interne du Sac qui touche l'Os *Unguis* , le bord de l'Orbite s'y opposant. Je dirai même de plus , que ce qui a été coupé pour allonger l'Incision , se refermera en peu de tems , & il ne res-

tera d'ouverture que ce que la Tente peut en entretenir par sa grosseur. Mais si on est obligé de faire l'Incision au dessus du Tendon, il est de nécessité qu'elle soit plus longue, à cause des deux endroits où il faut appliquer le Bouton de feu.

A l'égard des Fistules compliquées, c'est à dire celles où la Carie s'étend jusques sur la partie inférieure de l'Orbite, il faut faire tomber la portion de l'Os alteré par l'exfoliation. Pour cet effet, on prendra un Tuyau de Plume de la grosseur de la Tente, & dont le bout inférieur ne sera point ouvert, & on y façonnera une échancrure large d'une ligne, qui répondra à l'Os que l'on veut consumer. On mettra ensuite dans le Tuyau de cette Plume un morceau d'Eponge préparée, trempée dans le Caustic liquide, & on introduira cette Plume au-lieu de Tente. Ainsi l'humidité faisant enfler l'Eponge, la fera avancer par l'échancrure de la Plume, vers l'Os carié. Si la première fois, il n'en résulte pas tout l'effet que l'on en espere, on le réitérera pour qu'il se fasse un Conduit depuis l'endroit où étoit la Carie de cet Os, jusqu'à celui que l'on a fait dans l'Os *Unguis*. Par Cette Méthode, on évitera le danger qu'il y auroit d'y porter le Bouton de feu; ce qui ne pourroit se faire sans toucher au Globe de

l'Oeil , d'où s'ensuivroit la perte de cet organe.

L'intention que l'on doit avoir dans l'Opération de la Fistule lacrimale étant de détruire la Carie , & de faire un nouveau Canal qui supplée au naturel qui est obstrué , il faut remarquer que ce n'est pas assez d'avoir fait un Conduit par l'Opération ; il faut faire enforte qu'il subsiste , après que la playe extérieure sera refermée. Ainsi on doit bien prendre garde avant d'ôter les Tentés qui entretiennent l'ouverture , qu'il se soit fait une espece de Peau ou Membrane dans toute l'étendue du nouveau Conduit , comme nous avons déjà dit.

Quoique j'aye fait de mon mieux pour décrire le plus clairement qu'il m'a été possible la maniere de réussir dans cette Opération , ce ne sera cependant une chose facile qu'à ceux qui connoissent la Structure de ces Parties ; car dans cette Opération on n'y voit point , il n'y a que la Sonde , le bon Jugement , & la connoissance parfaite de la Structure de la Partie qui y servent de Guide. D'ailleurs les Os ne sont pas dans tous les Sujets d'une même forme , ni dans la même situation , y ayant toujours quelque chose de plus ou de moins.



CHAPITRE III.

Des Fistules des Paupieres.

OUTRE la Fistule lacrimale, il y en a d'autres qui attaquent les Paupieres en differens endroits. Quelques-unes viennent au-dessous du Globe de l'Oeil après un Abcès. De plus, lorsqu'il se trouve une Tumeur scrophuleuse sur la partie inférieure de l'Orbite du côté du petit Angle, cette Tumeur venant à abcéder, la matiere qu'elle contient, carie l'Os où elle répond; & après que la matiere est sortie, la Plaie devient Fistule, si on n'a soin de faire exfolier l'Os carié.

Les Fistules des Paupieres suivent les Abcès qui se font entre le Muscle orbiculaire & la Peau. Ces Abcès sont de deux sortes, ou petits ou grands. Lorsqu'ils sont petits, ils proviennent d'un Orgeolet qui abcède entre le Cartilage & la Peau qui le recouvre, dont la matiere se fait jour en perçant le bord de la Paupiere, entre les Racines des Cils qui les salit d'une Boue qui en suinte continuellement & s'y attache. L'ouverture de cet Abcès étant petite, la matiere séjourne dans une Poche qui à peine pourroit contenir une lentille, quelquefois moins, ce qui la rend à la fin

fistuleuse , & laisse toujours l'endroit de cette Paupiere enflé.

Pour guérir ces fortes de Fistules , il faut tremper le bout d'une Plume taillée en Curedent dans un Caustic liquide , & l'introduire dans la Fistule pour en toucher le fond. Il s'y fait par-là une Escarre qui agrandit son ouverture , & qui détruit la Callosité. Après que l'Escarre est tombée , les chairs renaissent , d'où suit la guérison.

Les Fistules qui sont plus grandes , viennent dans les Paupieres par un Abcès qui se forme depuis le grand Angle , jusqu'au milieu de la Paupiere. La matiere étant formée , elle se fait jour par les Points lacrimaux ; de sorte que le pus qui en coule continuellement diminue la grosseur des Paupieres ; mais il y reste une poche qui y fournit toujours de nouveau pus , ce qui rend cette Plaie fistuleuse , & entretient une Optalmie opiniâtre au Globe de l'Oeil.

Ce cas est arrivé à une Dame de considération , à qui je fis l'Opération en présence de Messieurs le Dran & Arnault , célèbres Chirurgiens de Paris. Cette Dame , eut une Erésipelle sur la Paupiere supérieure , accompagnée d'enflure à cette Paupiere , & de rougeur à la Caroncule lacrimale , & à la Conjonctive. L'Eré-

60 TRAITÉ DES MALADIES
sipelle suppara & dégénéra en Abscès, qui
s'étendoit depuis le milieu de la Paupie-
re, jusqu'au Nez, au-dessus de l'union
des deux Cartilages. La matiere se fit jour
par le Point lacrimon supérieur: de sorte
qu'une partie passoit par ce trou, tandis
que l'autre descendoit jusqu'au Canal
commun, pour remonter ensuite par le
Conduit qui répond au Point lacrimon in-
férieur, & sortoit ensuite par l'ouverture
de celui-ci. J'eus d'abord beaucoup de
peine à découvrir la route de cette matie-
re. Mais quelque tems après en seringuant
par le Point lacrimon supérieur, & diri-
geant le Canon de ma Seringue vers l'en-
droit où avoit été l'élévation, je m'apper-
çus que l'eau remplissoit toute la cavité,
ce qui me fit connoître qu'il y avoit une
Fistule, & me détermina à l'ouvrir par-
dessus la Paupiere, le plus près du Carti-
lage qu'il me fut possible. Je seringuai en-
suite par l'ouverture que j'avois faite, &
je reconnus que l'eau entroit par le Conduit
lacrimon supérieur, & passoit par le Nez.
Je mis une Tente d'éponge préparée pour
entretenir l'ouverture, & pour mieux dé-
couvrir toute la Poche. Il se perdit un
fragment de l'Eponge, qui quelques jours
après ressortit par le Point lacrimon infé-
rieur.

Je portai la Sonde dans toute l'étendue

de la Poche pour la reconnoître , & je coupai depuis mon ouverture jusqu'à son extrémité qui alloit vers le milieu de la Paupiere. J'en fis autant du côté du Nez, la poche étant ouverte dans toute sa longueur. J'emportai avec des Ciseaux fins toute la Peau qui la recouvroit , en commençant depuis le haut , jusqu'au-dessus du grand Angle , & je fis en sorte que cette seconde Incision en approchant du Nez , laissât environ une ligne de distance de la première ; je levai ensuite la portion de la Peau , qui avoit été coupée , avec une Pincette , & je la coupai avec la pointe des Ciseaux vers le Nez , afin que les extrémités des deux Levres ne pussent se recoller ensemble , que lorsque le fond de la Fistule seroit guéri. J'appliquai le lendemain la Pierre infernale sur le fond de la Fistule , & la Callosité se trouva consumée ; la Plaie fut guérie avec le Baume vert de Feuillet , & l'Emplâtre de l'Abbé de Grace. Peu de jours après , tous les accidens cessèrent , & la Fistule fut guérie.

Pour ce qui est des Fistules qui se trouvent sous le Globe de l'Oeil , j'ai traité il y a quinze ans un Garçon de Versailles , qui vint à Paris , après avoir eu un Abscess sous le Globe de l'Oeil , dont la matiere s'étoit faite jour par une ouverture au milieu de la Paupiere inférieure. Je reconnus

62 TRAITÉ DES MALADIES

en introduisant ma Sonde par cette ouverture, que le séjour du Pus sous le Globe de l'Oeil avoit carié l'Os qui fait la partie inférieure de l'Orbite. Le Pus couloit dans le Sinus de l'Os maxillaire, & ressortoit par le Nez. Comme cette route étoit un peu difficile, & que le Pus pouvoit séjourner dans le fond de ce Sinus, & le carier, je lui fis arracher une des Dents molaires, dont la Racine porte quelquefois jusqu'à ce Sinus. Je seringuai soir & matin par l'ouverture de la paupiere une Décoction d'Aristoloché, de Gentiane & de Mirrhe. La Liqueur tomboit du Sinus dans la Bouche par l'ouverture de la Dent. Ce Malade fut guéri de sa Fistule au bout de deux mois, par l'usage de ces Remedes.

J'ai vu deux Fistules produites par des Humeurs froides. La première arriva à un Enfant à la suite d'une Tumeur scrophuleuse, située à la partie extérieure de l'Os de la Pomette, qui forme la partie inférieure de l'Orbite du côté du petit Angle. La Tumeur s'étoit abcédé, & la matière s'étoit faite jour d'elle-même par une ouverture fort petite, que l'on avoit tâché de fermer, mais inutilement; enfin les Parens me manderent, & ayant reconnu que l'Os étoit carié, je dilatai l'ouverture pour pouvoir appliquer plus aisément le Bouton de feu, auquel je fis succéder l'u-

sage de l'Esprit de vin Camphré. Quelque tems après la portion de l'Os qui étoit cariée se sépara , & le Malade guérit parfaitement.

L'autre Fistule vint aussi à la suite d'une Tumeur scrophuleuse , dont la matiere se fit jour d'elle-même en perçant la Peau & le Muscle orbiculaire , & l'Os se trouva carié. Le Malade étoit entre les mains d'un autre Chirurgien ; ainsi ne l'ayant point traité , je n'en dis que ce que j'en ai vu.



CHAPITRE IV.

De l'Orgeolet , de la Grêle & Gravelle des Paupieres.

L'ORGEOLET est une Tumeur plus ou moins étendue , qui naît en différens endroits des Paupieres. On le nomme vulgairement Orgueilleux. Lorsqu'il est petit , il n'attaque que l'extrémité des Paupieres entre les Cils , ou fort près ; lorsqu'au contraire il a plus de volume , il s'étend vers le milieu de la Paupiere. Ces Tumeurs sont pour l'ordinaire accompagnées d'Inflammation dont leur commencement ; & lorsqu'elles ne suppurent point , cette Inflammation cesse , la matiere qui les causoit s'endurcit , &

64 TRAITÉ DES MALADIES

les fait dégénérer en Loupes , qui sont quelquefois molles , & quelquefois très dures. Quoiqu'elles ne soient pas incommodes , attendu qu'elles sont sans douleur , il n'y a cependant personne qui ne souhaite en être délivré. Cette Maladie est sujette à des variations ; car il arrive quelquefois qu'elle disparoît pour quelque tems , & revient ensuite quelques jours après.

Quant à la guérison de cette Maladie , elle est différente suivant les circonstances qui l'accompagnent. S'il y a Inflammation , un peu de Pomme cuite , appliquée en forme d'Emplâtre ou de Cataplasme , la fait bien-tôt évanouir , & souvent même disparoître la Tumeur. Si elle vient à se durcir , on y appliquera l'Emplâtre Diabotanum , ou celui de l'Abbé de Grace. Si elle ne se résout point par ces moyens , il faut l'ouvrir avec la pointe de la Lancette. Rarement y trouve-t-on de la matiere ; car ce n'est souvent qu'une espèce de chair dure que l'on doit consumer avec le Caustic liquide ; on y met ensuite l'Emplâtre de l'Abbé de Grace , & on la touche plusieurs fois avec le Caustic pour achever de la consumer. Il faut prendre garde de ne pas trop mettre de Caustic à la fois , crainte de percer la Paupiere , &

de consumer ce qui est sain au-delà de la Tumeur.

Si l'Orgeolet se trouve placé à la Paupiere inférieure, il est ordinairement en dedans plus qu'en dehors; c'est pourquoi en renversant la Paupiere, on l'aperçoit aisément. On le guérira en le consumant avec la Pierre infernale; si on n'aime mieux l'emporter de la manière suivante. La Paupiere étant renversée, on passera au travers la Tumeur une Aiguille courbe enfilée de Soie. L'Aiguille étant passée, l'Opérateur prendra d'une main les deux extrémités de la Soie pour élever la Tumeur, tandis que de l'autre il incisera avec une Lancette la Membrane qui recouvre la Tumeur vers le bord de la Paupiere; il quittera ensuite la Lancette pour prendre des Ciseaux droits, dont il introduira une branche dans la Playe, & dirigera l'autre du côté du Globe de l'Oeil, pour couper la Tumeur le plus près de sa Base qu'il pourra. La Playe qu'on fait se guérit ordinairement en huit jours, en y mettant le Collire fait avec dix parties d'eau sur une d'Esprit de Vin.

Il y a encore d'autres petites Tumeurs qui viennent sur les bords des Paupieres, & que l'on appelle Grêle, à raison de leur blancheur & de leur dureté. Leur

66 TRAITÉ DES MALADIES.

volume n'est pas toujours le même. Si elles sont grosses , on les sépare de la Paupiere avec une Lancette , en faisant une Incision à la peau qui les recouvre ; après quoi on tire le Corps avec une petite Curette. Mais les unes & les autres sortiront également d'elles-mêmes , si au lieu de l'Incision on touche une fois ou deux la peau qui la recouvre avec la Pierre infernale pour la consumer. Il y a outre cela d'autres espèces de Tumeurs qui viennent aussi sur les bords des Paupieres ; on les nomme Gravelles. Elles sont produites par une humeur endurcie , qui se convertit en petites Pierres ou Sables , & leur guérison est la même que celle des Tumeurs précédentes.



CHAPITRE V.

Des Verrues ou Porreaux des Paupieres.

ON remarque qu'il vient sur les Paupieres de trois sortes de Verrues. La première est petite , étroite , pendante , & sa racine se borne à la superficie de la peau. La seconde est plus large , & pénètre plus avant que la première. La troisième est non-seulement plus large que les précédentes , mais ses Racines pénètrent toute l'épaisseur de la

peau , & ont plusieurs Vaisseaux fanguins qui s'étendent jusqu'à la surface de la Verrue , & se terminent en plusieurs paquets grênelés , divisé les uns des autres , dont le sang sort au moindre attouchement. Cette dernière espèce de Verrue est très dangereuse , parce qu'elle dégénère souvent en Cancer. Elle excite une démangeaison qui oblige à y porter souvent la main ; d'où il arrive qu'à force de les frotter elles s'écorchent , & par-là dégénèrent en Ulcere chancreux & malin. Les deux premières espèces ne sont point dangereuses.

Pour guérir les deux premières espèces de Vertues , les Remèdes qui conviennent à celles qui naissent aux autres parties du Corps peuvent s'employer à celles-ci , comme le Lait de Figuier , le Suc de la grande Chelidoine , dont on touche leur superficies. On peut aussi les frotter avec le Pourpier & la Verrucaire , jusqu'à ce que ces Plantes y repandent leur Suc. En cas qu'il ne guérissent pas par ces remèdes , on y emploiera les moyens suivans. Si la Base des Porreaux est étroite , on les prendra avec une Pince un peu au-delà de leur Base , pour les lier ensuite avec de la Soye par un double nœud. Cette ligature occasionne la chute de ces Tu-

meur par l'étranglement des Vaisseaux qui leur fournissoient la nourriture. Si les Verrues se trouvent trop profondes , on touche leur surface avec un Chalumeau de paille trempé dans un Caustic liquide. Ce Caustic les consumera en une ou deux applications , occasionnera la suppuration , & en même tems la chute de la Tumeur. On mettra dessus un Emplâtre de Diapalme que l'on continuera jusqu'à parfaite guérison.

A l'égard des Verrues chancreuses , je les guéris avec une Liqueur , dont l'usage ne procure pas seulement la chute de la Verrue , mais aussi la Cicatrice de l'Ulceré.



CHAPITRE VI.

Du Cancer des Paupieres.

LEs Paupieres ne sont pas moins exposées au Cancer que les autres parties de la Face. Cette maladie même y est d'autant plus fâcheuse , que l'on a toujours défendu d'y toucher , d'où vient qu'on la nommée *noli me tangere*. En effet , les opérations qu'on y pratique ne sont que très rarement suivies d'heureux succès. D'ailleurs les Topiques qui irritent & aigrissent tant soit peu l'humeur qui cause cette Maladie , lui font

en peu de tems faire un progrès si considérable , qu'il n'y a plus à espérer de secours ni d'adoucissement , non pas même des Remèdes qui feroient les plus convenables.

Les causes de cette Maladies ne dépendent pas moins de l'altération de toute la masse du sang , que du vice de la partie à laquelle l'humeur s'attache.

J'ai remarqué cinq espèces de Maladies qui attaquent les Paupieres , & y font naître le Cancer. La première , est une Tumeur dure qui s'attache ordinairement à la Paupiere supérieure , & qui a des Vaisseaux vers sa Base remplis d'un sang qui les fait paroître plombés. Le Malade y ressent par intervalle des douleurs avec élancemens.

La seconde espèce est produite par un Porreau qui s'attache au grand Angle de l'Oeil au-dessous de la réunion des deux Paupieres. Ce Porreau a des Racines profondes , & des Vaisseaux sanguins , comme je l'ai marqué au Chapitre des Verrues des Paupieres.

La troisième espèce est une forte de Varice , dont le Sang noirâtre fait aussi paroître les Vaisseaux plombés. Dans ces trois cas , le Sang par son séjour s'aigrit , ronge la Peau & les Paupieres , d'où il résulte un Ulcere chancreux avec

des chairs fongueuses , qui par succession de tems , se consomment d'elles-mêmes , & l'Ulcere augmente tellement , qu'il s'avancent sur les autres parties du visage . & enfin les bords deviennent calleux.

La quatrième espèce est produite par un écoulement des Larmes qui se répandent continuellement sur la Caroncule lacrimale , soit qu'il y ait Fistule ou non , & qui par leur malignité excorierent & ulcerent cette Caroncule ; d'où s'ensuit un Ulcere chancreux , qui dans la suite consume & ronge la Paupiere inférieure , & dont les bords deviennent enfin calleux comme ci-devant.

La cinquième espèce peut arriver par un coup reçu sur le bord de l'Orbite , ou aux environs des yeux , qui meurtrit les chairs , change la Tissue de leurs Vaisseaux , & occasionne par-là le séjour du Sang , qui venant à s'aigrir , fait que le mal dégénère en Ulcere chancreux , dont les bords deviennent calleux , ce que j'ai vu arriver à Mr. Ferrand , Lieutenant-Général d'Artillerie , par un éclat de Bombe qu'il avoit reçu vers l'Os de la Pomette.

Tous les Cancers qui attaquent les Paupieres ont pour l'ordinaire des suites très fâcheuses ; car lorsque l'Ulcere par lequel ils ont commencé a les bords cal-

leux , on ne le guérit que rarement , encore est-ce avec beaucoup de difficulté lorsque l'Ulcere chancreux est sans callosité. On peut espérer de le cicatrifer par le moyen de la Liqueur dont j'ai parlé en traitant des Verrues chancreuses. J'en ai guéri plusieurs par l'usage de ce Remède ; mais lorsque les bords de l'Ulcere sont accompagnés des Callosités , il n'y a point d'autre ressource que la Cure palliative.

Les Personnes qui ont le malheur d'être affligée de cette Maladie , ne souhaitant rien tant que de guérir , cherchent toujours des remèdes dont on leur fait espérer des merveilles. L'Expérience fait voir cependant tous les jours , que bien loin que leur usage diminue la Maladie , il l'augmente au contraire. Ainsi dans ce cas , le plus sur est de s'en tenir à un régime exact , en se privant de tout ce qui est capable d'altérer & d'agiter le sang ; tels sont les Alimens salés & épicés , les Viandes noires , & les Legumes , &c.

On appliquera sur la partie affligée des Eaux distillées de frai de Grenouille & de Morelle , dans lesquelles on aura mis quelques grains de Sel de Saturne , & du Plomb brulé. On peut aussi prendre du Plomb brulé en poudre très subtile ,

l'incorporer dans le Mucilage de Graine de Lin pour l'étendre sur du Charpi, & l'appliquer sur la Playe ; ce qui corrige l'âcreté & la malignité de l'humeur. Et lorsqu'on s'apperçoit que l'usage d'un Remède, quelque convenable qu'il soit, cesse de soulager le Malade, on doit lui en substituer quelqu'autre ; comme l'Eau d'Arquebusade distillée avec l'Eau de Morelle, au-lieu de Vin. On lavera la Playe avec la Liqueur tiède soir & matin, & on appliquera sur la partie des Plumaceaux trempés dans cette Eau. S'ils se dessèchent, on les arrosera de tems en tems avec la même Liqueur, dans laquelle on peut mêler des Poudres de Terre sigillée, des préparations de Plomb, & toutes les choses qui tendent à corriger l'Humeur âcre dévorante qui est la cause du Cancer.

Il y a dans les Auteurs une infinité de Remèdes pour cette Maladie ; mais il faut bien prendre garde de ne pas se servir de ceux qui y peuvent y être tant soit peu contraires par leur acrimonie & leur activité. On doit saigner & purger le Malade de tems en tems, selon qu'on le jugera nécessaire.



C H A P I T R E V I I.

De la Galle & des Dartres des Paupieres.

LEs Paupieres sont sujettes à des Grattelles qui diffèrent entre elles par la largeur plus ou moins grande des Ulceres prurigineux qui se forment autour de leurs bords , & par le plus ou moins de la Malignité de l'Humeur qui les cause.

On connoît cette Maladie par une pesanteur sur l'Oeil , & enflure des Paupieres , accompagnée des Cuissons & Démangeaisons incommodes , de Chaleur & Rougeur aux Angles des Yeux , & même à la Conjonctive. Il découle une Humeur gluante des Ulceres , mêlée de Larmes cuisantes ; & suivant qu'elle est plus ou moins épaisse , elle colle plus ou moins les Paupieres pendant la nuit. Quelquefois elle n'occupe qu'une partie de la Paupiere , & d'autres fois elle l'occupe toute entière.

Lorsque cette Maladie a duré longtems , principalement dans les Vieillards , la Paupiere inférieure grossit considérablement , & se renverse , ce qui fait paroître le Cartilage comme un Bourlet charneux.

La Dartre qui s'attache aux Paupieres , a beaucoup de rapport avec ces Galles ,

D

74 TRAITÉ DES MALADIES

excepté le Bourlet. Ses Signes sont presque semblables , & en renversant les Paupieres , on voit qu'elles sont rouges en dedans , & qu'il paroît des inégalités , comme de ces Petits Grains qui se trouvent dans les Figues.

Les Causes de toutes ces Maladies dépendent d'un Sang chargé d'une Humeur salée & mordicante , qu'il dépose sur les Paupieres , lesquelles s'en trouvent plus ou moins affectées selon la malignité de l'Humeur.

Pour ce qui est de la cause prochaine , c'est le plus souvent l'Ulcération des Vaisseaux glanduleux qui fournissent la Chassie sur le bord des Paupieres , lesquels étant enfin ulcerés , suintent toujours une Humeur épaisse qui entretient & agrandit de plus en plus leur ulcération.

Quoique cette Maladie soit difficile à surmonter , on trouvera cependant une Guérison prompte dans des Remedes qui adoucissent & temperent le mouvement du Sang , comme je le marquerai au Chapitre de l'Ophtalmie , pourvu que l'on joigne à leur usage celui des Remedes suivans.

Pour guérir l'Ulcération des Paupieres , lorsque c'est la Galle qui les cause , je me fers de la Pierre infernale appliquée comme je le dirai en parlant des Ulceres restés

sur le bord des Paupieres , après les Grains de la petite Verole. Par ce moyen , on en vient à bout en très peu de jours ; néanmoins on peut avant l'usage de la Pierre infernale se servir d'une Eau faite avec deux Gros de Foie d'Antimoine , une demie Once de Tutie préparée , demi Gros de Camphre , vingt Grains de Clous de Gerofle , que l'on aura fait infuser ensemble pendant huit jours dans l'Eau d'Eufraise , de Fenouil , de grande Chélidoine & de Rue , quatre Onces de chacune. On mettra de cette Eau trois fois le jour dans l'Oeil , en se servant en même tems d'une Pommade faite avec une Once de Beurre fondu & purifié , que l'on lavera plusieurs fois dans l'Eau-Rose & l'Eau de Plantin , dans laquelle on incorporera un Gros de Tutie préparée. On en mettra tous les soirs , en se couchant entre les Paupieres , en sorte qu'il y en passe une partie sur l'Oeil.

Quant aux Dartres des Paupieres , elles ne demandent pas des Remedes si forts, parce qu'à peine les Ulcérations qu'elles font au-dedans de la Paupiere y paroissent. Je me fers d'un Remede simple qui y réussit assez bien , lequel je fais avec du Sel de Saturne , & du Sel Armoniac , quatre Grains de chacun , dissouts dans les Eaux de Rose & de Plantin , quatre onces de

chacune. On en lave les Yeux & les Paupieres quatre ou cinq fois le jour. Ce Remede appliqué avec l'usage des internes , propres à changer la disposition du sang , & de dissiper l'Humeur âcre dont il est chargé , procure bien-tôt la Guérison de cette Maladie.



CHAPITRE V.III.

Du Dérangement des Cils nommé Trichiaïse.

QUOIQUE le Dérangement des Cils semble être une Maladie très legere , nous voyons cependant des Personnes à qui souvent cette indisposition cause non-seulement des Fluxions très-opiniâtres , mais encore à qui elle fait perdre la Vue. En effet , il est aisé de juger que les Cils tournant leurs pointes vers la Cornée & la Conjonctive , sont comme autant de petites Epingles , qui piquant continuellement les endroits où leur extrémité s'applique , y produiront des Ulceres , dont les Cicatrices souvent très-épaisses causent la perte de la Vue ; & si les Ulceres subsistent , les Malades ne sauroient supporter la Lumiere , ni discerner aucun Objet.

Les Auteurs qui ont parlé de la Trichiaïse , en ont établi de trois espèces, qu'on pourroit ce me semble réduire à deux. La

premiere est causée par le Dérangement des Cils qui se portent en dedans sans que le Cartilage des Paupieres change sa situation naturelle. La seconde au contraire, est occasionnée par le Cartilage de la Paupiere inférieure, qui se tournant en dedans, entraîne avec lui les Cils vers ce côté; de sorte que leur extrémité se porte contre le Globe de l'Oeil. Lorsque le Cartilage se renverse en dedans, il y a extérieurement une Bouffissure à la Paupiere qui paroît comme une espèce d'Enphisme.

La cause de la premiere espèce de Trichiaïse est une suite de la petite Verole, des Galles & des Dartres des Paupieres, qui ayant ulceré les petits pores de la Peau par lesquels les Cils sortent, en occasionnent la chute. Ces Ulceres en se cicatrisant rendent l'endroit de la Peau, par lequel les poils s'étoient fait jour, plus compacte; d'où il arrive que ceux qui doivent renaître, trouvant le tissu de cet endroit plus ferré, prennent une autre route; & au lieu de se tourner en dehors, ils se portent du côté de l'Oeil, vers lequel ils trouvent moins de résistance.

La seconde espèce de Trichiaïse a pour Cause une Serosité qui s'infiltré entre le Muscle orbiculaire & la Peau qui le recouvre. Il s'ensuit un Boursoufflement à la

Paupiere qui fait tourner son Cartilage en dedans ; & celui-ci entraînant les Cils qui lui sont attachés , cause l'espèce de Trichiaïse dont nous parlons , laquelle est plus ordinaire aux Personnes âgées qu'à toute autre.

Le Prognostic est assez fâcheux , d'autant que cette Maladie entretient souvent une Ulcération habituelle sur les Yeux , qui produit un Larmoïement continuel , avec peine à souffrir la lumière ; & quelquefois il en résulte la perte entière de la Vue.

Quant à la Guérison de la première espèce de Trichiaïse , elle consiste à arracher les Cils qui se portent du côté de l'Oeil , & à empêcher qu'il en renaisse de nouveaux ; ce qu'on obtient en faisant une Cicatrice à l'endroit de leur racine par la Pierre infernale , dont on le touche légèrement.

La seconde espèce de Trichiaïse ne guérit que rarement par les Remèdes Topiques. On mêle un Gros d'Esprit de Sel avec demi Septier d'Esprit de Vin , pour en frotter les Paupieres cinq ou six fois la journée. Et quand la Maladie est à la Paupiere inférieure , on fait un petit Bandage pour appuyer sur cette Paupiere , qui soulage le Malade pendant le tems qu'il le porte. Ce Bandage en appuyant sur la

Peau , oblige le Cartilage de reprendre sa situation naturelle , & par ce moyen , il se rétablit quelquefois entierement.

Mais le plus sûr Remede est d'y faire l'Opération de la maniere suivante. On prendra la Peau dans toute l'étendue de la Paupiere avec deux Pincettes , dont l'une sera placée à trois lignes de distance du grand Angle de l'Oeil , & l'autre à trois lignes du petit Angle. On coupera avec les Ciseaux la quantité que l'on jugera nécessaire de toute la Peau élevée , en suivant la direction des Plis des Paupieres. On aura trois Aiguilles , dont chacune sera enfilée de son fil ciré pour coudre la Peau par trois Points seulement , dont l'un sera au milieu , & les deux autres vers chaque extrémité ; on les arrêtera par un Nœud & une Rosette , en commençant par les Points du milieu.

Il est à remarquer que pour rendre cette Opération plus sûre , on fera le premier point directement au milieu de chaque Levre de la Playe. Ceux des côtés doivent se faire obliquement & de telle façon , que la piquure de la Levre inférieure s'approche plus du Point du milieu , que la piquure de la Levre supérieure , savoir environ d'une ligne. On observera la même chose à l'égard du Point de l'autre côté. Ces Points ainsi disposés en tirant les deux

extrémités du Cartilage obliquement, le retournent en dehors. Après avoir noué chaque Point, on coupera les Fils près des Nœuds, & on mettra sur la Playe une Compresse trempée dans de l'Eau commune mêlée avec très peu d'Esprit de vin. On doit entretenir la Compresse humide pendant quatre ou cinq jours, au bout duquel tems la Trichiaïse se trouve ordinairement guérie. Il faut avoir soin au quatrième jour de retirer les Fils de la Playe, supposé qu'elle soit réunie en ce tems-là.



CHAPITRE IX.

De la Paralysie de la Paupiere supérieure.

LA Paupiere supérieure devient paralytique en deux manieres; dans l'une, elle reste toujours abaissée sans pouvoir se relever; dans l'autre, elle demeure toujours relevée sans pouvoir s'abaisser. Ceci n'est qu'une Paralysie particuliere de ses Muscles. Dans le premier cas, c'est le Réleveur qui est attaqué; dans le second, c'est l'Orbiculaire ou l'Abaisseur. Cette Paralysie est ou parfaite, ou imparfaite. Elle est parfaite, quand la Paupiere est sans aucun mouvement; elle est imparfaite, quand elle a encore quelque mouvement, & cette dernière a plusieurs degrés

qui ne different que du plus ou du moins. Quand la Paupiere demeure toujours ouverte & sans mouvement, c'est ce que les Anciens ont appelé Oeil de Lievre.

On voit bien par ce que je viens de dire, que c'est toujours une même cause qui produit ces deux Maladies. La différence ne consiste qu'en ce que dans celle où l'Oeil est toujours fermé, c'est le Muscle Réléveur qui est paralitique; au-lieu que dans celle où l'Oeil reste toujours ouvert, c'est l'Orbiculaire qui est malade. Il arrive souvent que dans la Paralysie en général, le sentiment & le mouvement perissent; mais dans l'espèce de Paralysie dont je parle, il n'y a de défaut que dans le mouvement, sans que le sentiment soit intéressé, ou que très-rarement.

Comme toutes les Paralysies sont ordinairement des suites de quelque Apoplexie, on peut dire de même que celle-ci est une espèce d'Apoplexie légère, & comme insensible, dont la matiere qui l'occasionnoit tombant sur les Nerfs qui se distribuent aux Fibres motrices des Paupieres, les obstrue, ou les comprime.

Les Purgatifs & les Remedes dont on se sert dans la Paralysie, sont propres à celle-ci. Les Eaux Minerales chaudes, dont on voit tous les jours d'heureux succès, produisent aussi le même effet pour cette

82 TRAITÉ DES MALADIES

Paralysie. J'ai traité plusieurs personnes affligées de cette Maladie , que j'ai guéries en employant les Purgatifs , les Sudorifiques , & sur-tout les Bouillons de Vipere.

On peut se servir d'une Fumigation qu'on reçoit à l'Oeil & aux environs , faite avec le Romarin , le Thim , la Sauge & le Vin, que l'on fait bouillir dans une Caffetiere. On la couvre ensuite d'un Entonnoir renversé qui la ferme exactement. On expose l'Oeil malade à l'extrémité de la fumée qui sort du bout de l'Etonnoir comme d'une petite Cheminée ; ce qu'on pratique soir & matin pendant un quart d'heure chaque fois. Cela produit le même effet que la douge sur les parties paralitiques. Il faut observer de placer l'Oeil à une certaine distance pour que la chaleur soit supportable. On doit se servir en même-tems d'un autre moyen , qui est de prendre une petite Cuvette d'Etain qui recouvre les Paupieres , & qui ait dans le fond un Tuyau en maniere de Manche long de quatre travers de doigt. On met dans ce Tuyau ou Manche une Liqueur spiritueuse faite avec de l'Esprit de Vin distillé plusieurs fois sur des Clous de Gérosfle , de la Lavande , de l'Origon & du Thim. Puis on pose la petite Cuvette sur l'Oeil , & on échauffe le Manche avec la main. La Liqueur spiritueuse raréfiée par

la chaleur de la main se porte sur la partie paralitique , & y rappelle les esprits animaux dans les fibres motrices. On doit se donner ce soin trois fois le jour. Plusieurs sont guéris par ce moyen ; surtout , lorsque leur mal n'est pas trop inveteré.

Il survient encore aux Paupieres un Mouvement ou Tressaillement prompt & involontaire , que je regarde comme un Mouvement convulsif des Paupieres. Cet accident n'est pas de conséquence , lorsqu'il n'arrive pas fréquemment. Il se guérit en frottant le creux de la main avec de l'eau de la Reine d'Hongrie , & l'appliquant ensuite sur la partie trois fois le jour pendant quelques momens.

Ce Mouvement convulsif dégénère quelquefois en Convulsion totale de la Paupiere. Pour lors , elle demeure fermée pendant un *Miserere* , après quoi elle se relève , ce qui lui arrive souvent pendant la journée. Cette Convulsion attaque le Muscle orbiculaire , pendant laquelle les Fibres motrices de ce Muscle deviennent roides & tendues. On peut comparer ceci à l'espèce de Convulsion appelée Crampe , qui arrive quelquefois à une Jambe pendant la nuit , lorsqu'en s'éveillant ou l'allonge trop , de sorte qu'elle demeure un *Miserere* , sans que l'on puisse la retirer.

Ainsi on ne doit chercher la cause de cette Convulsion qu'en un Mouvement irrégulier des Esprits animaux qui se portant avec trop de rapidité dans les Fibres du Muscle orbiculaire , empêchent pendant un tems l'action du Muscle réleveur.

Deux choses servent à faire cesser en un moment cette Convulsion. La première est de frotter avec la main le tour de l'Orbite & les Paupieres. La seconde est de se faire éternuer pendant l'abcès.

Quoique ces deux moyens soulagent dans le moment , ils n'empêchent point les Récidives de la Convulsion ; c'est pourquoi on se servira des Remedes tant internes qu'externes propres à la faire cesser , comme les Saignées , les Purgatifs , & les Antiépileptiques , tels que sont la Racine & la Graine de Pivoine , la Décoction des Bois & des Racines sudorifiques , le Gui de Chêne , le Cinabre d'Antimoine , les Sels volatils , &c. Entre tous ces Remedes , je n'en ai point trouvé de meilleur que les Fleurs sublimées du mélange du Sel Armoniac , avec le *Caput mortuum* de l'Huile de Vitriol. Lesquelles Fleurs on lavera avec l'Eau commune pour en emporter tout le Sel , & ensuite on les fera secher. On en prendra soir & matin trois grains dans un peu de Confection d'Hiacinthe. Pour l'ordinaire ce Remede fait

cesser les accès de Convulsions avant le huitieme jour. Pour Remedes externes, on frotera le haut & le dessus des Paupieres d'un Liniment fait avec l'Huile de Verre de Terre, mêlée avec quelques gouttes d'Esprit volatil huileux, ou de l'Eau de Melisse composée. L'Eau distillée de Fleurs de Sureau appliquée seule y fait encore très bien dans la Convulsion de la Paupiere, aussi bien que dans sa Paralysie.

Lorsque la Paupiere se trouve fermée sans pouvoir se relever, il y a une opération par laquelle on emporte une portion de la peau de cette Paupiere. La Playe étant guérie, & la peau ne se trouvant plus si allongée, le mouvement revient au Muscle reléveur de la Paupiere. Ainsi la Maladie se trouve guérie, les Personnes ouvrant & fermant la Paupiere à leur volonté.



CHAPITRE X.

De l'Erailement des Paupieres.

TOUS ceux qui ont écrit jusqu'à présent sur cette Maladie, ont pris pour Erailement des Paupieres leur renversement, de même que la Paralysie du Muscle orbiculaire, dans laquelle l'Oeil ne peut se fermer. Et les Anciens comme les

Modernes, nous ont parlé de cette Maladie sous le nom d'Oeil de Lievre, l'ayant confondus avec celle dont je viens de traiter ci-dessus, j'entends par Eraillement une difformité qui arrive aux Paupieres par la solution de continuité de la peau ou des Cartilages qui les bordent, laquelle est assez souvent la suite de la brulure de Cartilages, de leur coupure, & de l'Opération de la Fistule lacrimale. Dans celui qui succède à la brulure, la Paupiere forme comme une espèce de Bec d'Aiguier. Dans celui qui est occasionné par la coupure du Cartilage & de la peau qui la recouvre, la Paupiere dans cet endroit représente une espèce de Bec de Lievre. L'Eraillement enfin qui suit quelquefois l'Opération de la Fistule lacrimale, consiste dans la désunion des Cartilages du côté du Nez; ce qui donne lieu à l'extrémité du Cartilage inférieur de s'enfoncer dans l'endroit operé. Cette Maladie se fait assez connoître d'elle-même, parce qu'on vient de dire, sans qu'il soit besoin d'en décrire les Signes; il suffit d'examiner quels sont les Eraillemens qui peuvent être guéris.

Celui qui est causé par une Brulure n'est point guérissable, si elle a trop endommagé le Cartilage qui borde les Paupieres; parce que la Playe étant trop grande, elle l'empêche de pouvoir se relever.

Si au contraire l'Erailement n'est que peu considerable, & que le Cartilage ne soit brulé que du côté de la partie intérieure de la Paupiere inférieure, sa partie externe demeurant saine, on peut le guérir. Pour cet effet, il faut renverser la Paupiere en dehors, & appliquer légèrement la Pierre infernale dans sa surface interne, dont on ôtera aussi-tôt l'effet par l'application de l'Eau tiède. Il s'en suivra une Supuration à cet endroit qui effacera le pli du Cartilage, & le rapprochera contre le Globe de l'Oeil, en remettant la Paupiere dans son premier état.

L'Erailement causé par une Playe qui coupe le Cartilage & la peau, pour être guéri si l'on fait la Suture sur le champ, & que l'on réunisse bien les deux extrémités du Cartilage qui ont été divisés.

Comme dans la Playe qui occasionne l'Erailement, la Peau & la Membrane intérieure des Paupieres, aussi-bien que le Cartilage qui les borde, se trouvent également divisés; pour éviter de piquer celui-ci par la suture, on la pratiquera de la maniere suivante. On piquera d'abord avec une Aiguille courbe un peu tranchante, & enfilée d'un Fil ciré, les deux Levres de la Playe de la Membrane intérieure près le bord de la Paupiere, & on retirera l'Aiguille, sans pour cela retirer le

Fil, dont on laissera pendre les deux bouts, on piquera ensuite avec une Aiguille d'Argent à pointe d'Acier les Levres de la Playe de la Peau, aussi près du bord de la Paupiere, & laissant cette Aiguille dans la Playe; on fera sur elle plusieurs tours en forme de Huit de chiffre avec les Fils qu'on a laissé pendants. On observera avant de contourner les Fils, que chaque bout que l'on relève doit d'abord passer sous l'extrémité de l'Aiguille qui lui répond, sans quoi on ne manqueroit pas de passer dans la Playe; ce qui s'opposeroit à la réunion que l'on veut procurer. On mettra ensuite un Collire rafraichissant par dessus, jusqu'à ce que la Playe soit réunie; alors on ôtera l'Aiguille & les Fils.

Lorsqu'on a été frappé d'un coup qui fend le Cartilage des Paupieres, & qu'on n'est pas d'abord pansé par gens qui en sachent rejoindre comme il faut les bords, il y reste après la Cicatrice une Fente en maniere de Bec de Lievre. Cet accident arrive le plus souvent à la Paupiere supérieure. Il y a des Auteurs qui prétendent qu'en rafraichissant les Levres de la Playe, & en y faisant la même chose qu'au Bec de Lievre avec une Aiguille d'argent, on peut retablir la Paupiere dans son premier état. Mais le Cartilage étant diminué de

longueur par la nouvelle Incision , ne faudroit s'allonger assez pour se réunir , & pour recouvrir le Globe de l'Oeil ; ce qui rend l'Opération inutile , comme je l'ai vu par ma propre expérience , l'ayant fait une fois à la Paupiere supérieure d'une Personne qui avoit été blessée depuis quelques années.

A l'égard de l'Eraillement qui vient après l'Opération de la Fistule lacrimale , il est absolument incurable , parce que la Cicatrice qui suit sa guérison , étant trop profonde , tire à soi le Cartilage inférieur , & s'oppose à la réunion avec le supérieur.



CHAPITRE XI.

De l'Inflammation & de l'Erésipelle des Paupieres.

LEs Enflures qui attaquent les Paupieres , sont les Erésipelles & les autres Inflammations qui dégénèrent souvent en Abscess. Il est inutile d'en écrire les Signes qui sont assez manifestes par eux-mêmes , comme l'Enflure , Rougeur , Douleur. Les Remèdes sont en général ceux qui conviennent aux Inflammations des autres parties , comme la Saignée & l'usage des Topiques.

Lorsque l'Inflammation n'est encore que dans son commencement , & qu'il ne s'agit que d'empêcher son progrès , on se sert d'un Collire fait avec les Eaux de Plantin & de Rose , & du blanc d'Oeuf battus ensemble , ou bien du Cataplasme de Pomme cuite mêlée avec du blanc d'Oeuf. Mais d'abord que l'on s'apperçoit que l'enflure vient à suppuration , on met dessus la partie des Compresses trempées dans une décoction de Feuilles de Guimauve , de Fleurs de Melilot , de Roses de Provins avec de l'Hisope ; ce qui compose un Remède propre à résoudre ou faire supurer.

Lorsque l'Inflammation est Erésipélateuse , je me sers de l'Eau distillée de Fleurs de Sureau , mêlée avec une cinquième partie d'Esprit de Vin , dont on lave de tems en tems les Paupieres , la Liqueur étant tiède.

Si l'Inflammation , au-lieu de se résoudre , dégénère en Abscess , il faut en faire l'ouverture le plutôt qu'il est possible , de peur que le séjour de la matière ne fasse tort à la Paupiere. On en fait l'Ouverture avec une Lancette , que l'on introduit par un côté de la Tumeur , & on la pousse en coupant , jusqu'à ce que toute la peau qui recouvre le Pus soit ouverte , & en suivant la même li-

gne qui fait le pli de la Paupiere , lorsqu'elle s'ouvre. Le Pus étant vuidé , on n'y met ni Tente ni Charpie , mais seulement des Compressees trempées dans six parties d'Eau , & une partie d'Esprit de Vin. Cette Playe se guérit en peu de tems.



CHAPITRE XII.

De l'Hidropisie des Paupieres.

LORSQU'IL s'épanche une Humeur entre la peau & les Muscles des Paupieres , elle y forme une espèce d'Hidropisie. J'ai vu ce cas arriver à la Paupiere supérieure , dans la Personne de Mr. Ferrand , Lieutenant-Général d'Artillerie , qui est mort aux Incurables d'un Cancer , qui avoit attaqué principalement la Paupiere inférieure , le Globe de l'Oeil & la Joue. Etant tombé dans l'Hidropisie de l'abdomen , il lui survint une enflure à la Paupiere supérieure , laquelle pendoit comme une Poche pleine d'Eau. L'ayant examiné , je reconnus que c'étoit une Hidropisie particulière de cette Paupiere , qui lui cau-
soit par son poids un tiraillement fort incommode. Je lui fis une ouverture , avec la Lancette , en observant de cou-

92 TRAITÉ DES MALADIES
per la peau selon ses plis : il en sortit
une Eau jaunâtre , la quantité d'une bon-
ne Cuillerée. Quelques jours après Mr.
Petit , Maître Chirurgien de Paris , lui
fit la Ponction à l'Abdomen pour en ti-
rer les Eaux , il en sortit une Liqueur
toute semblable à celle que la Paupiere
avoit donnée par mon Opération.



CHAPITRE XIII.

Des Athéromes.

L'ATHEROME en général est une Tu-
meur enkistée , qui vient à l'une & à
l'autre Paupiere. On en reconnoît de trois
fortes , qui prennent chacune leur nom
de la matiere renfermée dans le Kiste.

Celui , dont le Kiste est rempli d'une
matiere semblable à de la Bouillie , s'ap-
pelle simplement Athérome. Celui qui
contient une matiere semblable à de
Miel , prend le nom de Mélicéris. Ce-
lui enfin qui renferme une matiere plus
solide , & qui a la consistance & la cou-
leur du suif est nommée Stéatome. N'y
ayant donc de difference entre ces trois
espèces que par la matiere qu'elles con-
tiennent , je les comprends toutes sous le
nom d'Athérome.

La Cause de ces Tumeurs vient de la

dilatation de quelques Conduits ou Vaisseaux graisseux, d'où se forme le Kiste, dans lequel les Vaisseaux fournissent continuellement la matiere qui s'y trouve, & dont le plus ou moins d'épaisseur, & de séjour, fait la difference. Le volume de ces Tumeurs augmente assez souvent à la grosseur d'une Noix.

On connoît assez ces Tumeurs à la vue & au toucher; mais on ne peut savoir la nature de la matiere renfermée, qu'en en faisant l'ouverture.

Ces Tumeurs ne sont ni dangereuses ni douloureuses, parce que la matiere qu'elles contiennent n'étant point fort âcre, ne cause point d'Inflammation. L'incommodité que l'on en ressent, est une tension & pesanteur aux Paupieres, avec difformité.

Il n'y a que l'Opération qui puisse guérir ces sortes de Tumeurs; les Remedes résolutifs n'y faisant rien. Ainsi ayant préparé le Malade par la Saignée & la Purgation nécessaire, & l'ayant mis dans la situation convenable, il faut pincer la Peau qui recouvre la Tumeur avec deux doigts, pour en couper avec les Ciseaux une portion de la largeur de la moitié du volume de la Tumeur, en suivant la direction des Rides de la Peau. On piquera ensuite la Tumeur avec une Airhigne, pour la

soulever à mesure qu'on la détache avec un Bistouri du reste de la Peau & du Muscle de la Paupiere. Lorsqu'on aura détaché la Tumeur dans les environs, on coupera le dessous le plus près que l'on pourra de sa Racine avec des Ciseaux. On pansera ensuite la Playe avec un Digestif & Emplâtre de Diapalme par dessus. Si toute la Racine du Kiste ne tombe point par supuration, on la touchera avec la Pierre infernale. Ainsi cette Tumeur se guérira en pansant la Playe, jusqu'à ce qu'elle soit tout à-fait cicatricée.

Toutes celles que j'ai ouvertes, ne contenoient qu'une matière semblable à du Suif; elles ont été parfaitement guéries par les moyens que je viens de proposer.

Il est à remarquer, qu'on ne doit jamais faire une Incision Cruciale aux Paupieres, pour enlever ces fortes de Tumeurs, afin d'éviter la difformité.



CHAPITRE XIV.

Des Tumeurs adipeuses.

LEs Tumeurs, que les Anciens ont appelé Adipeuses, sont assez rares, je n'ai vu que trois Personnes affligées de cette Maladie aux Paupieres supérieures vers le petit Angle.

Les Auteurs ont differemment écrit de cette Maladie. Il y en a qui prétendent que ce sont des Eaux qui la forment , & l'ont appelée Hidatide ; nom qui signifie une Poche transparente pleine d'Eau : mais comme je fai par expérience que c'est une Graisse , le nom d'Adipeuse me paroît lui mieux convenir.

Cette Tumeur est située à la partie supérieure de l'Orbite , à cause de la Glande lacrimale , entre cette Glande & le petit Angle : elle a pour signe l'Enflure de la Paupiere supérieure , dont la Graisse qui est dedans pousse la peau & l'allonge ; en sorte qu'elle lui fait faire un repli , qui descend aussi bas que le bord de la Paupiere supérieure. Lorsqu'on releve la Paupiere , & que l'on presse la Tumeur , elle s'enfonce & disparaît. En regardant par dessous la Paupiere , elle paroît vers le petit Angle de l'Oeil ; & si l'on cesse de la presser , elle reprend sa premiere situation.

On ne sauroit guérir cette Tumeur que par l'Opération. C'est pourquoi après avoir préparé le Malade , & l'ayant mis dans une situation convenable , on coupera la Peau qui recouvre la Tumeur , en suivant toujours la direction de ses Plis ; mais il faut observer que la Peau de la Paupiere supérieure étant trop allongée ,

on en enlevera une portion proportionnée à l'étendue de la Tumeur. On piquera ensuite la Tumeur avec une Airhigne pour la soulever, à mesure qu'on la détachera avec la pointe d'un Bistouri, d'avec les parties voisines; étant parvenu jusqu'à sa racine, on la coupera avec des Ciseaux directement à l'endroit où elle est adhérente. S'il restoit un peu du Kiste au fond après l'Opération, on le peut consumer avec le Caustic liquide, ou la Pierre infernale. On pansera ensuite la Playe à l'ordinaire de la même manière que dans l'Athérome; & sa guérison ne sera pas longue. J'ai fait cette Opération avec beaucoup de succès.



CHAPITRE XV.

Du Renversement de la Paupiere inférieure.

LA Paupiere inférieure se tuméfie quelquefois, & devient comme charnue du côté de l'Oeil, d'où il arrive que le Globe ne cédant point à la Tumeur, la Paupiere se renverse en dehors conjointement avec son Cartilage.

Deux Causes produisent cette Tumeur de la Paupiere. La première est l'Ulcération de sa Membrane intérieure, qui par l'âcreté

l'âcreté des Eaux salées qui l'abreuvent, l'ulcerent, & y font naître des chairs fongueuses qui la tuméfient.

La seconde cause vient de la part du Globe de l'Oeil, soit qu'il soit enflé par lui-même, on pousse en dehors par quelque chose étrangere; pour lors, la Paupiere inférieure se trouvant comprimée par le Globe contre le bord de l'Orbite, elle se gonfle considérablement par la difficulté que le Sang trouve à revenir par les Veines, à cause de la compression. Cette Enflure est bien-tôt suivie du Renversement de la Paupiere.

Pour remedier à cette Maladie, quand elle dépend de la premiere cause, on commencera par adoucir l'âcreté de la Lymphé lacrimale; quoique cette cause étant ôtée, la Paupiere ne se rétablisse jamais d'elle-même.

La résistance de cette Maladie à toute sorte de Remedes, m'a fait penser que pour y réussir, il falloit nécessairement causer une Supuration à cette Paupiere, capable de désemplir les Vaisseaux, & de détruire la portion charnue que le sang avoit fait naître. Je me suis servi pour cet effet de la Pierre infernale, que j'ai appliqué dans toute sa surface intérieure qui étoit renversée en dehors, en ôtant aussi-tôt après l'effet de la Pierre par l'ap-

plication de l'Eau tiède. Il s'en est suivi pendant deux jours une Supuration , laquelle étant cessée , j'ai appliqué de nouveau la Pierre infernale ; ce que j'ai continué de faire , jusqu'à ce que j'aie cru que la Tumeur étoit assez diminuée , pour que le Cartilage pût par son ressort réléver la Paupiere , & la remettre dans sa premiere situation ; cette Méthode m'a toujours réussi.

A l'égard de la seconde Cause , j'en parlerai dans le Chapitre qui regarde l'Enflure du Globe ; car pour ce qui est du vice de la Paupiere qui en dépend , on n'a point d'autre Remede que celui que je viens de proposer pour le Renversement qui vient de la premiere Cause , excepté une Opération qui enlève tout d'un coup la portion charnue.



CHAPITRE XVI.

De l'Union contre nature des Paupieres.

ON appelle Union des Paupieres, lorsque la supérieure se trouve jointe avec l'inférieure , ou que l'une ou l'autre , ou toutes les deux se trouvent unies avec la Conjonctive.

Il y a quatre Causes qui occasionnent cet accident. La premiere vient de nais-

fance , les enfans venant au monde fans pouvoir ouvrir les Yeux par la continuité de la Membrane fine qui recouvre la Conjonctive , & se termine à l'extrémité de chaque Paupiere ; dans ce cas , si les deux extrémités se trouvent unies ensemble dans toute l'étendue des Paupieres , sa Conjonction fera de même : & si elle ne se trouve unie que dans la moitié de son étendue , sa Conjonction ne contiendra que cet espace , quoique toutes les Unions des Paupieres que j'ai vu être arrivées de naissance , ne s'étendoient que depuis le petit Angle , jusqu'au milieu des Paupieres , ou un peu plus. Je ne doute pas qu'il n'y ait des Enfans qui naissent dans une Conjonction entière des Paupieres , & que ce qui fait qu'on n'en trouve ordinairement pas d'unies parfaitement , c'est que des Larmes étant naturellement poussées vers le grand Angle , rompent l'Union de cette Membrane fine du côté du Nez , & font pour ainsi dire la moitié de l'Operation.

L'on connoîtra aisément cette espèce de Conjonction des Paupieres , en en tirant une en haut , & l'autre en bas ; car alors les portions qui ne sont point unies s'ouvrent , & on voit une Pelli-
cule fine au-delà de leurs bords inté-

rieurs , qui empêche de les écarter davantage.

La seconde Cause qui fait l'Union des Paupieres ensemble , dépend des Ulceres qui viennent à leurs bords , & qui sont pour l'ordinaire accompagnés d'Inflammation de la Conjonctive , & par conséquent de difficulté de souffrir la Lumiere , & qui oblige les Malades d'avoir toujours les Yeux fermés ; cette approche continuelle des deux Paupieres occasionne la réunion de leurs bords , principalement du côté du petit Angle , par la même raison que j'ai dit ci-dessus.

La troisième Cause qui occasionne cette réunion vient des Brulures , lesquelles produisent une Playe aux deux bords des Paupieres. Lorsqu'il s'y joint Inflammation de l'Oeil , & difficulté de souffrir la Lumiere , cet accident contraint les Malades de tenir leurs Paupieres continuellement fermées , d'où s'ensuit leur réunion.

La quatrième qui unit les Paupieres non seulement avec la Conjonctive , mais aussi leurs bords ensemble , est lorsque la Brulure a endommagé , & les deux bords des Paupieres , & aussi leur surface interne avec la Conjonctive ; ce cas arrive bien souvent , de la Chaux vive qui saute dans les yeux , soit en l'étei-

gnant , ou autrement , & qui brule les endroits des Paupieres , & de la Conjonctive auxquels elle s'est attachée. Il s'ensuit une Inflammation qui tient long-tems les Yeux fermés ; à la fin la Chaux s'échappe , & sort de l'Oeil avec les Larmes ; & les Plaies des Paupieres & de la Conjonctive venant à se cicatriser ensemble , forment la derniere espèce d'Union.

Cette Maladie se fait assez connoître ; car on apperçoit facilement en examinant l'Oeil , si l'Union est simplement des Paupieres ensemble , ou si elle est du Globe de l'Oeil avec les Paupieres.

On peut dire pour le Pronostic de cette Maladie , que si l'Union vient de naissance , elle est très aisée à guérir ; mais lorsqu'elle a pour Cause la Brulure , ou l'Ulcération des Paupieres , elle est plus difficile , & encore plus , si la Paupiere est unie avec le Globe de l'Oeil.

On ne fauroit guérir cette Maladie qu'en separant les parties unies ensemble , & empêchant qu'elles ne se réunissent après l'Opération.

Dans l'Union qui vient de naissance , on introduira une sonde creuse par l'ouverture qui se trouve du côté du grand Angle ; on la poussera aussi loin qu'il se pourra du côté du petit Angle. Ensuite

on introduira un Bistouri droit dans la sonde creuse pour couper la Membrane qui fait l'Union , jusqu'à la rencontre des deux Cartilages vers le petit Angle. Pour empêcher que la Membrane coupée ne se réunisse pendant le sommeil , on graissera les deux bords avec du Cerat réfrigérant. On peut encore introduire entre l'Oeil & la Paupiere , une Plaque de Plomb en forme d'Oeil postiche , au milieu de laquelle il y aura une petite Languette qui empêchera l'attouchement des deux Paupieres. On aura soin de laver l'Oeil & les Paupieres trois fois le jour avec un Collyre fait de parties égales d'Eaux de Rose & de Plantin , dans lesquelles on aura délayé un peu de Tutie préparée.

Si l'Union est des Paupieres avec le Globe de l'Oeil , il faut en faire la séparation avec un Bistouri fin , qui ait à son extrémité un petit Bouton , afin d'empêcher que la pointe ne puisse blesser l'Oeil ni la Paupiere , pendant que l'on fera la division de l'Union qui se doit faire en levant avec les doigts la Paupiere. Ensuite on introduira le Bistouri entre le Globe & la Paupiere à côté de l'Union que l'on coupera , en évitant de couper plus du côté du Globe que de la Paupiere. Lorsque l'Union

fera bien séparée , on mettra entre le Globe & la Paupiere une Plaque de Plomb en forme d'Oeil postiche sans Languette , & on aura soin de laver l'Oeil trois ou quatre fois le jour avec le Collire que j'ai décrit , après avoir ôté la Plaque de Plomb que l'on remettra aussi-tôt ; ce qu'il faut continuer jusqu'à ce que les deux Playes soient cicatrisées.



CHAPITRE XVII.

*Des Hidatide ou Phlictenes des Paupieres
& de la Conjonctive.*

IL arrive souvent qu'il se fait sur le bord des Cartilages des paupieres , ou sur la Conjonctive , une élévation semblable aux Vessies qui paroissent sur la peau dans les Brulures. Elles deviennent de la grosseur d'un pois ou d'une Lentille , & sont remplies d'une Eau fort claire. On les appelle Hidatides , à cause de la Lymphes qu'elles contiennent. Quelquefois il s'épanche une Sérosité entre la Conjonctive & la Tunique qui la recouvre , laquelle Sérosité les sépare l'une de l'autre , en sorte que dans les mouvemens de l'Oeil , on s'apperçoit par une espèce de ride , qu'il y a une Eau repandue entre ces Membranes qui

y cause un gonflement. Cette Maladie n'est point dangereuse , mais seulement incommode , lorsqu'elle n'occupe qu'une petite partie de la Conjonctive ou du bord de la Paupiere. Le plus sur Remede pour sa guérison , est de la piquer adroitement avec la pointe d'une Lancette , faisant l'ouverture de la longueur de l'élevation ; dans le moment cette petite Poche se vuide de son humeur , & la guérison s'ensuit sans autre Remede.

Quand il arrive que l'Eau occupe tout le tour du Globe , la Conjonctive paroît rouge ; il faut dans ce cas saigner le Malade ; si l'on voit que la Sérosité diminue , le purger , & mettre dans l'Oeil d'une Eau composée avec un demi Gros de la Pierre de Crollius , dissous dans un demi-septier d'Eau commune ; ou bien on se servira d'un Vin dans lequel on aura fait bouillir des Roses de Provins , de la Sauge , du Thim & de l'Absinthe ; l'eau de Chaux y fait encore très-bien. Par ces moyens , on achevera bien-tôt de dissiper cet amas de Sérosités.



CHAPITRE VIII.

*Des Excroissances de Chair qui se trouvent
entre les Paupieres & le
Globe de l'Oeil.*

IL y a deux sortes d'Excroissances de Chair qui viennent entre le Globe de l'Oeil & les Paupieres, l'une est petite, & n'attaque que la Caroncule lacrimale; l'autre est plus grande, & naît entre la Paupiere & le Globe.

Ces Excroissances ont leur superficie extérieure divisée en plusieurs petits Grains, semblable à ceux que l'on voit à une Mûre; c'est pourquoi on peut leur donner le nom de Mûres. Elles sont souvent rouges, & quelquefois cette couleur tire sur le plombé.

Leur cause vient quelquefois des Larmes, qui par leur âcreté écorchent la superficie des endroits, où ces Excroissances prennent naissance, d'où il arrive qu'il s'en élève une espèce de Chair, comme un *Fungus* qui devient plus ou moins gros.

D'autres fois, elles sont causées par un Sang arrêté, qui par son séjour tuméfiera quelques Vaisseaux, ou les rongera, sans que leurs parties extérieures

soient ulcerées ; d'où il arrivera que le Sang s'amaissant vers cet endroit, en gonflera la Tiffure, & ainsi fera naître une Excroissance.

Ces fortes d'Excroissances ne sont pas dangereuses, lorsqu'on y remédie de bonne heure. Je me fers de deux moyens pour les ôter ; premièrement, je les touche avec la Pierre infernale, lorsque l'endroit qu'elles occupent est propre pour cela, prenant bien garde que la Pierre ne porte sur aucune autre partie de l'Oeil, mais précisément sur l'Excroissance.

Le second moyen est d'y passer une Aiguille enfilée de Soye pour les soulever, afin d'en faire l'extirpation avec les Ciseaux droits ou la Lancette. Après qu'elles sont ôtées, on met de légers Consomptifs sur la Playe ; comme la Poudre faite d'une partie d'Alun avec huit parties de Sucre candi, dont on mettra soir & matin gros comme une Lentille sur la Racine de l'Excroissance.



CHAPITRE XIX.

Des Abscesses qui se forment entre le Globe de l'Oeil & l'Orbite.

IL se fait de deux sortes d'amas entre le Globe de l'Oeil & l'Orbite ; savoir l'Abscess qui suit l'Inflammation de

cet endroit, & le dépôt d'Humeurs sur les Graisses qui environnent le Globe. Je traiterai dans ce Chapitre de l'Abcès, dont les Signes sont Tumeur, Douleur, & Rougeur du Globe.

Si l'Abcès est derrière ou à côté du Globe de l'Oeil, la matiere qui le forme, le poussera vers la partie opposée à son amas.

Lorsque l'Inflammation dégénère en Abcès, la fièvre survient avec Insomnie, & il y a pulsation douloureuse dans l'endroit où se veut former la matiere, jointe à une douleur de Tête violente.

Dans les Abcès du fond de l'Orbite, lorsque la matiere est abondante, elle pousse le Globe de l'Oeil en dehors; & allonge le Nerf optique, d'où s'ensuit souvent la perte de la Vue.

Lorsque cette Maladie commence, elle cause une douleur dans l'Orbite, & l'on s'apperçoit que le Globe se porte en dehors. C'est alors qu'il faut mettre le Malade à un Regime très exact, qui consiste à ne prendre que des Bouillons & de la Tisane, & il faut le saigner suivant la plénitude des Vaisseaux; car cette Maladie demande ce que le sang ne soit point ménagé. On appliquera dans l'Oeil des Collires propres pour résoudre

dre , & empêcher que la matière qui doit se changer en Abscès , ne soit point abondante. Pour cet effet , on fera bouillir des Fleurs de Melilot & de la Graine de Lin dans des Eaux de Fenouil & de Plantin , dont on lavera le dedans de l'Oeil , & le dessus des Paupieres de tems en tems , appliquant sur l'Oeil une Compresse trempée dans cette Liqueur.

Si l'on juge que l'Inflammation dégénere en Abscès , il faut battre un blanc d'Oeuf , & le mêler avec de la Moelle de Pomme cuite , pour l'appliquer chaude sur l'Oeil , sans le comprimer.

Dès qu'on s'apperçoit que la matière est formée , il faut ouvrir l'Abscès ; parce que plus on diffère , plus la matière devient abondante , & capable de carier les Os voisins.

On doit chercher l'endroit où est la matière , & l'ouvrir avec une Lancette , en suivant la direction des Fibres du Muscle orbiculaire. Quand l'ouverture est faite , & que la matière est vidée on y met une Tente d'Eponge préparée ; & dans la suite , on seringue dedans une Teinture d'Aloës soir & matin , & l'on y met une Tente de Cire , jusqu'à ce que l'on voye que l'Ulcere étant bien mondifié , il soit en état d'être refermé.



C H A P I T R E X X.

Des Amas d'Humeurs qui se font derrière le Globe de l'Oeil.

IL se fait d'autres Amas que de Pus derrière le Globe de l'Oeil , qui le font faillir en dehors ; car souvent une Sérosité abondante , ou une Humeur épaisse & glaireuse s'infiltrant dans les Graisses de derrière le Globe , les tumefie ; & pousse le Globe en dehors comme dans l'Abscess.

Je rapporterai trois Observations de cette Maladie qui est peu fréquente , afin que l'expérience de la guérison que j'en ai faite , puisse servir à ceux qui en auront de semblables à traiter.

La première Observation fut dans la Personne de Mr. le Brun , Marchand dans la Rue Saint Denis , à l'Enseigne du Dauphin. Les Graisses de derrière le Globe s'étoient tuméfiées conjointement avec la Glande lacrimale par une Humeur visqueuse ; en sorte que le Globe étoit poussé en dehors au moins de trois lignes. Plusieurs Chirurgiens vouloient extirper la Glande lacrimale dans l'espérance que la supuration qui arriveroit à la Playe , feroit rentrer le Globe ; &

qu'ainsi le gonflement des graisses se dissiperait. Je fus d'un sentiment contraire, dans la crainte qu'en faisant cette Opération, la Maladie qui me paroissoit d'une nature de Scrophule, ne dégénérât en Cancer. Je le guéris parfaitement, en lui faisant user pendant trois mois de l'Æthiops minéral, de la même manière que je l'ai dit, en traitant des Ophthalmies scrophuleuses.

La seconde Observation fut sur un jeune Homme de Saint Germain en Laye, qui vint à Paris ayant le Globe de l'Oeil enflammé, larmoyant, & extrêmement poussé en dehors. Les Paupieres pressées par le Globe contre les bords de l'Orbite étoient enflées, & même la supérieure commençoit déjà à devenir livide, comme si la Gangrène eût voulu s'y mettre. Je fus appelé avec le Chirurgien de Mr. le Duc Dantin. Ce jeune Homme nous dit que son mal lui étoit venu d'un Coup de Soleil, qui d'abord lui avoit causé des douleurs au fond de l'Oeil, & qu'ensuite de ces douleurs, il étoit tombé dans le fâcheux état où il se trouvoit. Je jugeai d'abord qu'il pouvoit y avoir un Abscès derrière l'Oeil, ou que les Graisses qui environnent le Globe étoient tumefiées par le dépôt de quelque matière vis-

queuse infiltrée dans ces Graisses : que s'il y avoit un Abscès , il falloit passer la Lancette au bas de l'Orbite au travers du Muscle orbiculaire , pour aller chercher la matiere qui environnoit le Globe. Mais pour ne pas faire une pareille Opération sans nécessité , je voulus m'assurer auparavant , si ce ne seroit pas quelque Humeur visqueuse qui auroit causé ces accidens.

Pour cet effet , je lui conseillai de prendre le soir huit grains de Mercure doux , & de se purger le lendemain avec une Medecine composée de Sené , de Manne & du Jalap , que l'on y délaye après l'avoir passée. Le soir de la Medecine , je le fus saigner de la Gorge.

Ayant remarqué que la Purgation avoit soulagé ce Malade , je lui continuai de deux jours l'un le Mercure & la même Medecine , qui le guérèrent en peu de jours d'un mal où il y avoit également à apprehender la perte de la Vue , & la destruction entière de l'Oeil.

La troisième Observation fut sur une Fermiere de Damartin , que j'avois traitée à Paris il y avoit du tems , d'un amas d'Humeurs visqueuses , qui gonfloient les Graisses situées derrière le Globe de l'Oeil , & le pouffoit en dehors. Cette Maladie étoit accompagnée de douleurs insupportables & d'insomnies ; & quoique

je les eusse apaisées par l'usage des remèdes , l'Oeil ne laissoit pas d'être toujours un peu plus faillant que l'autre. Trois ans après , je fus appelé pour l'aller voir à Lagny le sec où étoit sa demeure. Il y avoit chez elle un Médecin de Meaux & un Chirurgien de Damartin. Ayant examiné la malade , je trouvai le Globe de l'Oeil extrêmement poussé en dehors , & ses Membranes même tuméfiées. Le corps de l'Oeil étoit déjà d'une couleur plombée , & prêt d'être gangrené. Elle avoit une Fievre maligne , jointe à des Taches rouge sur tout le Corps , avec de grandes douleurs de Tête. Je fis mon Pronostic , que si on lui ôtoit le Globe de l'Oeil , elle seroit en danger d'en mourir ; & qu'en le lui ôtant l'Opération seroit suivie d'une évacuation qui soulageroit la Tête. J'assurai que vers le tems de la suppuration de la Playe , la Fievre & tous les accidens cesseroient. Le Médecin & le Chirurgien furent de mon sentiment. C'est pourquoi je lui fis l'Opération dans le moment , en extirpant l'Oeil le plus avant qu'il me fut possible , & près de l'endroit où le Nerve optique se joint au Globe. Ensuite je le pansai avec un Collire défensif , composé du blanc & du jaune d'Oeuf , & de

l'Huile Rosat , en appliquant sur l'Oeil une Compresse trempée dans ce Remède.

Entre le quatrième & cinquième jour de l'Opération , la Fievre & tous les accidens cessèrent , & elle fut guérie vers le vingtième jour d'après l'Opération , par l'usage de l'Eau de la Pierre Divine , dont j'e fis laver l'Oeil trois fois dans la journée.



CHAPITRE XXI.

Opération d'une Tumeur singulière dans l'Orbite.

J'AI traité une jeune fille de Gonesse , âgée de douze ans en 1718 , d'une Tumeur très particulière , dont voici l'Observation.

Cette Tumeur prenoit son origine au bas de l'Orbite au-dessous du Globe de l'Oeil , dont elle tournoit la Prunelle vers le haut de la Paupiere supérieure , & pouffoit la Paupiere inférieure d'un demi pouce & d'avantage en dehors. Ensuite elle s'étendoit de la largeur d'un pouce en descendant sur la Joue.

Je pris jour avec Mr. Mery , premier Chirurgien de l'Hôtel-Dieu , Mr. Carrerre , Chirurgien de S. A. R. Madame , & autres.

Je fis un Incision à la Peau & au Muscle orbiculaire en forme de Croissant

renversé , aussi longue que l'étendue de la Tumeur l'exigeoit ; ensuite je piquai la Tumeur avec un Airhigne pour la soulever , je la separai avec un Bistouri des endroits auxquels elle étoit adherante , savoir du Muscle orbiculaire , & de la Membrane commune à l'Oeil , & à la Paupiere inférieure. La Tumeur separée , je coupai avec des Ciseaux droits sa Racine qui étoit dure comme un Cuir bien ferme ; après quoi je pansai cette Playe avec un Digestif , & dans l'espace de treize jours , elle fut parfaitement guérie. L'Oeil reprit sa place , la Prunelle se trouva dans sa situation naturelle , & la Malade revoit de cette Oeil comme de l'autre.

Il faut remarquer que cette Tumeur avoit trois Cavités. Celle qui étoit la plus proche de la peau contenoit une matière purulente assez liquide. La seconde étoit remplie d'une matière plus épaisse , & en partie plâtreuse. Celle de la troisième étoit comme du blanc d'Oeuf.

J'avois conçu avant de faire cette Opération , qu'il y avoit deux inconveniens à éviter , qui auroient pu en empêcher la réussite. Le premier étoit de couper la Membrane commune à l'Oeil & à la Paupiere , parce que si cela étoit arrivé , les Larmes qui coulent continuellement

dans l'Oeil , feroient tombées dans la Playe , & l'auroient empêché de se refermer.

Le second inconvenient étoit de couper le Canal commun , qui porte les Larmes dans le Sac lacrimonal ; parce qu'au lieu de prendre la route du Nez , elles auroient pris celle de la Playe , & auroient fait obstacle à fa guérifon.



CHAPITRE XXII.

Des Excroissances de Chair qui viennent sur le Globe de l'Oeil.

LEs Excroissances de Chair qui arrivent sur le Globe de l'Oeil , sont plus ou moins élevées , selon leur grosseur. Elles viennent après quelques Coups ou Playes reçues à l'Oeil , où elles se produisent d'elles-mêmes par la rupture de quelques Vaisseaux sanguins. J'ai vu arriver une Excroissance de la grosseur d'un Pois , par une Dragée reçue d'un coup de Fusil , laquelle ayant frappé l'Oeil du côté du petit Angle , avoit pénétré jusques dans le Globe , un peu plus loin que l'endroit où l'on pique ordinairement pour l'Opération de la Cataracte. Je jugeai que la Playe en se cicatrisant , serviroit de ligature à cette Excroissance ,

& qu'elle tomberoit d'elle-même ; ce qui arriva vers le trente-cinquième jour.

Il se trouve quelquefois des Excroissances sur la Cornée transparente. Il y a des Auteurs qui prétendent les emporter avec du Sublimé corrosif ; pour moi j'y fais l'Opération que je proposerai pour le Staphilome ; j'y mets ensuite tous les matins du Sel marin en poudre , gros comme une Lentille à la fois , pour achever de les consumer.

J'ai vu à un Invalide une Excroissance charnue dans l'Oeil , qui étoit de la longueur d'un pouce & demi. Elle prenoit son origine vers l'endroit du Globe de l'Oeil ; où la partie charnue du Muscle abaisseur se termine. Son volume étoit si considérable , qu'il pouvoit le Globe de l'Oeil en haut , & la Paupiere inférieure en dehors , à laquelle elle étoit adhérente. La pression de cette Tumeur sur l'Oeil , & l'écartement qu'elle faisoit dans les Paupieres , lui causoit des douleurs de tête insupportable avec insomnie.

Après avoir examiné cette Excroissance qui me parut fort dure , & comme un Fic , je crus pouvoir l'ôter ; mais pour la guérir parfaitement , je jugeai qu'il falloit extirper le Globe de l'Oeil en même tems : ce que je fis en présence de Mr. Carrerre , Chirurgien de S. A. R.

Madame , & Mr. Marcel auffi Chirurgien. Je paſſai une Aiguille dans la Tumeur avec un Fil qui me ſervit pour la ſoulever ; je la coupai enfuite le plus près de l'Oeil qu'il me fut poſſible. Il ſurvint une Hémorragie qui fut arrêtée par une Eau Stiptique faite avec le Vitriol de Cypre diſſous dans de l'Eau commune. Le ſur-lendemain de l'Opération , je reportai mon Aiguille avec la Soye dans le Globe , pour ôter la Racine de la Tumeur que je n'avois pu enlever la première fois. Je ſeparai d'abord la Tumeur de la Paupiere inférieure , & enfuite je l'extirpai conjointement avec le Globe de l'Oeil ; il en arriva une ſeconde Hémorragie , mais qui ne fut pas violente ; le Malade fut ſoulagé & guéri en peu de tems , ſans qu'il reſtât , ni Infomnie , ni douleur de Tête.

J'ai fait une autre Opération à une pauvre Femme âgée d'environ quatre-vingt ans , qui demeuroit à la Porte Saint Jacques. Elle avoit un Oeil chancreux , au-deſſus duquel il vint à l'endroit de la Cornée transparente un *Fungus* , qui par ſon élévation empêchoit les Paupieres de ſe fermer. J'en fis l'extirpation comme du précédent , mais le plus avant qu'il me fut poſſible , vers l'endroit de l'Union du Globe avec le Nerf optique.

118 TRAITÉ DES MALADIES
Cette Femme fut guérie en peu de tems ,
nonobstant son grand âge.



CHAPITRE XXIII.

De l'Onglet , ou Pterigion.

QUOIQUE l'on entende par Onglet ou Pterigion , une Excroissance charnue ou graisseuse qui prend son origine au grand Angle de l'Oeil , entre les deux Tuniques de Lames de la Conjonctive , qui s'avance quelquefois jusques , & même par de-là la Prunelle ; cependant ce n'est bien souvent qu'un amas de Vaisseaux sanguins , qui se remplissant d'un sang épais , forment une espèce de Membrane. Il faut remarquer que l'Onglet ne prend pas toujours son origine du grand Angle , puisqu'on le voit naître souvent du petit , aussi-bien que de la partie supérieure & inférieure du Globe. Il arrive aussi quelquefois , qu'il occupe en même tems toutes les parties extérieures & antérieures du Globe.

Lorsque l'Onglet est dans son commencement , & qu'il est joint à une Inflammation de la partie de l'Oeil qu'il occupe ; on peut le guérir sans l'Opération , en usant des Remèdes qui font cesser l'Inflammation , pourvu qu'ils ne

soient pas violens , comme ceux que plusieurs Auteurs proposent. Je me fers utilement de la Pierre Divine dissoute dans l'Eau commune , ou de celle de Crollius ; l'on ne les guérit point par ces moyens , il en faut venir à l'Opération qui suit.

On fera asseoir le Malade à terre sur un Oreiller ; l'Opérateur étant assis derrière lui , le tiendra entre ses jambes , en renversant la tête du Malade sur sa Cuisse gauche , si c'est l'Oeil droit ; dans cette situation , il opérera de la manière suivante.

Il faut passer une Aiguille courbe enfilée de Soye sous les Vaisseaux qui forment l'Onglet , en sorte qu'elle les embrasse tous ; on la relevera ensuite , & on liera les deux bouts de la Soye par un double nœud ferré dans le milieu du Corps de l'Onglet ; afin que lorsqu'un des bouts de l'Onglet sera coupé , la Soye ne s'échappe pas. On tirera pour lors les deux extrémités de cette Soye , pour élever un peu l'Onglet par son milieu. L'on coupera avec une Lancette la Membrane qui recouvre les Vaisseaux tout le long de l'Onglet , au-dessus & au-dessous. On passera ensuite une branche de Ciseaux droits & fins entre le Corps de l'Onglet & la Conjonctive , & l'autre branche par-dessus à l'endroit de l'Union de l'On-

glet avec la Caroncule lacrimale , & l'on coupera tous ces Vaisseaux d'un coup de Ciseaux ; ensuite on levera avec la Soye ce que l'on vient de couper , & on le renversera du côté opposé , afin de dissequer & de séparer avec une Lancette toutes les attaches qu'il a avec la Cornée transparente. On pansera ensuite l'Oeil les quatre premiers jours avec de l'Eau & de l'Eau de Vie ; & pour cicatrifier la Playe , on se servira de la dissolution de la Pierre Divine dans de l'Eau Commune.

Si l'Onglet occupe le tour de l'Oeil , on le partagera en quatre , on n'en prendra que le quart à la fois avec l'Aiguille qui n'en sauroit embrasser d'avantage , & on opérera comme je l'ai dit ; ce que l'on réitérera , jusqu'à ce que tous les Vaisseaux qui sont sur la superficie extérieure de l'Oeil , soient coupés. Le pansement fera de même.

Si c'est à l'Oeil gauche , il faut lorsqu'on a passé l'Aiguille , & lié l'Onglet , lever le Malade , & le mettre sur une Chaise pour achever l'Opération qui ne se pourroit faire , si le Malade étoit dans la première situation ; l'Opérateur n'étant pas en main , à moins qu'il ne soit parfaitement Ambidextre. S'il arrive que l'Onglet soit formé par un Corps graisseux.

graisseux , il faut tirer la Soie dont il a été lié bien doucement , de crainte qu'elle ne le coupe par son milieu.



CHAPITRE XXIV.

Des Yeux Louches.

IL y a des sentimens differens parmi les Auteurs , touchant les Louches. Les uns prétendent , que la cause de cette difformité est un Vice de la Cornée transparente qui est trop voutée ou placée obliquement. D'autres veulent que ce soit un défaut du Cristallin ; mais ils se trompent tous ; car elle ne dépend que d'un Vice des Muscles , comme je vais le faire voir.

On appelle Louche celui de qui l'un des Yeux n'est pas tourné du côté de l'Objet qu'il regarde. Les personnes qui ont ce défaut , louchent tantôt de l'un des Yeux , & tantôt de l'autre ; quelquefois il paroît que tous les deux louchent en même tems. Il y en a qui ne louchent que très-peu , lorsqu'ils sont près de l'Objet qu'ils regardent , & davantage quand ils en sont éloignés. D'autres louchent d'un Oeil étant près de l'Objet , & de l'autre à une distance plus éloignée. Lorsqu'on ferme l'Oeil qui ne louche point .

celui qui louchoit se redresse , & en ouvrant la Paupiere , on trouve louche celui qui étoit droit auparavant.

Tous ces differens examens des Yeux louches , font assez voir qu'il y a une discordance de mouvement dans un des Muscles droits de l'Oeil , & que la Cause vient de ce que les Esprits animaux ne coulent pas également dans tous : ce que je viens de dire , regarde les Louches dès l'enfance. Outre cela , cette Maladie peut encore arriver à tout âge ; mais dans ces cas , le défaut provient pour l'ordinaire d'une Paralyfie d'un des Muscles droits de l'Oeil. Les personnes qui ont cette Maladie voyent deux ou trois Objets , & quelquefois plus , lorsqu'elles n'en regardent qu'un ; on appelle cela communément voir double , ce qui fait , parce que les deux Prunelles ne sont point en Ligne pararelle , d'où il arrive que les rayons de la lumiere qui se refléchissent d'un Objet tombent dans un Oeil sur une Fibre , & dans l'autre Oeil sur une autre Fibre qui ne répond pas au même point , d'où la premiere tire son origine ; ainsi l'impression , que la lumiere fait dans les deux Yeux , tombant sur les différentes Fibres qui ne partent pas du même point , il en résulte une double ou tri-

ple sensation à ce que l'on appelle le sens commun ; ce qui fait voir la multiplicité des Objets.

Pour mieux expliquer ceci , on fait que la vue se fait par des Fibres nerveuses qui se distribuent tout autour de la cavité intérieure des deux Globes des Yeux , & qui répondent à un même principe dans le Cerveau d'où elles tirent leur origine. Les Fibres qui sont du côté du grand Angle d'un des Yeux ont rapport à celles qui sont du côté du grand Angle de l'autre. Lorsqu'ils sont frappés également par la lumière réfléchie d'un Objet , il ne se fait qu'une même sensation dans leur principe ; c'est pourquoi on ne voit qu'un Objet ; mais la Prunelle d'un Oeil qui louche n'étant plus en Ligne pararelle avec l'autre , il arrive , comme je viens de dire , que certaines Fibres sont ébranlées par la Lumière dans l'un des Yeux , tandis que dans l'autre la Lumière frappe celles qui ne correspondent point aux premières ; ce qui produit le dérangement dans la Vision. Pour en faire l'expérience , il n'y a qu'à appuyer un doigt sur l'une des Paupieres , enforte que l'on fasse descendre le Globe de l'Oeil plus bas que l'autre ; pour lors les Prunelles ne se trouvant plus en ligne pararelle , ou d'égale hauteur , on

124 TRAITÉ DES MALADIES
voit double par la raison fufdite.

Toute la différence qu'il y a entre les Personnes qui louchent dès leur enfance , & celles à qui ce défaut arrive dans un âge plus avancé , est que les premières ne voient point double , comme il arrive aux dernières. Dans les premières , l'Oeil qui louche tourne de tous les côtés également , en leur fermant l'Oeil qui paroît fain ; au-lieu que dans les dernières en fermant l'Oeil fain , l'autre ne peut se porter au côté opposé à celui vers lequel la Prunelle est tournée. On voit par-là que dans les enfans , la cause vient du défaut des Esprits qui ne se portent point également dans les Muscles , ou Adducteurs , ou Abducteurs des Yeux ; ce qui fait que le Globe tourne d'un côté : au-lieu que dans les Personnes âgées , l'un des Muscles se trouvant attaqué de Paralyfie , l'Oeil demeure comme immobile vers un côté par la contraction du Muscle Antagoniste , & ne peut se diriger vers la partie opposée à celle qui est relâchée.

Après avoir fait connoître la différence de cette Maladie venue dès l'enfance , & de celle qui arrive dans un âge plus avancé , il faut parler des Remedes qui y conviennent. Je commencerai par celle des Enfans , dont la guérison consiste à retablir le cours regulier des ef-

prits dans les Muscles ; on pourra y réussir en s'y prenant de la maniere suivante.

On fera asseoir l'Enfant vis-à-vis d'un Miroir , & dans cette situation , on lui fera regarder directement son visage dans ce Miroir ; enforte que chaque Oeil regarde précisément la Prunelle de celui qui lui correspond dans le Miroir ; en lui faisant faire cet exercice un quart d'heure le matin , & autant le soir , à la fin la Vue se redresse. Outre cela , on pourra lui faire lire des écritures menues, ou travailler à des ouvrages fins qui demandent de l'application.

Il faut observer , lorsque les Enfans regardent quelque Objet , qu'ils ne le mettent pas de côté ; c'est pourquoi pendant que les Organes sont tendres , il faut les accoutumer à regarder droit , comme font toutes les personnes qui ne louchent point. Dans le tems de ces exercices , il faut appliquer aux yeux des Remedes spiritueux pour rappeler dans les Fibres nerveuses les Esprits nécessaires à faire agir le Muscle qui paroît relâché : On se sert avec succès de l'eau de la Reine d'Hongrie , du Baume de Fioraventi , & choses semblables , dont il faut frotter trois fois le jour le Front , les Tempes , & le dessus des Paupieres.

A l'égard des Bescicles qui sont d'un

ancien usage , lorsqu'on les met aux Enfans , il arrive d'ordinaire qu'ils ne regardent que par le trou d'une de ces Bescicles , pendant que l'autre Oeil demeure louche ; c'est pourquoi j'ai inventé une espèce de Nez de Masque qui doit couvrir une partie de l'Oeil qui louche , ou des deux , lorsqu'ils louchent tous deux. Il ne doit s'étendre sur les Yeux que jusqu'aux Prunelles , enforte qu'il les laisse entièrement découvertes. On est aussi quelquefois obligé de couvrir entièrement l'Oeil qui ne louche point , afin que celui qui louche se redresse , & que l'action qu'il fait tout seul , l'habitue à regarder droit.

Quant aux Personnes plus âgées , cette indisposition peut être venue pour avoir eu froid à l'Oeil & à la tête , ou par une fonte d'humeurs qui se déposent sur les Muscles de l'Oeil. Quelquefois un Rhumatisme sur ces Parties produit le même effet.

On guérit cette Maladie par les Saignées , les Purgatifs , & quelquefois l'Éméétique ; on applique à l'Oeil la vapeur du Caffé soir & matin , & celle de l'Esprit de Vin ; on fait boire la Décoction d'Euphrase , & de bois de Sassafras. Tous les Remedes qui conviennent à la Para-

lisie , y conviennent aussi , tels que sont les Eaux Minérales chaudes , &c.

Cette indisposition a quelquefois pour cause une chaleur d'entrailles , ou des Vapeurs qui se portent à la Tête ; alors on est obligé de saigner du pied , de faire boire des boissons rafraîchissantes , & de prendre les Bains domestiques ; & quelquefois les Eaux Minérales rafraîchissantes ; sur quoi il faut toujours se rapporter à l'avis de Messieurs les Médecins.

Fin de la premiere Partie.



NOUVEAU TRAITÉ DES MALADIES DES YEUX.

DEUXIEME PARTIE.



DES MALADIES QUI ATTAQUENT LE GLOBE DE L'OEIL.

CHAPITRE I.

De la grosseur démesurée du Globe de l'Oeil.

J'AI traité dans la première Partie des Maladies qui font avancer l'Oeil hors de l'Orbite, sans que le Globe ait grossi. Je vais maintenant parler de celles qui attaquent les parties dont il est composé, en commençant par sa grosseur démesurée.

J'ai remarqué deux sortes de Maladies qui font grossir le Globe de l'Oeil. La première est, lorsqu'il se trouve dans le

Globe une trop grande abondance d'Humeur aqueuse , qu'on peut regarder comme une Hidropisie du Globe. La seconde , lorsque ses Membranes deviennent extraordinairement épaisses & comme charnues , & ensuite carcinomateuses ; enforte que par sa grosseur , ne pouvant être contenu dans l'Orbite , il s'avance en dehors. Je ne prétend point parler ici des Yeux qui sont naturellement gros , mais de ceux à qui cette grosseur est accidentelle.

A l'égard de la première Cause qui donne lieu à l'augmentation du volume du Globe de l'Oeil , il est aisé de voir que si les Canaux qui servent à repomper l'Humeur aqueuse , ou si les Pores par lesquels elle s'échappe viennent à s'obstruer , pendant que ceux qui la fournissent restent dans leur naturel ; il est aisé , dis-je , de voir que pour lors l'augmentation de cette liqueur doit nécessairement occasionner celle du Globe.

Quoique par les Expériences anatomiques l'on soit persuadé de la reproduction continuelle de l'Humeur aqueuse , la Pratique journaliere ne nous en laisse aucun doute , puisque quand on est obligé de faire une incision à la Cornée transparente pour faire sortir du pus ; ou quelque Caractere placée dans

la Chambre antérieure , il s'écoule en même tems beaucoup d'Humeur aqueuse , qui flétrit l'Oeil dans le moment , & dès le lendemain on le trouve rempli comme auparavant ; ce qui ne se peut faire que par une reproduction continuelle & prompte de cette Humeur.

Quant à la seconde cause qui fait grossir le Globe : on fait que les Membranes qui le composent , sont garnies d'une infinité de petits Vaisseaux artériels , qui lui fournissent continuellement le Sang pour leur nourriture , & des Veines qui en reportent le superflu ; ainsi lorsque ce Sang est trop grossier pour entrer dans les Vaisseaux qui doivent le reporter , il séjourne dans ces Membranes , s'y épaiscit , & les rend comme charnues.

Si le séjour d'un Sang grossier contribue à son épaissement , la séparation continuelle de la Lymphé nécessaire pour la nourriture des Corps transparens de l'Oeil n'y a pas moins de part , en ce que le Sang étant dépouillé de ces parties fluides , devient plus tenace , & par conséquent disposé à produire l'effet dont je viens de parler.

Si l'Humeur aqueuse est la Cause de cette Maladie , on voit les Yeux faillir hors de l'Orbite ; en sorte qu'ils ont pei-

ne à être recouverts par les Paupieres. Ordinairement les deux Yeux en sont attaqués en même tems.

Quand ce sont les Membranes du Globe qui deviennent charnues , pour l'ordinaire il n'y a qu'un Oeil d'attaqué. On ressent une douleur avec pesanteur dans cet Oeil qui grossit peu à peu , & vient quelquefois au point d'acquérir un volume qui excède de trois & quatre fois sa grosseur naturelle.

Cette Maladie diffère d'avec l'espèce d'Inflammation appelée Chemosis , dans laquelle il se fait un épanchement de sang entre les Membranes du Globe qui dégénère en Pus , comme nous dirons dans la suite ; au lieu que dans celle-ci , c'est un Sang épais qui ne s'épanche point , mais qui s'infiltré dans les Membranes , & rarement suppure. Dans la Chemosis , il y a une Inflammation violente dès le commencement avec une douleur aigue ; au-lieu que dans la Maladie dont nous parlons , l'Inflammation est mediocre dans son commencement , de même que la douleur qui n'augmente qu'à mesure que le mal fait du progrès.

La grosseur démesurée du Globe de l'Oeil , qui a pour Cause le séjour de l'Humeur aqueuse , n'est point dange-

reuse , elle fatigue seulement les Paupieres & la Vue ; mais celle qui a pour Cause l'épaississement des Membranes , est très dangereuse ; car non seulement elle fait perdre la Vue , mais encote très souvent la Vie ; parce que cette Maladie est comme un Cancer aux Membranes de l'Oeil , qui quoiqu'il ne s'ouvre quelquefois point comme dans les autres parties du Corps , ne laisse pas de causer dans la suite des douleurs violentes avec Fievre , qui à la fin font périr les Malades.

La Guérison de ces deux Maladies doit être différente selon les Causes qui les produisent. Si elles dépendent de l'Humeur aqueuse , il faut des Remedes qui agitent la Lymphes , & ouvre les Canaux obstrués ; ainsi les Purgatifs , les Attenuants & les Tisannes sudorifiques y conviennent.

Si au contraire ce sont les Membranes du Globe qui deviennent charnues , il faut user d'abord d'un Regime exact , comme dans le Cancer , qui tende à adoucir , humecter , & subtiliser le Sang ; en prenant des Bouillons faits avec les Ecrevisses , la Chicorée sauvage , le Cerfeuil & les autres Plantes de cette nature. Il faut saigner & purger le Malade , & lui faire prendre les Bains domestiques.

On appliquera sur l'Oeil des Remedes

anodins & résolutifs , semblables à ceux que j'ai marqué dans le Chapitre du Cancer des Paupieres , où je renvoye le Lecteur.

Il arrive quelquefois que la grosseur du Globe devient si incommode , que l'on est obligé de l'extirper. Alors il faut faire l'Opération le plus avant & le plus près du Nerf optique qu'il se pourra. Il arrive même bien souvent qu'ayant fait l'extirpation , il renaît des chairs qui prennent d'abord la forme du Globe , & qui augmentent ensuite de volume , & produisent un Champignon qui s'avance hors de l'Orbite , & met le Malade dans la nécessité de souffrir une seconde fois la même Opération. Je me fers avec succès en pareil cas de l'eau dont j'ai parlé dans le Chapitre du Cancer qui empêche cette recidive.



CHAPITRE II.

*Des Maladies qui suivent les Coups
reçus à l'Oeil.*

LEs Coups reçus à l'Oeil , sont plus ou moins violens ; c'est pourquoi les accidens qui les suivent sont differens. Je parlerai en traitant des Cataractes , de celles qui arrivent par des Coups , de même des Staphilomes qui sont produits

par la même cause. Je n'ai dessein de traiter ici que de la confusion des Humeurs de l'Oeil , lorsqu'il a été frappé par un coup violent qui ne l'a point entamé , comme aussi du contre-coup qui se fait sur le Nerf optique. Quelques Vaisseaux sanguins venant à se rompre par la violence du coup , font un épanchement de Sang sur les parties principales de la Vision , d'où il résulte une diminution considérable de la Vue.

Lorsque le Coup a causé une Echimose & une confusion dans les Humeurs de l'Oeil , par la rupture d'un Vaisseau sanguin de l'Uvée , en regardant par le trou de la Prunelle , on n'y distingue aucune des Humeurs qui toutes paroissent mêlées de Sang , c'est pourquoi on appelle cette Maladie confusion des Humeurs de l'Oeil.

Pour y remédier , il faut d'abord saigner le Malade plusieurs fois , afin de vider les Vaisseaux ; & empêcher qu'il ne s'épanche de nouveau Sang. On saigne un Pigeon sous l'Aîle , on en fait couler quelques gouttes dans l'Oeil soir & matin , & on met par-dessus une Compresse trempée dans un mélange de deux cuillerées de Vin , mêlées avec quatre gouttes du Baume du Commandeur. Toutes les fois que l'on panse le Malade ,

on lave l'Oeil auparavant avec un mélange d'une cuillerée d'Eau vulneraire , & six cuillerées d'eau commune tiedie. Par ce moyen , on rétablit la Vue en résolvant le Sang épanché , supposé que le fond de l'Oeil n'ait point été endommagé.

Lorsqu'un coup violent a frappé le Corps de l'Oeil , s'il n'y paroît rien dedans , & que les Malades voient seulement la clarté de la Lumiere d'une couleur rouge , sans distinguer les Objets , on doit juger qu'il s'est rompu un vaisseau sanguin dans le fond de l'Oeil , ce qui cause ces accidens. Dans ce cas , on doit travailler de même à resoudre ce Sang , en y faisant les choses marquées ci-dessus. Quand le Sang épanché commence à se dissiper , les Malades voient bleu , & ensuite ils revoyent les Objets dans leur état naturel. Si l'on s'apperçoit que le Sang soit résout , il n'est plus besoin de faire d'autre Remède que ceux qui fortifient & rétablissent l'état naturel des Parties qui ont souffert par le coup , ce que l'on fera par l'usage d'une Eau distillée du Camphre , en en mettant dans l'Oeil trois ou quatre fois dans la journée.

Quelquefois le coup a dérangé le Cristallin dans son Chaton ; d'où il arri-

ve que les Malades voyent les Objets en Ziguezague , ou de quelque autre maniere irréguliere. Mais quelques Remedes qu'on y fasse , il est impossible de remettre cette Partie dans sa situation naturelle.



CHAPITRE III.

De l'Ophthalmie en général.

L'OPHTHALMIE est une Inflammation ou rougeur de la Conjonctive ; quelquefois avec chaleur ardente & écoulement de Larmes ; quelquefois sans l'un & l'autre. Il arrive aussi que cette Inflammation s'étend sur toutes les parties du Globe , & sur celles qui l'environnent.

Cette Maladie est la plus fréquente de toutes celles dont les Yeux se trouvent affligés , puisqu'elle accompagne presque toutes les autres Maladies qui les attaquent.

Il y a différentes espèces d'Ophthalmies ; les unes sont sans danger , & peuvent être facilement guéries ; les autres au contraire sont dangereuses & très difficiles à guérir ; c'est pourquoi je me propose de parler dans ce Chapitre de toutes les différentes espèces d'Ophthalmies , & de faire connoître leur origine ,

afin que l'on puisse se faire une idée juste de la nature de cette Maladie , lorsqu'elle commence à paroître.

A l'égard des Causes des Ophthalmies , elles sont ou intérieures ou extérieures ; le Sang est la source de toutes les Ophthalmies qui viennent de Cause interne , soit qu'il pèche par sa quantité , soit qu'il ait acquis quelque qualité vicieuse , d'épaisseur , d'acrimonie , ou de raréfaction ; en effet , si le Sang pèche par sa quantité , il se portera en trop grande abondance dans les petits Vaisseaux qui arrosent l'Oeil , d'où s'ensuivra l'Ophthalmie.

S'il est trop épais , il est certain que ses particules trop grossières , chariées continuellement dans les Vaisseaux de l'Oeil qui sont très fins , y causeront un embarras , d'où naîtra une Inflammation par le défaut d'une circulation libre ; le Sang étant trop âcre , la Sérosité que fournit la Glande lacrimale se trouvant de la même nature , ne manquera pas d'irriter la Conjonctive , puisqu'elle l'arrose continuellement , d'où s'ensuivra l'Ophthalmie.

Enfin , si le Sang se trouve trop raréfié , cette raréfaction se faisant aussi dans les Vaisseaux tendres & délicats de l'Oeil , y causera la même Maladie.

A l'égard des Causes extérieures , il

est aisé de voir que tout ce qui est capable d'irriter considérablement la Conjonctive & la Membrane , qui la recouvre , ou bien d'occasionner quelque division dans les Vaisseaux de ces parties , doit nécessairement causer une Ophthalmie , comme nous dirons en parlant des différentes espèces d'Ophthalmie.

Pour ce qui est des Signes , nous en parlerons en traitant de chaque Ophthalmie en particulier. Cette Maladie est quelquefois fâcheuse par les accidens qui la suivent. Elle s'irrite souvent par les Remèdes dont les Malades se servent d'abord qu'ils en sont atteints , & qui n'y conviennent pas ; ou bien la violence du mal est si prompte , qu'il est difficile d'en suspendre l'effet , & d'empêcher que la Vue ne perisse , comme nous verrons dans le détail.



CHAPITRE IV.

Division de l'Ophthalmie.

ON divise communément l'Ophthalmie en Seche & en Humide ; mais on peut encore en admettre d'autres par les différences que j'ai observées , comme il paroîtra dans la suite.

ARTICLE I.

De l'Ophthalmie Seche.

LA première espèce d'Ophthalmie que l'on appelle seche, est celle qui cause une rougeur dans l'Oeil sans larmoyement, ni matiere purulente. Dans cette Maladie, il n'y a ni enflure à la Paupiere, ni douleur dans l'Oeil, ni dans le Tête; elle est causée par un Sang épais qui séjourne dans quelques-uns des Vaisseaux de la Conjonctive, & non pas dans tous; car dans cette Maladie, il y a une partie du blanc de l'Oeil qui est rouge & l'autre qui ne l'est pas.

ARTICLE II.

De l'Ophthalmie Humide.

LA seconde espèce d'Ophthalmie appelée humide, est occasionnée par une abondance de Lymphes lacrimales, qui passant continuellement sur le Globe de l'Oeil, l'irrite par son acrimonie, l'enflamme aussi-bien que la partie intérieure des Paupieres qui en deviennent enflées. Elle ulcere même assez souvent la Cornée transparente. Cette Maladie est accompagnée de douleurs dans l'Oeil avec élancemens; en sorte que les Malades ne sauroient voir le jour, ni souffrir la Lu-

miere fans des douleurs très-vives. Les Enfans auffi-bien que les Vieillards, font fort fujets à cette Ophthalmie, dans lesquels elle fe rend rebelle à caufe de l'humidité naturelle de leur tempérament. Dans le cours de cette Maladie, les Enfans ont même fouvent les Narines, & les Levres non-feulement enflées, mais auffi couvertes de Pustules & de Galles, de même les autres parties du Vifage.

A R T I C L E I I I.

De l'Ophthalmie qui fuit le Rhume.

IL y a une troifième efèce d'Ophthalmie, qui excite une démangeaifon dans l'Oeil, avec un fuintement d'une Humeur épaiſſe & glaireuſe qui colle les Paupieres pendant la nuit. Cette Ophthalmie eſt très fouvent une fuite du Rhume du Cerveau. Elle eſt la plus aifée de toutes à guérir.

A R T I C L E I V.

De l'Ophthalmie avec Chaffie ſèche.

IL ſe rencontre une quatrième efèce d'Ophthalmie qui tient de la nature de la ſèche, dans laquelle la Conjonctive eſt rouge, & les Paupieres font pleine d'une Chaffie ſèche en forme de farine écailleuſe. Une partie de cette Chaffie

se répand sur le Globe de l'Oeil ; enforte qu'il semble au Malade d'y avoir des ordures ; ce qui le fatigue & fait rougir la Conjonctive.

ARTICLE V.

De l'Ophthalmie qui occupe le Globe de l'Oeil du côté des Angles.

LA cinquième espèce d'Ophthalmie , est lorsque les Yeux du Malade ne sont rouge que du côté des Angles , & point à la partie supérieure , ni inférieure du Globe. Lorsque la Caroncule lacrimale se trouve enflammée , les Vaisseaux qui passe dessous se tuméfient jusques vers la Cornée transparente ; cette Maladie est sujette à se changer en une autre appelée Onglet , dont j'ai déjà parlé.

ARTICLE VI.

De l'Ophthalmie avec Bourgeons sur le Globe de l'Oeil.

IL y a une sixième espèce d'Ophthalmie , dans laquelle l'Oeil a de petits Faisceaux de Veines tumefiées qui partent de la surface intérieure des Paupieres , & se rendent jusqu'à l'endroit de la Conjonctive avec la Cornée transparente , où il paroît un Bourgeon de la

142 TRAITÉ DES MALADIES

grosseur d'une Lentille. Quelquefois la rougeur continue sur la Cornée , ou se fait voir dans son extrémité un pus blanchâtre. On s'apperçoit bien que c'est par l'extrémité de ces Vaisseaux , que s'épanche la matiere qui cause le Bourgeon. On ne peut guérir cette Maladie , que lorsque le Bourgeon est percé , ou que ce qu'il contient ne soit résout par des Remèdes convenables.

ARTICLE VII.

De l'Ophthalmie avec de petits Abscès sur la Cornée & la Conjonctive.

LA septième espèce d'Ophthalmie est , lorsque toute la Conjonctive est rouge avec de petits Abscès qui sont situés en partie sur la Cornée transparente , & en partie sur la Conjonctive. Il y en a quelquefois jusqu'à cinq & six autour de l'Oeil ; tantôt ils sont de la largeur d'une Tête d'Epingle ; & tantôt comme une Lentille.

ARTICLE VIII.

De l'Ophthalmie Erésipélateuse.

LA huitième espèce d'Ophthalmie , est celle qui vient d'une Erésipele , qui rougit la Conjonctive , enfle les Paupieres , & cause des douleurs avec chaleur

insupportable à l'Oeil & dans la Tête. Il se forme des Croutes & des Galles aux parties voisines de l'Oeil, comme sur le Front, les Tempes & le Nez, qui laissent pour leurs chutes des marques pour toute la vie, semblables à celles qui restent après la petite Verole.

A R T I C L E I X.

De l'Ophthalmie la plus violente, appelée Chémosis.

ON trouve une neuvième espèce d'Ophthalmie, dans laquelle toute la Conjonctive devient si considérablement enflée, que son épaisseur égale celle d'un travers de doigt; ce qui fait paroître la Cornée transparente comme dans un enfoncement. Cette Inflammation est accompagnée de très grandes douleurs dans la Tête & dans l'Oeil, de pesanteur au-dessus de l'Orbite, d'Insomnie, de Fievre, de Battemens, &c. Dans cette Ophthalmie, il arrive souvent que toute la Cornée transparente tombe par suppuration, ce qui détruit la chambre antérieure de l'Oeil. La Cicatrice qui suit cet accident, empêche que le Cristallin & la Vitrée ne s'échappent, & par conséquent que le Globe ne se flétrisse entièrement. Quelquefois l'un & l'autre arrivent.

Cette espèce d'Ophthalmie est souvent la suite d'un coup reçu à l'Oeil ou aux environs ; d'autres fois elle arrive sans qu'aucune cause extérieure ait précédé cette Maladie ; enfin elle peut être occasionnée par un dépôt critique à la suite d'une Fievre maligne ou autre.

J'ai vu une Dame à qui la fatigue d'un voyage , où elle fut obligée d'aller à cheval par la pluie , avoit causé une Pleuresie. Les Medecins du Pays ne l'ayant point fait saigner , il lui survint une Ophthalmie de la nature de celle dont je viens de parler , qui fit cesser la Pleuresie ; mais la Fievre subsistant toujours avec l'Inflammation de l'Oeil , celle-ci dégénéra bien-tôt en Abscès. L'autre Oeil se trouva le vingtième jour attaqué des mêmes accidens , & avec autant de violence.

Quand la Malade fut en état de pouvoir être transportée , elle vint à Paris me consulter. En examinant ses yeux , j'en trouvai le premier dont j'ai parlé entièrement perdu , & l'autre couvert d'une Cicatrice qui par l'usage des Remèdes que je lui ai fait , est effacée ; de sorte qu'elle voit assez pour se conduire. On trouvera ces Remèdes au Chapitre des Cicatrices ou Tayes qui restent après les Abscès.

ARTICLE X.

De l'Ophthalmie Vénérienne.

LA dixième espèce d'Ophthalmie a presque les mêmes apparences que la précédente , excepté que la Conjonctive enflée paroît dure & charnue. Elle commence d'abord par une abondance de matière blanchâtre tirant sur le jaune , qui suinte continuellement par l'Oeil. Cette Maladie est assez rare , & a pour principe une Cause vénérienne. J'ai vu plusieurs Personnes qui en étoient attaquées ; dans la plupart , cette maladie a paru deux jours après qu'un écoulement vénérien avoit commencé. La matière ayant cessé en partie de sortir par les voyes ordinaires , a causé une métastase , ou un transport à l'Oeil , par lequel il couloit une matière semblable , & qui teignoit le linge , de même que celle qui couloit par les voyes ordinaires.

ARTICLE XI.

De l'Ophthalmie de la Choroïde.

IL y a une onzième espèce d'Ophthalmie , dans laquelle les parties intérieures du Globe sont enflammées ; savoir la Choroïde conjointement avec l'Uvée.

Dans cette Maladie , la Conjonctive

n'est que légèrement enflammée. Il y a un larmolement , & de la difficulté à supporter la Lumiere , jointe à des douleurs vives vers le sommet de la Tête & les Tempes , & la Prunelle se trouve retrecie.

A R T I C L E X I I.

De l'Ophthalmie causée par des Ordures dans l'Oeil.

LA douzième espèce d'Ophthalmie est causée par des Ordures , & autres choses semblables , qui entrent dans les Yeux , & y causent une Ophthalmie plus ou moins considérable , suivant leurs volumes , & leurs inégalités. Elle s'attachent sur le blanc de l'Oeil , ou sur la Cornée transparente , ou en dedans des Paupieres.

A R T I C L E X I I I.

De l'Ophthalmie par des Coups reçus à l'Oeil.

LA treizième espèce d'Ophthalmie est causée par quelque coup. Elle est differente selon la force du coup , & selon la figure de la chose qui a frappé l'Oeil. On a vu ce fait déjà expliqué ci-devant en parlant des accidens qui suivent les Coups reçus à l'Oeil.

ARTICLE XIV.

De l'Ophthalmie par la rupture des Vaisseaux qui rampent sur la Conjonctive.

LA quatorzième espèce d'Ophthalmie , est celle dans laquelle l'Oeil devient très-rouge , sans néanmoins que le Malade ressente aucune douleur , ni peine à souffrir la Lumière ; elle est produite par un Vaisseau sanguin de la Conjonctive ; qui occasionne par son ouverture un épanchement de sang entre les Lames de cette Membrane.



CHAPITRE V.

Du Prognostic des Ophthalmies.

QUOIQUE nous ayons dit en général , que le Pronostic de l'Ophthalmie est toujours dangereux par rapport aux accidens fâcheux qui l'accompagnent , il y a cependant plusieurs espèces d'Ophthalmies dont les suites ne sont pas également dangereuses. Nous allons d'abord parler de celles qui donnent le plus à craindre , & nous dirons ensuite un mot des Ophthalmies , qui pour l'ordinaire n'entraînent point après elles des accidens fâcheux.

L'Ophthalmie humide est dangereuse , soit par sa durée , ou par les Recidives fréquentes de ses accès , ou par l'acrimonie de la Lymphé qui excorie & ulcere la Cornée transparente , & fait perdre une partie de la Vue par les Cicatrices qui suivent les Ulceres.

L'Ophthalmie Erésipelateuse est dangereuse par la violence des douleurs dont elle est accompagnée , & parce que la Vue en demeure souvent considérablement endommagée.

L'Ophthalmie appelée Chémosis , est très-fâcheuse par des douleurs qui la suivent , & parce que souvent elle cause la perte de la Vue.

L'Ophthalmie vénérienne est aussi dangereuse que la Chémosis.

L'Ophthalmie qui est suivie de l'Inflammation de la Choroïde & de l'Uvée , est très-dangereuse ; puisque souvent elle cause la perte de la Vue , ou bien une Cataracte membraneuse.

L'Ophthalmie causée par des coups reçus à l'Oeil , est plus ou moins dangereuse , selon les parties de l'Oeil qui sont intéressées.

L'Ophthalmie qui survient aux coups de Tête , où les Meninges ont été intéressées , est un signe de Mort.

Lorsque dans le commencement de

la petite Vérole , les Yeux se trouvent comme remplis de Sang épanché hors des Vaisseaux ; c'est encore un signe mortel , puisqu'il marque un transport du Sang dans la Tête.

A l'égard des autres espèces dont nous avons fait la description , on peut dire en général qu'elles ne sont point dangereuses , n'étant pour l'ordinaire accompagnées d'aucun accident fâcheux.

Le Flux de Ventre qui survient à l'Ophthalmie , la guérit selon Hippocrate.



CHAPITRE VI.

De la Guérison des Ophthalmies.

LA description que je viens de faire des différentes espèces d'Ophthalmies , fait bien voir que la division vulgaire en Seche & en Humide , ne suffit pas pour le choix des Remedes convenables à toutes ces espèces. Aussi a-t-on vu souvent que l'application indifférente des Remedes , a plutôt augmenté le mal , qu'elle ne l'a guéri ; c'est pourquoi j'ai cru que le Public seroit plus satisfait d'un plus grand détail , pour ne pas prendre un Remede pour l'autre ; car souvent un bon Remede mal appliqué , rend une Ophthalmie incurable qui à

peine étoit fâcheuse. Voici par ordre ceux qui sont propres à chaque Ophthalmie. Je laisse pour un Chapitre particulier les accidens qui suivent la petite Vérole.

Pour guérir généralement toutes sortes d'Ophthalmies , les Remedes généraux doivent y être employés , principalement la Saignée , pour diminuer la quantité du Sang. Il y a des cas où l'on est obligé de se servir de la Purgation ; il y en a d'autres où elle seroit nuisible & dangereuse. Il faut observer que les Taches , les Ulceres , de même que certains Abscess de la Cornée transparente , qui sont accompagnés d'Inflammation de la Conjonctive , se trouvent diminués , & leur guérison s'obtient même plus promptement par la Saignée de l'Oeil , que par les autres moyens ; cependant il y a des cas où elle ne convient pas , comme la pratique le fait voir. Cette Saignée s'exerce de différentes manieres ; les uns la font avec un assemblage de plusieurs Barbes d'Epis d'Avoine en forme de Brosse , dont on scarifie la Conjonctive , en la passant rudement sur cette Membrane ; d'autres font cette Opération en passant entre le Globe de l'Oeil & la Paupiere une Lancette cachée , dont ils scarifient

la Conjonctive ; d'autres enfin ayant passé une Aiguille courbe par dessous les Vaisseaux variqueux qui communiquent avec la tache , l'Ulcere ou l'Abcès , coupent ensuite les Vaisseaux qui rampent sur la Conjonctive ; cette dernière Opération n'est pas seulement moins douloureuse que les autres , mais même plus sûre.

A R T I C L E I.

De la Guérison de l'Ophthalmie Seche.

DANS l'Ophthalmie Seche , on se servira pendant quelques jours d'un Collire fait avec les Eaux de Rose & de Plantin , deux Onces de chacune , dans lesquelles on délayera douze Grains de Tutie préparée : on animera le tout avec une cuillerée d'esprit de Vin , pour en laver le dedans de l'Oeil trois fois dans la journée ; le soir il faut mettre sur l'Oeil une Compresse trempée dans du Vin , dans lequel on aura fait bouillir deux bouillons , une pincée de Veronique , & une autre de Thim , & autant de Roses de Provins , sur la quantité d'un demi-septier. Comme cette espèce d'Ophthalmie n'est point dangereuse , il y faut peu de Remedes ; souvent même la Saignée seule la guérit , étant réitérée suivant la plénitude du Malade.

ARTICLE II.

De la Guérison de l'Ophthalmie Humide.

L'Ophthalmie Humide est quelquefois très-difficile à guérir. Il y faut plus de Remedes qu'à la précédente , outre les généraux réitérés selon le besoin.

On est souvent obligé de faire la Saignée du Pied ou de la Gorge. On appliquera d'abord un Collire fait avec les Eaux distillées d'Eufraise , de Fenouil & de Plantin , deux onces de chacune , dans lesquelles on délaye deux grains de Sel de Saturne. On est quelquefois contraint de se servir du Séton , du Cautere , & de l'Emplâtre vésicatoire , entretenus pendant quelque tems ; à l'égard des Vésicatoires , on observera que pour peu que leur usage incommode les Reims ou la Vessie , on doit les cesser & employer d'autres moyens.

Si le premier Collire qui n'est qu'adoucissant , ne réussit pas après quelques jours d'usage , on lui en substituera un , qui en resserrant les pores , s'opposera au trop grand écoulement des Larmes dans l'Oeil ; c'est pourquoi on retranchera le Sel de Saturne , & on délayera dans les Eaux susdites un demi gros des Trochisques blancs de Rhasis. Quand

la fonte des Eaux a cessé , s'il reste quelque Ulcère sur la Cornée transparente , comme il arrive assez souvent , on doit employer la dissolution de la Pierre Divine dans l'Eau commune.

Cette Pierre se fait avec partie égale d'Alun , de Salpêtre , de Vitriol de Chypre , une livre de chacun , deux gros de Camphre que l'on mettra dans un Pot de terre verni ayant un Couvercle qui le ferme exactement. On fera des Rouleaux d'une pâte ferme de la longueur d'un pied & d'un demi pouce de grosseur ; on placera ensuite le Pot sous la Cheminée , & l'ayant entouré de Charbons en assez grande quantité , pour que leur élévation surpasse le bas du Pot d'un demi pouce , on les allumera ; à mesure que les matieres se fonderont , on aura soin de les remuer avec une Baguette assez longue ; & lorsqu'on s'apperçoit que ces matieres par leur ébullition , se seront élevées à la hauteur de trois travers de doigts , on retirera le Vaisseau du feu , & on y jettera le Camphre en poudre ; on continuera à remuer le tout , jusqu'à ce que le Camphre soit fondu entièrement ; on couvrira pour lors le Pot le plus promptement qu'il sera possible de son Couvercle , & on le luttera avec les Rouleaux susdits , en sorte

qu'il ne puisse fortir aucune vapeur ; on laissera le Pot dans cet état l'espace de vingt - quatre heures , au bout duquel tems on le cassera pour en séparer la pierre , & on la mettra dans un Vaisseau de Verre bien bouché. La dose est depuis douze grains , jusqu'à un demi gros , que l'on délayera dans un demi-septier d'Eau commune. On pourra ajouter dans cette dissolution deux gros de Sucre-candi, avec une cuillerée d'Eau-de-Vie.

Lorsque l'Ulcere sera cicatrisé , si ce Remede ne détruit pas assez la Tache , on se servira d'une Poudre faite avec l'Os de Seiche & le Sucre-candi mêlés ensemble , dont on fait tomber gros comme une Lentille tous les matins sur la Tache. Quelquefois il faut employer des Remedes plus forts , comme l'Huile de Linge , & les Poudres où il entre de l'Alun.

Les Ophthalmies humides sont souvent accompagnées de Tumeurs scrophuleuses , ce qui paroît par des glandes tumefiées autour du Col. Il faut pour lors se servir de Remedes capables de détruire la Cause de cette Maladie , qui sans cela , fait perir quelquefois les Yeux par des Ulceres & des Taches qui y succedent. Pour cet effet , outre l'application des Remedes dont

j'ai parlé ci-dessus , il faut faire une Tisane avec une once de Racine de Squine , une once de Racine de Patience sauvage coupée par tranche , que l'on fait bouillir dans cinq pintes d'Eau , réduites à deux Pintes & Chopine. On y fera aussi bouillir une Poignée de Souci de Vigne , & un peu de Reglisse. Le Malade boira tous les jours trois demi-septiers de cette Tisane , deux le matin , & un l'après midi ; ce que l'on continuera pendant un Mois. On fera prendre à la Personne trente grains d'Æthiops mineral trois jours de suite , ce qui fera quatre-vingt-dix grains ; on se purgera le quatrieme jour avec un Purgatif un peu fort , & cependant convenable à la Maladie & au Temperament du Malade ; on le laissera ensuite quatre jours sans prendre d'Æthiops ; on en recommencera l'usage pendant trois jours , & on le repurgera ensuite , ce que l'on continuera jusqu'à la Guérison. Il est à propos d'augmenter la dose de l'Æthiops peu à peu jusqu'à un gros ; car lorsqu'on en donne trop peu , il ne fait pas un effet assez puissant , ayant cependant toujours égard à l'âge & au temperament , &c.

ARTICLE III.

De la Guérison de l'Ophthalmie qui suit le Rhume.

LA troisieme espèce d'Ophthalmie qui est accompagnée d'un suintement d'une Humeur épaisse , qui colle les Paupieres pendant la nuit , demande peu de tems pour sa Guérison. Après les Remedes généraux , on se servira tous les soirs de Pommade de Tutie , dont on mettra en se couchant gros comme une Lentille au coin de l'Oeil du côté du Nez , enforte qu'elle entre dans l'Oeil. Il faut laver l'Oeil quatre fois par jour avec dix parties d'Eau tiède & une partie d'Eau-de-Vie. Comme il arrive souvent que les Angles des Paupieres sont Ulcerés , si elles ne guérissent pas par la Pommade de Tutie , on se servira de la Dissolution de la Pierre divine dans l'Eau commune.

ARTICLE IV.

De la Guérison de l'Ophthalmie avec Chassis.

LA quatrieme espèce d'Ophthalmie se guérit, après les Remedes généraux , par l'usage d'une eau composée avec du Sel Armoniac , & du Sel de Saturne ; sept grains de chacun , que l'on dissoudra

dans de l'Eau de Rose & de Plantin , quatre onces de chacune , pour en baigner l'Oeil trois ou quatre fois dans la journée.

ARTICLE V.

De la Guérison de l'Ophthalmie qui occupe le Globe du côté des Angles.

IL faut se servir pour la cinquieme espèce d'Ophthalmie d'un Collire fait avec le Vitriol blanc , & l'Iris de Florence ; un gros de chacun : le tout infusé dans trois Chopines , ou deux Pintres d'Eau , selon qu'on la souhaite plus ou moins forte.

ARTICLE VI.

De la Guérison de l'Ophthalmie avec Bourgeons.

Cette Ophthalmie se guérit par l'usage de la dissolution de la Pierre divine dans l'Eau commune , lorsque les Bourgeons ne se trouvent que sur la Conjonctive. Mais s'ils s'avancent sur la Cornée transparente , & qu'il paroisse du pus repandu entre les Pellicules de la Cornée , on use des Remedes qui servent aux Abscess de l'Oeil , comme on verra dans les Chapitres qui traitent de cette Maladie.

ARTICLE VII.

De la Guérison de l'Ophthalmie avec de petits Abcès sur la Cornée & la Conjonctive.

P Our la septieme espèce d'Ophthalmie , il faut mettre sur les Yeux , où il se forme des Abcès entre la Conjonctive & la Cornée transparente , des Remedes propres pour faire ouvrir ces Abcès & les cicatrifer ensuite ; parce que l'Inflammation & les progrès de la Maladie ne cessent qu'au même tems que la matiere se vuide. On applique d'abord une Eau distillée du Camphre ; & aussi-tôt qu'il commence à percer : on y met de la dissolution de la Pierre Divine dans l'Eau commune , qui nettoye & cicatrise les Ulceres.

ARTICLE VIII.

De la Guérison de l'Ophthalmie Erésipélateuse.

L A huitieme espèce d'Ophthalmie est longue , & difficile à guérir. On doit d'abord mettre sur la partie de l'Eau distillée de Fleurs de Sureau , mêlée avec une dixieme partie d'Eau-de-Vie , que l'on fera tiédir , pour en bassiner l'Oeil , & même les Paupieres. On aura aussi recours au Seton , & à la Saignée

tant du Bras que du Pied , & de la Gorge. On mettra dans la suite en usage la Purgation , & les Emplâtres visicatoires , si on les juge nécessaires.

A R T I C L E IX.

De la Guérison de l'Ophthalmie appelée Chémosis.

LA violence de cette Maladie demande de un prompt secours. C'est pourquoi d'abord que l'on s'apperçoit que le dépôt se fait sur l'Oeil , il faut saigner deux fois du Bras dès le premier jour , le lendemain donner un Purgatif violent , & le soir de cette Médecine saigner du Pied , si les accidens continuent. La Saignée de la Gorge doit être faite dès le lendemain de la Médecine. Cette Maladie est à l'Oeil ce que la Pleuresie est à la poitrine ; car le Sang a ici la même couleur & la même qualité que dans l'Inflammation de la Pleuvre. On applique d'abord un Emplâtre assez large de Vésicatoire entre les Epaules. La plupart mettent dans le commencement des Cataplasmes sur l'Oeil ; mais cette Méthode est très-pernicieuse , d'autant que ces Cataplasmes incommodent par leur pésanteur , & procurent plutôt la

Suppuration que la Résolution de la matière qui occasionnoit son Inflammation. On doit au contraire se servir des Remedes propres à adoucir l'Inflammation, & faire transpirer la matière, qui la cause, comme de l'Eau-de-Vie mêlée avec beaucoup d'Eau dont on lave l'Oeil de tems en tems. On mêle un gros de Diaphoretique mineral nouvellement fait dans deux pintes de Tisane ordinaire, pour en faire boire souvent au Malade; ensorte que dans un jour & demi il ait pris toute cette quantité.

Si la Purgation donne du soulagement, on la réitérera deux jours après. Et si l'on s'apperçoit que l'Oeil veuille se disposer à la suppuration, on y appliquera un Remede résolutif capable de la détourner. Pour cet effet il faut prendre du Romarin, de la Sauge, de l'Hissope. & des Roses de Provins, une pincée de chacun, que l'on fera bouillir trois ou quatre bouillons dans un demi-septier de Vin Rouge, dans lequel on trempera des Compresses, pour les mettre sur l'Oeil, prenant garde de ne pas trop le presser par le Bandage. Si l'on apperçoit de la blancheur dans la Cornée transparente, on fera couler de la Liqueur dans l'Oeil trois fois dans la journée; on remouillera la Compresse des

qu'elle sechera. Si par les moyens que j'ai proposés, l'enflure de l'Oeil vient à cesser, sans qu'il arrive suppuration au Globe, ou que la matiere qui a suivie la suppuration se résolve, sans que l'Oeil en soit endommagé, on se servira de l'eau distillée du Camphre, pour en faire couler de tems en tems dans l'Oeil jusqu'à ce que la rougeur soit cessée. S'il reste pour lors une foiblesse dans la Vue, comme il arrive souvent, je substitue à l'Eau susdite une fortifiante, qui rétablit la Vue dans son premier état. Quelquefois on est obligé de percer l'Abcès avec une Lancette, aussi-tôt que l'on aperçoit la matiere formée, de crainte que son séjour ne détruise les parties de l'Oeil qui la renferment. On verra dans le Chapitre de l'Abcès de l'Oeil la maniere de faire cette Opération.

A R T I C L E X.

De la Guérison de l'Ophthalmie Vénérienne.

LA dixieme espèce d'Ophthalmie ne demande pas moins de diligence que la précédente. On fera prendre au Malade la Panacée mercurielle, & on le saignera du Pied, pour détourner l'humeur qui se porte à l'Oeil. On met-

tra le Malade dans le Bain domestique soir & matin , & on le purgera dès le premier jour du Bain ; ce que l'on est obligé quelquefois de réitérer plusieurs jours de suite , en donnant la Panacée tous les soirs. On lavera les yeux à tout moment avec le mélange d'Eau & d'Eau-de-Vie. On aura toujours sur les Yeux des Compresses trempées dans le Vin décrit dans l'Article précédent. Par ce moyen on guérira cette Maladie en peu de tems , si on s'y prend de bonne heure ; autrement les Yeux périront ; ou n'auront que peu de Vue après la Guérison.

ARTICLE XI.

*De la Guérison de l'Ophthalmie de la
Choroïde.*

LA Guérison de l'Ophthalmie de la Choroïde est la même que la Chemosis , excepté que l'on fera couler de deux heures en deux heures dans l'Oeil trois gouttes d'Eau distillée du Camphre.



ARTICLE XII.

*De la Guérison de l'Ophthalmie causée par
des Ordures dans l'Oeil*

LA douzième espèce d'Ophthalmie se guérit en ôtant les Ordures qui sont tombées dans l'Oeil. Si elles entrent dans le blanc de l'Oeil ou dans la Cornée , on les ôtera avec l'extrémité du tranchant d'une Lancette , qui emporte tout ce qui est fiché dans le Globe , comme le sont la plupart de ces Ordures. Celles qui sont entre le Globe & les Paupieres , peuvent sortir par le moyen d'un Stilet d'Argent que l'on introduit entre la Paupiere & le Globe. Si elles sont enfoncées dans la Paupiere , il faut se servir d'un Instrument fait en forme d'une Curette , afin que le rebord de la Rainure de la Curette puisse emporter l'Ordure.

OBSERVATION SINGULIERE
*d'Ordures entrées sous la premiere
Tunique de l'Oeil.*

UN jeune fille Pensionnaire aux Religieuses de haute Bruyere , cassa un Busc de Baleine , dont cinq fragmens de la longueur d'une ligne ou deux se porterent dans l'Oeil , & se glisserent entre les lames de la Conjonctive. Il se

forma une élévation charnue à l'endroit où ces fragmens s'étoient arrêtés. J'en ôtai aisément deux avec la pointe de la Lancette , parce que l'une de leurs extrémités n'étoit pas recouverte de la Tunique ; mais comme les trois autres étoient tout-à-fait entre les Membranes , & recouvertes de la Cicatrice qui s'y étoit faite ; je les tirai toutes trois à huit jours de distance l'une de l'autre avec mon Aiguille à Cataracte , que je pouffai en perçant la première Tunique dessous un de ces fragmens. Lorsque mon Aiguille fut glissée sous le fragment je la tournai de côté , afin qu'en la levant le tranchant pût couper la Tunique , & par ce moyen la tunique coupée , la Baleine se ployât & sortît de l'endroit où elle étoit enfermée. J'en fis de même aux autres avec le même succès ; après quoi , l'élévation charnue se dissipa par l'usage de la dissolution de la Pierre Divine dans l'Eau commune.

A R T I C L E X I I I.

De la Guérison de l'Ophthalmie causée par des Coups reçus à l'Oeil.

DANS cette espèce d'Ophthalmie , y ayant presque toujours du Sang extravasé dans l'Oeil , il est nécessaire d'y

appliquer des Remèdes résolutifs & anodins ; tels que le Sang de Pigeon que l'on y fait couler deux fois par jour. On trempe des Compresses dans du Vin chaud, dans lequel l'on a mêlé quelques gouttes de Baume du Commandeur , & on les applique ensuite sur les Paupieres. On a soin de saigner , une ou plusieurs fois , selon que la Maladie le requiert. On lave l'Oeil trois fois le jour avec un mélange d'une cueillerée d'Eau vulnèraire mêlée dans cinq cuillerées d'Eau distillée d'Euphrase. On se sert dans la suite d'autres Remèdes , ayant égard à la disposition de l'Oeil , & aux accidens qui suivent le coup , comme nous avons dit ailleurs.

A R T I C L E X I V.

De la Guérison de l'Ophthalmie causée par la rupture des Vaisseaux qui rampent sur la Conjonctive.

CETTE espèce d'Ophthalmie se guérit ordinairement en faisant tomber sur l'Oeil du sang de Pigeon trois fois par jour , & y en appliquant ensuite une Comresse trempée dans l'Eau vulnèraire , qu'on ôtera aussi-tôt qu'elle sera deséchée. Pour lors on fera tomber quelques gouttes de cette Eau sur le Globe

166 TRAITÉ DES MALADIES
de l'Oeil , pour le débarrasser du Sang
de Pigeon qu'on y avoit laissé. Le blanc
de l'Oeil de rouge qu'il étoit , devient
ordinairement jaune , & ensuite il re-
prend sa blancheur naturelle.



CHAPITRE VII.

De l'Ophthalmie qui suit la petite Vérole.

SI les Ophthalmies violentes sont si
dangereuses pour la perte de la vue ,
celles qui sont occasionnées par la petite
Vérole , ne sont pas moins à craindre
comme la triste expérience de plusieurs
personnes ne l'a que trop fait connoître.
Elle a même fait croire que les maux
qui suivent immédiatement la petite Vé-
role étoient incurables : mais j'ai des
preuves qui détruisent cette opinion.

La petite Vérole est sujette à causer
dans les Yeux de quatre sortes de Mala-
dies , savoir l'Inflammation de la Con-
jonctive , la Fistule lacrimale , les Ab-
cès de la Cornée , & les Ulceres des
Paupieres. Souvent même ces accidens
se rencontrent tous quatre à la fois , &
d'autre fois il ne s'en trouve qu'un.

Dans les progrès de la petite Vérole ,
le Visage & les Paupieres commencent
par enfler , ce qui est suivi d'une rou-

geur aux Yeux & d'un suintement d'Humeur glaireuse, qui colle les Paupieres; de maniere que lors qu'on n'a point le soin de les décoller, les Yeux demeurent plusieurs jours fermés. Cette Humeur retenue entre les Paupieres & le Globe, devient en s'aigrissant capable d'ulcerer la Cornée transparente, & d'alterer considérablement la Vue.

Lorsque les Grains de petite Vérole des autres parties du Corps suppurent ils se cicatrisent; mais ceux qui percent & s'élevent sur le bord du Cartilage des Paupieres entre les Cils, & leur surface interne, ne se cicatrisent pas, à cause de l'acrimonie de la Sérosité, qui arrose continuellement l'Oeil; d'où il résulte des Ulceres qui durent quelquefois plusieurs années, & même toute la vie, si on n'y remédie pas.

Les Ulceres qui viennent aux Paupieres à la suite de la petite Vérole sont de deux sortes; les uns sont accompagnés d'une chair fongueuse, qui retarde leur Guérison, jusqu'à ce qu'elle soit consumée; les autres au contraire pénétrant jusqu'aux Glandes qui fournissent la Chassie, altèrent cette liqueur, laquelle ne contribue pas peu à entretenir les Ulceres, en s'attachant comme un limon sur leur surface; ce qui occasionne dans la suite la Chute des Cils.

Le troisième accident , qui suit immédiatement la petite Vérole , est produit par une Humeur glaireuse , qui s'amasse entre le Globe de l'Oeil & les Paupieres , lorsqu'elles ont été trop long-tems fermées. Cette Humeur entrant dans les points lacrimaux passe dans le Sac lacrimonal , d'où il arrive une obstruction au Canal nasal , qui cause dans la suite une Fistule lacrimale.

Le quatrième accident arrive d'ordinaire vingt jours après la petite Vérole , & quelquefois aussi dans le fort de cette Maladie. Il est causé par un Grain qui paroît dans le milieu de la Cornée transparente , entre les pellicules qui la composent. La Cornée par sa dureté ne permet pas à ce Grain de se faire jour en dehors , à moins qu'il ne soit superficiel ; c'est pourquoi il perce en dedans , & de cette manière y cause un abcès , ou bien la matière épanchée entre les pellicules , se congèle & s'endurcit , & y fait une Tache.

On peut ajouter qu'il survient quelquefois à tout cela une Fluxion opiniâtre qui arrive , lorsqu'après toutes les Pustules guéries , les Malades viennent à prendre l'air. Les pores de la peau en étant frappés , & se trouvant comme bouchés par cet air , il ne se fait plus de

de Transpiration des restes de l'Humeur salée, qui sortoit auparavant par les Ulceres de la peau; d'où il arrive, pour ainsi dire, une repercussion de cette Humeur, qui restant dans les Vaisseaux se jette sur les Yeux, & y cause une Ophthalmie humide, dont la liqueur qui s'écoule est si corrosive, qu'elle excorie la peau du Visage.



CHAPITRE VIII.

Des Remedes pour l'Ophthalmie qui suit la petite Vérole, & pour les accidens qui l'accompagnent.

APRÈS avoir marqué les Maladies des Yeux qui suivent la petite Vérole, il reste à parler des Remèdes qui leur conviennent. A l'égard de l'Ophthalmie, je renvoye le Lecteur au Chapitre de l'Ophthalmie humide. Je dirai seulement que pendant le cours de la petite Vérole on doit se servir d'un Collire fait avec le Saffran, & les Eaux distillées de Plantin & de Rose. Je me fers d'une Eau distillée du Camphre qui prévient tous ces accidens, lorsqu'elle est appliquée dans les commencemens. Il suffit d'avoir soin d'en mettre quelques gouttes dans l'Oeil quatre ou cinq fois par jour,

& d'empêcher en même tems que les Paupieres ne se collent ; car cela est de grande conséquence. Pour cet effet, on trempe la Barbe d'une Plume dans cette Liqueur, & on la passe entre les deux Paupieres plusieurs fois de tems en tems dans la journée, & pendant la nuit.

Le Lecteur trouvera les Remèdes qui conviennent pour les Grains de petite Vérole sur la Cornée, dans le Chapitre suivant, & ceux qui conviennent pour la Fistule lacrimale dans le Chapitre qui en traite. Il ne me reste donc qu'à donner la manière de guérir les Ulceres qui viennent sur les bords des Paupieres.

Les Eaux Ophthalmiques en général y font très peu de chose ; mais j'ai trouvé qu'en les touchant avec la Pierre infernale, ils se cicatrisent aisément. Il faut en ôter l'ardeur, aussi-tôt qu'elle les a touché, en faisant baigner l'Oeil plusieurs fois dans un petit verre plein d'Eau ; & il faut sur-tout prendre garde que l'endroit de la Paupiere, sur lequel on a appliqué la Pierre, ne pose point sur le Globe de l'Oeil, que la cuisson qu'elle a causée n'en soit passée. On les touchera une ou deux fois la semaine, jusqu'à ce que l'on juge que ce soit assez, & on met sur ces endroits, soir & matin, de la Tutie en poudre très fine, qui ache-

~~V~~era de les cicatrifer. A l'égard des Ulceres, il est à remarquer que ceux qui sont profonds, sont plus long-tems à guérir que ceux qui ont une Chair fongueuse.



CHAPITRE IX.

De l'Abcès de l'Oeil.

L'ABCÈS qui survient à l'Oeil, peut avoir son siège en différens endroits. Quelquefois il se trouve à la Cornée transparente; d'autre fois entre la Conjonctive & la Cornée opaque, & souvent à l'Uvée. J'entend par Abcès un amas de Pus plus ou moins abondant. Lorsqu'il se fait dans la Cornée transparente, comme il arrive souvent après la petite Vérole, on l'apperçoit aisément par une blancheur qui l'accompagne; mais lorsqu'il commence entre la Cornée opaque & la Conjonctive, on doit le soupçonner par le Gonflement du Globe de l'Oeil qui est tumefié plus à l'endroit de l'Abcès qu'ailleurs. S'il se fait à l'Uvée, on ne le connoît souvent que quand le pus est épanché dans l'Humeur acqueuse.

Les Abcès qui attaquent la Cornée transparente, commencent quelquefois par une petite Tache blanche qui paroît

sur la première Pellicule de cette Membrane, & est suivie d'une élévation en dehors. En la piquant légèrement avec la pointe de la Lancette, sans pénétrer les autres Pellicules, on la guérit aisément; mais si l'Abscess est plus profond, qu'il se trouve au milieu de l'épaisseur de la Cornée, & qu'il s'élargisse au point de couvrir presque toute la transparence de cette Membrane, il fait ce que l'on nomme Hypopion. Si au contraire il n'est pas si large, & qu'il perce de lui-même au dedans de l'Oeil, sa matière coule dans la Chambre antérieure entre l'Iris & la Cornée transparente, & y fait un amas en forme de Tache, qui a la figure d'un demi Croissant, semblable à celui qui paroît aux Racines des Ongles; c'est pourquoi on appelle cet Abscess Onis.

Quelquefois sans que la Cornée transparente soit attaquée, l'Abscess étant entre la Conjonctive & la Sclérotique, ou dans l'épaisseur de celle-ci, le pus se glisse dans la Chambre antérieure, entre l'Iris & la Cornée transparente; ce qui peut arriver dans le premier cas par la pression des Paupieres, & dans le second par celle des Aponevroses des Muscles du Globe.

Ces différens Abscess ne se font pas

fans un grand danger de la perte de la Vue. On en guérit cependant plusieurs fans que les Yeux en restent incommodes. J'ai marqué au Chapitre des Ophthalmies , Article neuvième , des Remèdes propres à résoudre cet amas de Pus ; c'est pourquoi je ne parlerai ici que de l'Opération qu'on est obligé d'y faire quelquefois pour l'évacuer. Il faut donner auparavant une Regle pour connoître l'état du Pus dans l'Oeil qui demande cette Opération ; car souvent la matière échappée dans la Chambre antérieure , entre l'Iris & la Cornée transparente , se dissipe en quelque maniere par l'usage des Remèdes dont j'ai parlé ci-devant , non pas en se résolvant , mais en se précipitant au fond de l'Oeil.

Lorsqu'il arrive que cette matière augmente ; au lieu de se dissiper , & que l'on voit qu'elle est assez abondante pour qu'elle puisse entrer par le trou de la Prunelle , il est tems pour lors d'y faire l'Opération qui suit.

On exposera l'Oeil malade à une assez grande clarté , & on appuyera sa Tête contre le Dossier d'un Fauteuil , pour faire ensuite une incision à la Cornée transparente au-dessous du Trou de la Prunelle , en prenant garde que la pointe de la Lancette ne touche point l'Iris.

qui est derrière le Pus. On doit faire l'ouverture assez longue pour donner issue à la matière , & comme elle sort rarement d'elle-même par cette ouverture , on y injectera de l'Eau tiède avec une petite Seringue , laquelle lave & charie le Pus avec elle en ressortant. On mettra sur l'Oeil une Compresse trempée dans un Collire fait avec les Eaux de Rose , de Plantin & de Fenouil , dans lesquelles on battra un blanc d'Oeuf. On a soin de maintenir cette Compresse humide en l'arrosant de tems en tems avec ce Remède ; on en fait aussi couler trois ou quatre fois dans la journée sur la Playe faite à la Cornée.

Il arrive ordinairement que quelques jours après que le Pus est vuide , il s'en épanche de nouveau à l'endroit où étoit celui qu'on a évacué. On introduira pour lors un Stilet fin dans l'incision que l'on a faite pour rouvrir la Playe , & en faire sortir la matière comme la première fois. S'il ne se fait plus aucun amas de nouvelle matière , on laissera renfermer la Playe ; & s'il y a toujours une continuation d'inflammation de l'Oeil, on y appliquera les Remèdes convenables , que je ne repeterai point ici , en ayant déjà parlé au Chapitre des Ophthalmies.



CHAPITRE X.

Des Ulceres de la Cornée.

LEs Ulceres de la Cornée transparente, ne sont que les suites des Abscès & des Ophthalmies. Ils sont plus ou moins larges, & profonds, suivant que la Maladie qui a précédé a été plus ou moins violente. Je passe sous silence les différens noms qu'on leur a donnés, comme ne servant de rien pour leur Guérison. Je parlerai seulement des Signes qui les font connoître.

Toutes les fois qu'il y a Ulcere à la Cornée transparente, les Malades ne peuvent souffrir la Lumière à raison de l'Inflammation. Il leur semble même que ces Rayons de Lumière les blessent comme autant de pointes d'Aiguilles. Il paroît une cavité à l'endroit ulcéré, qui est plus ou moins large, selon que l'Ulceres est profond.

Pour guérir ces Ulceres, il faut, avant que d'y mettre des Remèdes propres à les cicatrifer, ôter l'Inflammation & détourner l'Humeur séreuse qui l'occasionne, ce qu'on fera par les Remèdes mentionnés dans le Chapitre des Ophthalmies.

Lorsque l'Inflammation sera dissipée , s'il se trouve encore des Ulceres qui ne soient pas cicatrisés , outre les Remèdes dont on s'est servi , il n'y en a guères de plus sur que l'Eau verte d'Hartman , dont il use pour les Ulceres de la Gorge. Cette Eau mise dans l'Oeil , plus ou moins forte , suivant que les Malades peuvent la souffrir , les cicatrise en très peu de tems , & consomme les Taches qui restent après leur Cicatrice. Lorsqu'on ne peut la supporter , ou que la Maladie résiste , on se sert des Remèdes spiritueux , comme du Vin d'Espagne , dans lequel on aura fait infuser du Gérosfle , de l'Aloës , du *Crocus Metallorum* , du Camphre , de la Tutie. Quelques goutte de cette Infusion , mises dans l'Oeil en cicatrisent les Ulceres , en reïterant trois ou quatre fois dans la journée.

Quant aux Taches qui restent , elles sont ou petites ou larges , & plus ou moins élevées , selon que la Maladie qui les a précédée a été violente. Il y en a qui prétendent les emporter en enlevant une Pellicule de la Tache ; mais cette pratique est dangereuse , parce que si avec une Lancette ou quelque'autre Instrument on ôtoit cette partie , il se feroit une nouvelle Playe , qu'il faudroit nécessairement cicatriser de nouveau ; &

il en resteroit même une opacité à cet endroit , qui feroit aussi grande que la première. Il est vrai qu'il y a quelquefois des Vaisseaux sanguins qui se portent au-dessus de la Conjonctive , jusques dans la Tache , & l'entretiennent ; pour lors on pourra couper ces Vaisseaux sur la Conjonctive , avec une Aiguille tranchante , ou une Lancette que l'on passe dessous. Ce que je viens de dire n'empêche pas qu'on ne leve une Pellicule de la Cornée transparente , lorsqu'il y a une matière épanchée par un Grain de petite Vérole , qui est le seul cas où cette Opération convient. La dernière intention que l'on doit avoir est de dissiper la Tache , & rendre à la Cornée sa transparence & son brillant. On se sert pour cela d'une Poudre fine , faite avec l'Alun, le Sucre candi , & la Coque d'Oeuf , dont on fait tomber sur la Tache , gros comme une lentille , une fois le jour ; ou on peut la toucher avec l'Huile de Linge , & autres Remèdes semblables.





C H A P I T R E X I.

Des Staphilomes.

QUOIQUE l'on n'entende par Staphilome qu'une élévation à toute la Cornée transparente , ou seulement à une de ses parties , l'expérience fait voir cependant qu'il en arrive également dans la Cornée opaque , jusqu'environ une ligne au-delà de son union avec la Cornée transparente.

Deux Causes sont capables de produire cette Maladie. La première est l'action d'une matière fournie par un Abcès sur quelque'une des Lames de la Cornée ; d'où il arrive que les Lames qui restent n'étant plus en état de résister à l'impulsion de l'Humeur aqueuse , se porteront en dehors , & formeront cette élévation que nous appellons Staphilome , dont la Baze sera plus ou moins considérable suivant la corrosion de la Cornée ; & le volume de la Tumeur plus ou moins grand , suivant la quantité de l'Humeur aqueuse qui l'occasionne. La seconde Cause est la division entière de la substance de la Cornée transparente dans sa portion , qui répond à l'Iris , ou de la Cornée opaque jusqu'en-

viron une Ligne au-de-là de son union avec la Cornée transparente , soit que ce soit par une cause externe ou par une interne ; d'où il suit une élévation à l'endroit de la division par la sortie de l'Uvée.

On donne différens noms au Staphilome , eu égard à la figure de l'élévation. On la nomme Raifiniere , lorsque sa figure approche d'un Grain de Raisin ; Pomette , lorsque la Tumeur étant plus considérable que la précédente , elle approche d'une petite Pomme ; Cloud , lorsque l'élévation a quelque rapport avec la Tête d'un Cloud. On l'a enfin nommé Miocephalon , lorsque la figure de la Tumeur approche de celle de la Tête d'une Mouche.

Mais outre toutes ces espèces , la pratique m'en a fait voir une très singulière , dont personne que je sache n'a encore fait mention. J'ai vu à l'occasion d'un coup reçu à l'Oeil à la partie supérieure du Globe , à une ligne de la Cornée transparente , arriver un Staphilome à la Conjonctive. La violence du coup avoit fendu la Cornée opaque , sans endommager la Conjonctive , & l'Humeur acqueuse s'échappant par cette fente , soulevoit la Conjonctive en manière de Staphilome. Je l'ai guéri par

un Bandage compressif appliqué (l'Oeil étant fermé) sur l'endroit de la Paupière qui répondoit à la Tumeur ; ce qui fit repasser l'Humeur aqueuse dans la cavité du Globe , & donna lieu aux Membranes de se rejoindre.

Cette Maladie n'est pas seulement fâcheuse par rapport à la difformité de l'Oeil , mais encore parce qu'elle est la cause des Fluxions continuelles , des douleurs de Tête , & souvent même des Infomnies , & des Abscess qui se forment au dedans de l'Oeil.

Les Anciens , pour ôter cette difformité , pratiquoient l'Opération suivante : ils passoient une Aiguille enfilée d'un double Fil de lin par le milieu de la Baze du Staphilome ; le fil étant passé , ils le coupoient près de l'Aiguille pour prendre ensuite les deux extrémités d'un même Fil , & faire un double nœud à côté de la Baze du Staphilome ; ferrant modérément , de crainte de la couper , mais cependant assez pour occasionner sa mortification & sa chute. Ils faisoient un semblable nœud de l'autre côté avec l'autre Fil & le Staphilome tomboit ensuite par cette ligature. Les accidens fâcheux , tels que sont les grandes Douleurs , l'Inflammation & souvent l'Abscess de l'Oeil , dont cette façon d'opérer n'est

que trop souvent accompagnée , m'ont donné lieu de chercher des moyens plus avantageux au Malade. Je pratique pour cet effet deux Opérations.

La première convient aux Staphilomes , qui ne sont pas dans toute l'étendue de la Cornée transparente. Je prens une Aiguille un peu courbe & tranchante , enfilée de Soye. Je la passe par le milieu du Staphilome. La Soye étant passée , je retire l'Aiguille , pour prendre les bouts de la Soye que je retiens avec la main gauche en les tordant un peu ; je coupe ensuite avec une Lancette la Tumeur dans sa Baze au-delà de la Soye , & j'acheve de l'emporter par un Coup de Ciseaux. Je panse le Malade avec de l'Esprit-de-Vin , & de l'Eau commune , comme dans l'Opération de la Cataracte. Par ce moyen le Staphilome cesse , soit que la Cornée qui se cicatrise devienne plus épaisse , ou qu'il reste un petit trou au milieu de la Playe , par lequel l'Humeur aqueuse se vuide , à mesure qu'il y en a trop dans l'Oeil ; ce qui n'apporte aucune incommodité au Malade , cette Humeur prenant le cours ordinaire des Larmes par le Nez.

La seconde Opération convient pour les Staphilomes qui occupent toute la Cornée transparente. Elle est la même

que celle qu'on verra décrite dans le Chapitre de l'Oeil postiche.

Il y en a qui veulent que l'on donne un coup de Lancette dans l'Oeil , pour vuider ce qui est dans le Globe , mais cette Opération est très dangereuse , & produit ensuite de très fâcheux accidens , comme des douleurs de Tête , & des Insomnies , qui durent quelquefois de six Mois ; ce qui ne vient que des irritations & inflammations de l'Iris qu'on auroit dû emporter par l'Opération.



CHAPITRE XII.

De l'Albugo.

L'Albugo est une espèce de Tache qui vient à la Cornée transparente , causée par un suc blanchâtre qui s'arrête dans la substance de cette Membrane. L'infiltration s'en fait peu à peu , & devient enfin quelquefois si considérable , qu'elle couvre entièrement la Cornée transparente ; d'où il arrive que les Malades ne distinguent plus les Objets.

Plusieurs confondent cette Maladie avec les Abscesses de la Cornée transparente & les Cicatrices qui restent sur cette Membrane , lorsqu'il y a eu Abscesses ou quelque Ulcere. Mais pour ne point

se tromper , on doit se ressouvenir que les Abcès sont toujours accompagnés d'une Inflammation violente , avec des douleurs de Tête considérables ; au lieu que dans l'Albugo il n'y a que peu d'Inflammation , jointe à des élancemens , & un Larmoïement sans douleur de Tête.

Les Taches & les Cicatrices en sont aussi différentes , en ce qu'elles sont sans Inflammation , & qu'on peut s'exposer à la Lumière sans en être incommodé. Mais dans l'Albugo , outre l'Inflammation qui l'accompagne , on ne peut souffrir la Lumière. Ajoutez à cela que la couleur de l'Albugo est moins blanchâtre que dans les Cicatrices.

On ne doit rechercher la Cause de cette Maladie que dans le Sang qui s'arrête & produit l'embarras des Vaisseaux de la Cornée , qui fournissent ensuite le Suc blanchâtre que nous avons dit former cette espèce de Tache. Cette Maladie est plus incommode que fâcheuse , n'occasionnant point pour l'ordinaire la perte de la Vue , lorsqu'on a soin d'y apporter de bonne heure les remèdes convenables.

On doit avoir deux intentions dans la Cure de cette Maladie. La première est de s'opposer à l'augmentation de l'embarras. La seconde est de détruire celui qui est déjà formé. On satisfera à la prè-

miere intention par une Diette exacte ; faisant usage tous les matins d'une Eau de Veau alterée , avec des Herbes rafraîchissans , ou à son défaut d'une Chopine de Petit Lait mêlé avec une once de Sirop Violat ; pendant la journée on prendra quelques Bouillons à l'ordinaire , & des Potages dans l'intervalles. On observera ce Regime pendant les cinq à six premiers jours ; après quoi on permettra au Malade de manger quelque morceau de pain léger sans viande , usant pour boisson ordinaire d'une Tisane simple.

On mettra outre cela en usage les Saignées du Bras , du Pied , ou de la Gorge selon le besoin. On pourra même employer le Bain domestique , aussi-bien que les Emplâtres vésicatoires appliqués à la nuque du Col , que l'on entretiendra pendant quelque tems.

On satisfera à la seconde intention par l'usage des Topiques spiritueux & résolutifs , tels que l'infusion de l'Anis , & de Fenouil dans de bonne Eau-de-Vie , dont on versera une cuillerée dans les Eaux distillées d'Eufraise , de Fenouil , & de Plantin , deux cuillerées de chacune ; évitant soigneusement les Eaux vitrioliques comme très pernicieuses , & propres à faire dégénérer cette Maladie en Abscès ou en Ulcere.

Lorsque l'inflammation est passée , je me fers d'une Eau Ophtalmie qui acheve d'éclaircir parfaitement la Vue , en faisant couler plusieurs fois le jour quelques gouttes dans l'Oeil sur l'endroit de la blancheur.

En observant ce que je viens de proposer , le Malade voit pour l'ordinaire très distinctement les Objets dans l'espace de six Semaines. Si la Maladie devient rebelle aux Remedes ci-dessus indiqués , & qu'il paroisse quelque Vaisseau Sanguin sur la Conjonctive qui soit variqueux , on ne fera point difficulté de le couper de la maniere que je l'ai enseigné.



CHAPITRE XIII.

De la Cataracte en général.

LEs Auteurs ne sont point d'accord sur la nature des Cataractes ; les uns prétendent que c'est le Cristallin alteré , les autres veulent au contraire que ce soit une Membrane formée par l'épaississement de l'Humeur aqueuse , laquelle en s'appliquant au bord de la Pupille , s'oppose au passage des Rayons de Lumière. Il y a lieu de présumer que la diversité de ces opinions depend moins de l'entêtement de leurs Auteurs que du peu

d'occasions qu'ils ont eu de se détromper eux-même , puisque si on examine avec soin cette matière , on trouvera qu'il y a des Cataractes Cristallines & des Membraneuses , & qu'on peut même établir autant d'espèces de Cataracte du Cristallin , que les altérations dont cette Humeurs est susceptible sont différentes.

Pour ce qui est des Cataractes Membraneuses , j'en remarque de deux sortes. La première est une suite de l'opacité de la Membrane qui revêt le Chanton de l'Humeur vitrée derrière le Cristallin. La seconde succède aux Fluxions de la Choroïde , à l'occasion desquelles il s'épanche dans l'Humeur aqueuse une matière semblable à du Pus , qui en se desséchant prend corps comme une Membrane. On pourroit peut-être en présumer une troisième qui dépendroit de l'opacité de la Membrane qui recouvre antérieurement le Cristallin , si tant est que l'altération de cette Membrane peut arriver sans celle de l'Humeur Cristalline ; c'est ce que l'expérience ne m'a pas encore fait voir , non plus que celle que l'on croit venir par la Congestion , ou épaisissement de l'Humeur aqueuse. Il est vrai que j'ai souvent remarqué qu'une petite portion de la Membrane qui recouvre antérieurement le Cristallin ,

étoit devenue opaque , sans que la Vue se soit perdue , tandis que le Cristallin est demeuré sain , aussi-bien que le reste de cette Membrane. Ceux qui n'ont connu que des Cataractes Membraneuses se sont trompés , de même que ceux qui n'en ont connu que de Cristallines ; mais pour donner une idée plus claire des différentes espèces de Cataracte , je les diviserai en vraies , en douteuses & en fausses.



CHAPITRE XIV.

De la vraie Cataracte.

PAR vraie Cataracte , j'entend avec la plupart des Modernes , l'Humeur Cristalline altérée , & non une Membrane formée dans l'Humeur aqueuse , comme l'ont voulu les Anciens.

Des Expériences sans nombre ont fait reconnoître l'erreur de ces derniers ; cependant on voit encore plusieurs Personnes , qui partisans de l'Antiquité , s'obstinent à soutenir l'opinion de ces Hommes sages , qui cependant n'étoient pas infailibles. Ils aiment mieux chercher des raisons dans les Auteurs pour appuyer leur sentiment , que de se rendre à des Expériences évidentes , & s'en rapporter à leurs propres Yeux.

J'ai été comme eux un assez long tems dans l'opinion que la Cataracte guérissable par l'Opération , étoit toujours une Membrane qui s'étoit formée dans l'Humeur Aqueuse ; mais deux réflexions que j'ai faites , m'en ont entièrement détrompé.

La première est sur la manière dont la Cataracte se forme depuis son commencement , jusqu'à sa parfaite maturité. La seconde est sur ce qui résulte de l'Opération même qui convient à cette Maladie.

Lorsque la Cataracte commence , elle est si profonde , qu'à peine peut-on l'appercevoir ; de-là je tire cette conséquence , que si c'étoit une Membrane , ou un épaissement qui se fît dans l'Humeur Aqueuse , & qu'elle fût située dans la Chambre postérieure de l'Oeil , derrière l'Iris , il seroit aisé de l'y distinguer , & elle ne paroîtroit pas si éloignée.

Trois ou quatre Mois après , plus ou moins , que les Malades se plaignent d'une diminution de la Vue , en examinant leurs Yeux , on y apperçoit une blancheur fort enfoncée , sans que l'Humeur Aqueuse se trouve trouble ni épaisse ; ce qui fait juger que c'est l'Humeur Cristalline qui commence à deve-

air opaque. En observant de tems en tems les Yeux du malade , on remarque sensiblement que le Cristallin s'avance vers le trou de la Prunelle ; & la Vue diminue de plus en plus , jusqu'à ce que la Cataracte se soit avancée proche la Prunelle qu'elle ferme , comme une espèce de Rideau , qui étant tiré devant une Fenêtre , laisse encore un certain jour dans la Chambre , mais au travers duquel on ne sauroit distinguer les Objets.

Cette seule réflexion devoit suffire pour faire connoître que la Cataracte n'est pas une Membrane qui naît dans l'Humeur Aqueuse , ni un épaisissement de cette Humeur ; parce que si cela étoit , elle demeureroit au même lieu , où elle auroit pris son origine sans changer de place , comme je viens de faire voir qu'elle change dans sa naissance , dans son progrès , & dans sa maturité

Ma seconde réflexion est tirée de l'Opération même de la Cataracte bien mûre , car lorsqu'on pique l'Oeil , & que l'on enfonce l'Aiguille , il arrive quelquefois qu'elle entre dans le milieu du corps qui forme cette Maladie , quoiqu'on l'ait dirigé de manière , qu'elle ne puisse pas pénétrer jusqu'à l'endroit où le Cristallin est naturellement situé ;

cependant la Cataracte abbatue en relevant l'Aiguille , on apperçoit à son extrémité par la Prunelle un Corps opaque , de la forme du Cristallin , qui tient à l'Aiguille. Si ce Corps étoit une Membrane , elle feroit plate ou plissée , & n'auroit point la forme d'un Corps convexe ; d'où il faut conclure , que c'est le Cristallin même que l'on abbat dans cette Opération , conjointement avec la Membrane qui le tenoit enchassé dans l'Humeur Vitrée avec son altération , d'autant que s'il arrivoit qu'il sortit hors de ladite Membrane , il tomberoit de lui même au bas de l'Oeil ; mais puisque cela n'arrive pas , il faut de nécessité qu'il demeure toujours attaché à la Membrane qui le recouvre.

Que la Cataracte ait son siège dans l'Humeur Cristalline , je vais encore en donner une preuve convaincante par une Expérience faite sur l'Oeil du Cadavre d'un Homme mort à l'Hopital du Nom de Jesus , auquel Mr. de Woolhouse avoit fait l'Opération de la Cataracte. Je priai Mr. Mery de l'Academie Royale des Sciences de se transporter audit Hopital , pour examiner cet Oeil. Il tira de l'Orbite l'Oeil operé ; il l'ouvrit & trouva que le Cristallin étoit placé au bas du Globe de l'Oeil , à la

partie postérieure & inférieure de la Prunelle , où il avoit été abattu par l'Opérateur.

Ce que je viens de dire prouve assez que le siège de la Cataracte est dans le Cristallin. On verra dans la suite de ce Traité que tout concourt à soutenir ces preuves. Ceux qui voudront là-dessus de plus grandes lumières , n'ont qu'à lire les Livres de Messieurs Antoine Brisseau , & Heister , qui nous ont tiré de l'erreur où les Anciens nous avoient jettés , faute d'avoir examiné ce fait à fond.

Ces nouveaux sentimens ont donné occasion à Messieurs de l'Academie Royale des Sciences de faire plusieurs Expériences pour reconnoître la vérité ; & depuis ce tems-là plusieurs d'entre eux ont abandonné l'opinion des Anciens , comme on peut voir dans leurs Mémoires.

Ainsi la vraie Cataracte est une alteration du Cristallin , lequel de transparent qu'il est naturellement , devient opaque ; ce qui empêche à la fin les Rayons de Lumière , qui se réfléchissent des Corps éclairés , de passer dans le fond de l'Oeil , pour y faire leurs impressions , & fait perdre la Vue jusqu'à ce que par l'Opération on l'abbatte , ou

que par la fuite du tems ce Cristallin altéré tombe de lui-même par son propre poids , comme j'ai observé dans les deux cas suivans.

Le premier arriva en la personne de Mr. Barthelemy , Doyen de la Chambre des Comptes , âgé d'environ soixante & dix ans , qui demeuroit dans la Rue de la Cerifaye à Paris , dont la Cataracte tomba d'elle-même , & se logea dans l'endroit où on la place ordinairement avec l'Aiguille ; de sorte qu'il vit avec la même facilité que l'on voit après cette Opération , lorsqu'elle a bien réussi.

L'autre cas fut dans la Rue de Richelieu à une vieille Chienne aveugle appartenante à Madame la Comtesse de Chamillart. On fut surpris un jour de ce que cette Chienne contre son ordinaire voyoit à se conduire. Comme j'allois dans cette Maison pour Mr. l'Abbé Guyet , à qui je venois d'abbattre une Cataracte , on me fit voir cette Chienne. J'apperçus dans l'un de ses Yeux une Cataracte qui étoit à moitié tombée , de sorte qu'il passoit assez de lumière dans le fond de l'Oeil , pour qu'elle vît.

Après avoir établi , & comme démontré que le Cristallin , est le siège des vraies Cataractes , il reste à faire voir que les différentes altérations de cette Humeur

meur établissent les différentes espèces des vraies Cataractes.

Je reconnois trois sortes d'altérations du Cristallin dans les vraies Cataractes. Dans la première il se ramollit simplement & devient comme mucilagineux. Dans la seconde au contraire le Cristallin se durcit & se desseche. Dans la troisième l'intérieur de la substance de cette Humeur devient purulente , pendant que quelques couches externes , aussi-bien que la Membrane qui le recouvre , servent de Poche & d'Enveloppe à cette matière.

Les situations des vraies Cataractes sont différentes. Quelquefois elles s'avancent vers la Prunelle jusqu'à leur parfaite maturité ; elles s'appuyent pour lors à la circonférence interne de l'Iris. D'autres fois , quoique le Cristallin altéré soit détaché du Chaton de l'Humeur Vitrée , il s'avance très peu vers la Prunelle , restant au milieu de la Chambre postérieure où la Cataracte meurit. Dans cette dernière espèce les Malades ne perdent pas entièrement la Vue ; & quoique les Cataractes soient mûres , ils distinguent les Objets , mais très confusément , parce qu'il passe encore quelques Rayons de lumière jusqu'au fond de l'Oeil autour de la circonférence de la Cataracte.

Les Auteurs ont établi deux espèces particulières de Cataracte vraie , sous le nom de Caseuse & de Laiteuse. Mais ils se sont trompés ; car ces prétendues espèces de Cataractes ne sont proprement que les différens degrés d'altération , par lesquels le Cristallin doit passer , pour arriver à une parfaite maturité. C'est pourquoi on ne les trouve ordinairement que lorsqu'on abbat trop-tôt la Cataracte.

Les Cataractes de naissance demandent beaucoup de tems pour acquérir une parfaite maturité. D'ailleurs les Enfans qui n'ont pas assez de résolution pour souffrir qu'on leur porte une Aiguille dans l'Oeil , peuvent se faire blesser & perdre la Vue , comme je l'ai vu arriver à la Fille d'un Marchand dans la Rue Thevenot , à laquelle Mr. Gerard le Pere abbatit une Cataracte à l'âge de sept ans. C'est pourquoi je laisse les Enfans jusqu'à l'âge de dix ou douze ans , pour ne pas tomber dans le même inconvénient.

Il arrive quelquefois que le Centre de la Cataracte de naissance est pierreux y ayant dans le milieu du Corps de la Cataracte quelque chose de la grosseur d'une Tête d'Epingle , qui est dur & solide comme une pierre. On sent même

que l'Aiguille fait du bruit , lorsqu'elle touche cet endroit en l'abbatant , tout de même que si on la pouffoit contre un petit gravier. Cela n'empêche point que les Malades ne recouvrent la Vue après l'abbattement de la Cataracte.



CHAPITRE XV.

Des Cataractes douteuses.

J'Appelle Cataracte douteuse celle dont l'heureux succès de l'Opération est aussi incertain que l'usage des Remedes topiques. J'en reconnois de quatre sortes. La première est une espèce de Membrane , qui se remarque à la suite d'un épanchement de matiere purulente dans l'Humeur Aqueuse. C'est cette espèce que je nommerai dans la suite Membraneuse. J'appelle la seconde Filandreuse à raison du nombre des Filamens qui la composent. La troisième est le déplacement du Cristallin après un coup reçu à l'Oeil. La quatrième est l'altération de la Membrane qui recouvre le fond du Chaton de l'Humeur Vitrée.



ARTICLE I.

De la Cataracte Membraneuse.

J'AI déjà dit que la Cataracte membraneuse étoit une suite des Ophthalmies de la Choroïde & de l'Uvée , dont les Vaisseaux obstrués laissent échapper un Pus blanchâtre qui se répand dans l'Humeur Aqueuse. Ce Pus par sa viscosité , s'attache à la circonference de la Prunelle , & y fait paroître une Toile fine.

Lorsque cette matiere n'est pas abondante , elle ne ferme pas exactement la Prunelle. Dans ce cas , si la Fluxion vient à cesser avant d'avoir endommagé le fond de l'Oeil , elle laisse assez de passage à la Lumiere , pour qu'elle y fasse impression ; ce qui fait que les Malades voyent un peu , mais foiblement.

Si au contraire la Fluxion se communique au fond de l'Oeil , & qu'elle détruise l'action des Fibres par lesquelles les esprits sont portés à l'Oeil , la Vue se perd. J'en ai eu une expérience en la Personne de Mr. de Vilvaudé , à qui après avoir souffert une Fluxion violente à ses deux Yeux , l'un perit par un Abscess , & l'autre fut attaqué d'une Cataracte membraneuse , dont il perdit la

Vue. Mr. de Woolhouse lui avoit promis de le faire voir , en lui abbattant cette Cataracte. Ce Malade me vint consulter ensuite ; mais ayant remarqué que cette Cataracte étoit compliquée de Goutte Sereine , je l'assurai que l'Opération seroit inutile.

Cependant il persista à vouloir m'y engager. Comme j'étois assuré de son peu de succès , je ne voulus l'entreprendre qu'en presence d'un Oculiste. On fit venir Mr. Bailly le Pere , qui défera aux souhaits du Malade , disant que si l'Opération ne lui rendoit pas la Vue , elle ne feroit pas de tort à son Oeil. J'opérai donc en présence de cet habile Oculiste. La Cataracte étant bien abbattue , on lui montra des Objets , mais il n'en vit aucun , quoique la Prunelle parût bien claire.

Lorsque le fond de l'Oeil n'est pas endommagé , il reste certaines ouvertures dans cette Cataracte qui permettent aux Malades de voir. J'en rapporterai deux exemples. Un Marchand de drap de la Ville de Beauvais vint à Paris pour se faire traiter d'une Fluxion sur les deux Yeux , qui lui duroit depuis long-tems , & l'empêchoit même de distinguer les Objets , parce qu'il y avoit une Liqueur blanchâtre , qui s'étoit placée dans le

Trou des Prunelles. Quinze jours après la Fluxion cessa , & la Vue commença un peu à revenir , parce que la matiere qui étoit dans le Trou des Prunelles se dissipa , & peu à peu le Malade revit à lire. Sa Vue cependant en est restée foible , à cause que l'Iris se trouvoit bridé par une partie de cette matiere blanchâtre , ne laissant que peu d'espace pour l'entrée des Raions de Lumiere dans l'Oeil.

Il se fait encore une autre sorte d'épanchement d'un Pus blanchâtre dans l'Humeur Aqueuse , lequel se place derriere le Trou de la Prunelle & y séjourne , jusqu'à ce que la Fluxion ait cessé. J'ai vu ce cas en la Personne de Mr. de Lomery , qui dans une Fluxion violente , dont je l'ai traité en mille sept-cens-treize , ne voyoit aucunement de son Oeil malade. On appercevoit derriere le Trou de la Prunelle une espèce de Cataracte purulente , qui ayant acquis une certaine consistance , tomba au bas de l'Oeil , duquel il a bien revu ensuite.

On voit par ces Exemples , que la Cataracte membraneuse se place en trois lieux differens. 1^o. Lorsqu'elle occupe entierement la Prunelle , & qu'elle se trouve adhérente à la circonference de ce Trou. 2^o. Lorsque la Cataracte quoiqu'adhérente ne bouche qu'en partie

l'ouverture de la Prunelle. 3^o. Lorsque la matiere qui la forme , nage dans l'Humeur Aqueuse derriere l'Iris , sans s'y attacher ; & lorsque la Fluxion cesse , elle se précipite ordinairement au fond de l'Oeil ; & si elle s'attache derriere la Prunelle , elle fait une Cataracte membraneuse.

L'on connoitra par ce que je viens de dire , que j'admets des Cataractes Membraneuses , qui sont les suites des Abscess qui se forment dans la Choroïde ou dans l'Uvée , & dont la matiere se vuide & s'épanche dans l'Humeur Aqueuse. Le plus liquide de la matiere épanchée se mêle avec cette Humeur , mais le plus solide se rassemble , & se place dans les differens endroits que j'ai marqués. Si cette matiere demeure placée derriere l'Iris , elle formera une Cataracte semblable à une Membrane , sans que le Cristallin soit altéré ; & voilà ce que j'ai appelé Cataracte membraneuse. On ne peut douter que l'Opération ne puisse réussir dans cette nature de Cataracte , lorsque la Fluxion qui a causé l'Abscess n'a pas détruit les parties essentielles de la vision , ce qui arrive néanmoins rarement. Il est rare aussi de rencontrer des Cataractes de cette espèce , c'est pour cela que j'avance que presque toutes les

Cataractes qui réussissent par l'Opération, sont des altérations du Cristallin.

Tous ceux qui soutiennent qu'il n'y a que les Cataractes membraneuses qui réussissent par l'Opération, ne nous ont encore donné aucune preuve convaincante de ce fait. S'ils avoient ouvert un Oeil, & qu'ils y eussent trouvé le Cristallin dans son entier après la mort d'une Personne à laquelle on auroit abbatu une Cataracte de cette nature, & qui eût vu après l'Opération, & dont le Cristallin se seroit trouvé sans altération, ils auroient quelque forte de fondement à soutenir leur opinion, & on les croiroit s'ils avoient fait voir plusieurs Expériences de ce fait bien averées. Tout ce qu'ils ont donné, est seulement la dissection de quelques Yeux auxquels on n'avoit point operé, & où il s'est trouvé des Cataractes membraneuses; au lieu que l'opinion contraire qui soutient que presque toutes les Cataractes viennent par une altération du Cristallin, est appuyée sur une infinité d'Expériences averées, faites sur les Yeux de Personnes qui avoient souffert l'Opération, & qui ont vu depuis jusqu'à la mort; ces Yeux ayant été ouverts, on a trouvé le Cristallin abbattu conjointement avec la Membrane qui le recouvre.

On a encore des Expériences faites sur des Personnes vivantes plusieurs années après l'Opération de la Cataracte ; le Corps qui avoit été abbatu ayant passé par le Trou de la Prunelle dans la Chambre antérieure de l'Oeil , a été tiré par l'incision faite à la Cornée transparente ; & on a trouvé par l'examen que c'étoit le Cristallin qui avoit passé par la Prunelle , les Malades ayant ensuite vu parfaitement bien à lire , avec des Lunettes à Cataractes.

ARTICLE II.

De la Cataracte filandreuse.

JE mets au nombre des Cataractes douteuses une espèce qui semble pourrant être vraie. Elle peut fort bien être nommée Filandreuse ; car en l'abbatant il paroît que ce sont des Filets que l'Aiguille tire toujours sans en trouver la fin. Il est impossible de guérir cette Cataracte par l'Opération , d'autant qu'on ne sauroit rompre ces Filamens ; c'est pourquoi je suis bien aise d'en avertir ici , afin que si ce cas qui est fort rare , arrive à quelqu'un , il n'en soit pas surpris.

ARTICLE III.

De la Cataracte par des Coups.

LEs Cataractes qui viennent par des Coups reçus aux Yeux ou aux environs , sont (au sentiment de quelques Oculistes) incurables. Mais j'ai plusieurs Expériences du contraire. En voici une en la Personne d'un nommé Constantin , qui demeuroit à Paris , Rue du Verbaux aux Carnaux. Il reçut un coup de Fusil dans les deux Yeux il y a seize ans. Les Grénailles qui avoient pénétré entre les Membranes de l'Oeil sortirent de tems en tems d'elles-mêmes pendant trois ou quatre années , qui se passerent depuis le coup reçu , jusqu'à son Opération. La violence du coup avoit fait plier ou enfoncer le devant du Globe de l'Oeil : ce qui paroît ne devoir arriver qu'en élargissant les côtés du Globe par la compression du coup ; le Cristallin se détacha avec sa Membrane , & s'avança vers la Prunelle , à laquelle il paroissoit adhérant vers le côté du Petit Angle , où une des Grénailles avoit pénétré l'Iris jusqu'à son union avec la Cornée transparente. La Prunelle même étoit devenue oblongue de ce côté. L'Iris n'avoit plus aucun mouvement de dila-

ration ni de constriction. Cependant il appercevoit de ce même côté l'ombre de la main exposée entre la Lumière & son Oeil. Cela me détermina à lui faire l'Opération, il y a onze ou douze ans. Depuis il a vu de cet Oeil aussi-bien que si la Cataracte étoit venue de Cause interne. Mais une chose que l'on trouvera fort surprenante, c'est qu'en suite du Coup de Fusil il avoit perdu la Vue de l'autre Oeil, auquel il ne paroïssoit rien dans les Humeurs qui dût l'obscurcir; & insensiblement la Vue lui revint sans y rien faire, une année après ladite Opération.

Lorsqu'on a reçu un coup violent dans l'Oeil, le Cristallin se détache dans le moment, & en deux ou trois jours il devient opaque; de sorte que les Malades ne voyent plus que la lueur du jour.

Je donne trois situations différentes à ces Cataractes. La première est quand le Cristallin étant détaché par le coup qui a frappé l'Oeil, s'avance vers la Prunelle. Dans ce cas s'il dessecche avant de toucher à l'Iris, il tombe de lui-même, & les Malades revoyent sans Opération. Mais si étant placé derrière l'Iris il s'y attache, alors il faut y faire l'Opération.

La seconde situation de cette Cata-

racte est quand le Cristallin déplacé s'avance dans la Prunelle , & qu'il s'y attache.

La troisieme est lorsqu'il passe tout-à-fait dans la Chambre antérieure de l'Oeil , & qu'il se place entre la Cornée transparente , & l'Iris , dont il faut le tirer de la maniere que je le marquerai dans la suite.

A R T I C L E I V.

De la Cataracte causée par l'Altération de la Membrane du Chaton.

JE mets encore au nombre des Cataractes douteuses , l'Altération de la Membrane située au fond du Chaton de l'Humeur Vitrée , dans laquelle les Malades ne perdent pas entierement la Vue , mais elle s'affoiblit simplement. Dans ce cas on apperçoit dans le fond de l'Oeil , par le Trou de la Prunelle , une blancheur qui paroît plate & mince , comme si c'étoit la Membrane qui recouvre le fond du Chaton de l'Humeur Vitrée qui est altérée. Elle prend souvent la forme d'une Etoile , laissant des espaces où il n'y a pas d'opacité , & d'autres où il y en a ; en sorte que cette opacité , qui ne réside que dans la concavité du Chaton , partant du Centre à la circonfe-

rence , paroisse comme une Etoile. Dans cette Maladie le Cristallin ne se détache pas , & la Vue subsiste quoique foiblement.



CHAPITRE XVI.

Des fausses Cataractes.

ON appelle Cataractes fausses celles où les Remedes n'apportent point de soulagement , & dans lesquelles on ne fait l'Opération que pour ôter la difformité ou les douleurs qu'elles causent. J'en remarque de deux fortes , savoir le Glaucome & la Cataracte branlante.

ARTICLE I.

Du Glaucome.

ON appelle ordinairement Glaucome cette Maladie dans laquelle le Cristallin paroît de couleur de Mer. La Pratique m'a fait connoître que cette couleur ne se rencontre que dans sa naissance , devenant ensuite d'une couleur blanchâtre ou grisâtre. Cette Maladie a donné lieu à plusieurs opinions , tant par rapport à son origine , que par rap-

port aux différens sièges qu'on lui a donnés. Les uns ont cru que c'est simplement une Alteration du Cristallin , & les autres de l'Humeur Vitrée , &c.

J'ai remarqué dans l'examen des yeux des Malades qui en étoient attaqués , une espèce d'Alteration dans le Cristallin , survenue après une Paralysie des Nerfs de la Vision , laquelle paroît d'abord par une dilatation de la Prunelle.

Les signes que donne le Glaucome dans son commencement sont une Fumée , & des Brouillars qui semblent passer devant les yeux , & troublent la Vue des Malades. Dans la suite il voient encore un peu les Objets quoiqu'imparfaitement , mas seulement du coin de l'Oeil , d'autant qu'il se trouve encore quelques Fibres qui ne sont pas totalement obstruées. Peu à peu la Vue se perd , & les Malades ne voient plus que la clarté du jour ; pour lors le Cristallin vient à s'alterer , & à perdre sa transparence , prenant d'abord la couleur de Mer ; à mesure qu'il devient plus solide , il change sa première couleur , prend celle de Cataracte ; tantôt d'une couleur , & tantôt d'une autre , comme j'ai déjà dit ; c'est ce que j'appelle Glaucome , qui ne diffère de la vraie Cataracte , que par la Complication d'une Goutte Sereine , comme je viens de le marquer.

Le Glaucome commence quelquefois après une Fievre , dans la Crise , par laquelle il se fait un transport dans l'Oeil de l'Humeur qui la caufoit , d'où toutes les Membranes de cet Organe souffrent inflammation , fans que la Conjonctive foit beaucoup intereffée. Les Malades ressentent une douleur vive dans le fond de l'Oeil , & dans la Tempe. La Goutte Sereine fuit cette Fluxion , après laquelle il fuccède un Glaucome.

Quelquefois un coup de Soleil produit le même effet , comme j'ai vu arriver en 1717 , à un Commandeur de Malthe , qui avoit long-tems souffert d'un pareil accident des douleurs très vives dans la tête , & à l'Oeil , lesquelles ont été fuivies d'un Glaucome.

Quelquefois cette Maladie n'a pour cause qu'une Humeur épaisse qui fait des obstructions dans le fond de l'Oeil , & dans le Cristallin , d'où il réfulte la Goutte Sereine , & une Cataracte qui se forme fans douleur , d'où il s'ensuit le Glaucome.

On accufe les Vieillards d'être fujet à cette Maladie , parce que leur Cristallin paroît deffeché , ce qui ne les empêche pas de distinguer les Objets , mais de les voir finement. J'ai vu deux Personnes dont le Cristallin étoit devenu si opaque ,

qu'il sembloit qu'elles avoient des vraies Cataractes , & qu'elles ne dussent point voir ; cependant ces Personnes voyoient à lire.

Je ne prend point ce dessechement du Cristallin pour Glaucome , parce que les parties essentielles de la Vision demeurent saines ; pendant que le Cristallin se desseche , dans cet état la lumiere pénètre encore jusqu'au fond de l'Oeil , trouvant une entrée autour de ce corps desseché , ce qui fait que les Malades nonobstant l'opacité du Cristallin , voient & distinguent les Objets , jusqu'à lire l'écriture ; cette Maladie tient plus de la Cataracte que du Glaucome. S'il arrivoit à ces sortes de Personnes une Goutte Sereine , comme il peut arriver tout d'un coup , la Prunelle se dilateroit , & ce seroit alors un Glaucome selon ma définition.

Le Prognostic de cette Maladie est très fâcheux , d'autant qu'elle ne guérit point par les Remedes lorsqu'elle est une fois formée ; & que quand elle attaque un Oeil , il y a beaucoup à craindre pour l'autre.

Dans ceux auxquels ce n'est qu'un dessechement du Cristallin , comme il arrive dans les Vieillards , la Vue se conserve souvent toute leur vie. C'est dans ces Vieillards , où le Vin d'Euphrase , & ses préparations tant vantées par nos Anciens font merveille.

Je me crois obligé de détromper ici le Public sur un fait rapporté dans un des Ecrits de Mr. de Woolhouse , qui a prétendu que la Mere de Saint Paul , Religieuse de l'Hôtel-Dieu , étoit attaquée d'un Glaucome incurable , & qu'elle n'a point vu après l'Opération ; mais j'ai de quoi convaincre tous ceux qui aiment la vérité , que le fait s'est passé comme le voici.

Je vis la Malade dès le commencement, & je trouvai dans sa Maladie tous les Signes des vraies Cataractes , l'Iris ayant tout son mouvement. L'hyver avant que je lui fis l'Opération , elle eut une Fluxion violente sur cet Oeil , qui dilata la Prunelle , & détruisit en partie l'action des Nerfs visuels. Mais parce qu'elle voyoit l'ombre de la main exposée entre la lumière & son Oeil , je lui accordai de lui faire l'Opération , en l'avertissant qu'elle verroit peu ; dequoi elle étoit si contente , qu'elle ne se proposoit d'autre bien que de ne pas se heurter en marchant.

J'abbatis sa Cataracte , elle fut pansée à l'ordinaire ; elle a vu de son Oeil autant & plus qu'elle n'espéroit ; puisqu'une année après l'Opération , je lui ai fait voir avec une Lunette à Cataracte , des Lettres & des figures dans un Tableau.

ARTICLE II.

De la Cataracte branlante.

JE ne dirai que fort peu de chose de la Cataracte branlante, d'autant que cette Maladie est incurable, & que l'Opération n'y sert qu'à ôter la difformité de l'Oeil, & à faire cesser les douleurs. Le Cristallin devient plâtreux & semblable à celui du Merlan frit. Il va de côté & d'autre suivant les differens mouvemens de l'Oeil, parce que ce corps se trouve encore attaché à quelques Fibres ciliaires qui le tiennent suspendu au milieu de la Chambre postérieure. Par succession de tems ces Fibres viennent à se rompre; c'est alors que le Corps du Cristallin n'ayant plus d'attache qui l'arrête passe au moindre ébranlement dans la Chambre antérieure de l'Oeil; d'où l'on est obligé de le tirer, comme il sera enseigné au Chapitre de l'Opération de la Cataracte.



CHAPITRE XVII.

Des Causes des Cataractes.

LEs Cataractes sont produites par des Causes internes ou externes. Ceux qui en ont traité jusqu'à présent, n'ont

pas encore assez expliqué de quelle manière cette Maladie se forme ; voici ma pensée là-dessus.

La première chose qui arrive dans la formation de la Cataracte de Cause interne , est l'épaississement & la viscosité des Sucs nourriciers qui passent dans les Vaisseaux de la Membrane qui assujettit le Cristallin dans l'Humeur Vitrée & dans ceux du Cristallin même. Ces Sucs par leur viscosité bouchent les Canaux par où ils passent , & alors la nourriture qui doit servir à entretenir les parties dans leur état tonique , venant à manquer par le défauts des Tuyaux obstrués , les derniers Sucs nourriciers ayant perdu le cours de la circulation , s'aigrissent par leur séjour , & fermentent ensuite. De là il arrive une fonte générale de toute la substance du Cristallin ; ce qui cause les Abcès & les Cataractes purulentes. Si cette fonte n'est qu'imparfaite , elle rend le Cristallin moins fluide , lequel aussi bien que la Membrane dans laquelle il est enveloppé , se détache de l'Humeur Vitrée , se rendurcit ensuite. A mesure qu'il redevient plus solide , il s'avance vers le Trou de la Prunelle , étant poussé par une serosité qui s'amasse derrière lui , soit que ce soit l'Humeur Aqueuse qui s'y glisse , soit que l'Humeur Vitrée la

fournisse , d'autant plus que les Cellules antérieures de la Vitrée en paroissent plus remplies. La preuve qu'il s'amasse de l'Eau entre le Cristallin alteré & le Corps vitré , c'est qu'en abattant la Cataracte , s'il s'en détache quelque portion , elle se pousse avec rapidité dans la Chambre antérieure de l'Oeil , comme si elle y étoit fortement chariée par une liqueur qui se porte de derrière en devant.

Ainsi je crois que dans les commencemens des Cataractes de cause interne , il se fait une fonte qui ramollit le Cristallin , & le rend plus ou moins liquide. En effet lorsqu'on veut tenter l'Opération de la Cataracte avant le tems de sa maturité , l'aiguille passe au travers comme dans une crème épaisse sans pouvoir l'abattre ; au-lieu que dans l'état sain & naturel du Cristallin , l'Aiguille trouve une résistance. Il faut donc nécessairement conclure par cette différence , qu'il se fait d'abord un ramollissement , & une fonte de l'Humeur Cristalline , aussi-tôt que la Cataracte commence.

Il ne faut pourtant pas croire que toutes les Cataractes aient toujours pour cause la fonte du Cristallin ; car il s'en trouve aussi qui proviennent d'abord de son adoucissement ou dessèchement. Cette sorte de Cataracte peut-être abbatue

fort peu de tems après sa formation.

Il est bien difficile d'expliquer comment le Cristallin prend cette consistance en si peu de tems. Cela n'est pourtant pas surprenant, puisque dans la Cataracte branlante il devient comme du Plâtre.

La couleur du Cristallin dans cette espèce de Cataracte approche du brillant du Vif-argent, tirant sur la couleur du Verre de Vîtres. Je ne saurois le mieux comparer qu'à du Talc par rapport à sa consistance, parce qu'en l'abbattant il se casse par écaille comme cette matière, quand on appuye l'Aiguille dessus, ce qui n'empêche pas que l'Opération ne réussisse.

Les Causes externes qui produisent les Cataractes, sont des coups reçus dans l'Oeil, & aux environs, comme les chutes qui ébranlent beaucoup la Tête, les coups reçus autour de l'Orbite, qui causent un ébranlement dans l'Oeil, les coups sur le milieu du Globe qui font plier la Cornée en dedans, ce qui fait écarter les parties postérieures & laterales des Membranes qui enveloppent les Humeurs de l'Oeil, d'où il arrive que la Membrane qui attache le Cristallin au Corps vitré, occasionne en se rompant le détachement du Cristallin.

Ces fortes de coups font ou de Grénailles , comme je l'ai vu arriver au nommé Constantin dont j'ai parlé , ou d'une infinité d'autres manières qu'il feroit trop long à décrire. J'en rapporterai cependant quelques cas. En voici un arrivé il y a fix ans à l'Hôtel des Asturies , rue du Sepulcre à Paris , à un jeune Homme de qualité , à qui un de ses Amis avoit frappé le milieu de l'Oeil avec le bout d'une Baguette fans y penser. Je ne fus appelé que le lendemain de cet accident je trouvai le Cristallin détaché , & flottant dans l'Humeur aqueuse , qui étoit déjà devenue opaque , fans qu'il parût ni égratignure , ni blessure à l'extérieur de l'Oeil. Le Malade ne discernoit de cet Oeil , que la lueur du jour.

Les Enfans qui tirent des Fusées dans les Rues , occasionnent souvent des Cataractes aux Passans ; il y a dans les Fusées quelque chose de gros , comme un Pois qui les bourre. Lorsque ce corps vient à frapper l'Oeil , il y produit une Cataracte en détachant le Cristallin de la même manière que nous l'avons dit ci-devant. Un pareil accident arriva il y a quatre ans , dans la Rue de la Mortellerie à Paris , au Fils d'un Marchand de bled âgé de douze ans ; le Cristallin se détacha dans le moment , & il parut

le lendemain de ce coup , opaque & blanc-châtre.

Un coup de pointe de Ciseaux reçu à l'Oeil , peut détacher le Cristallin dans le moment ; il n'y a que peu de jours que cet accident arriva à une jeune Fille de douze ans ; la pointe de ses Ciseaux lui ayant frappé la Cornée transparente , je trouvai en examinant son Oeil dès le lendemain , que le Cristallin s'étoit détaché , & étoit devenu opaque.

Une Epingle , ou tout ce qui peut piquer le Globe de l'Oeil , peut produire une Cataracte , comme il est arrivé l'Hiver dernier à la Communauté des Filles de Sainte Genevieve , sur le Quai de la Tournelle. Une des Sœurs en secouant son Tablier , une Epingle lui entra dans l'Oeil , à l'endroit où l'on pique avec l'Aiguille , lorsqu'on veut abbatre une Cataracte , cette Epingle entra fort avant & piqua le Cristallin , & il survint des douleurs terribles , lesquelles étant apaisées , je découvris qu'il s'étoit formé une Cataracte.

J'ai encore vu un exemple de Cataracte venue par un coup tranchant , qui avoit frappé le milieu de la Prunelle. Le Cristallin s'étoient détaché de l'Humeur vitrée & placé dans la Chambre postérieure de l'Oeil à l'endroit où se

placent les vraies Cataractes. Dans ce coup , l'instrument pointu qui entra par la Cornée , poussa jusques dans le Cristallin , & le blessa ; d'où il arriva que cette Cataracte tenoit à la Playe de la Cornée par une continuité d'une matière blanchâtre qui partoît du Cristallin , & venoit s'attacher à la Cornée à l'endroit où étoit la Cicatrice interne de la Playe. Ce Malade s'étant adressé à moi trois ans après avoir reçu ce coup , j'examinai son Oeil dont les parties du fond étoient saines , & je reconnus que si on pouvoit abattre la Cataracte , il verroit. C'est pourquoi j'y portai l'Aiguille. La Cataracte s'abbattit par sa partie supérieure ; & je vis que l'attache étoit trop dure , & qu'elle tiroit à elle la Cornée transparente. N'ayant pas pu la rompre avec l'Aiguille , il me fut impossible de la faire descendre plus bas que son attache , parce que dans ce tems-là je me servoais d'Aiguille ronde. Si j'en avois eu une tranchante & plate par le bout comme à présent , j'aurois pu par son tranchant couper cette attache , & y réussir parfaitement.

L'on m'objectera peut-être que ces sortes de Cataractes venues par des coups qui détachent le Cristallin , ne sont qu'un épanchement d'une liqueur blanchâtre

châtre dans l'Humeur Aqueuse , qui a coulé par la rupture de quelques vaisseaux du Globe , & s'est placée derrière l'Iris ; & qu'ainsi je me trompe en prenant cette liqueur blanchâtre pour le Cristallin.

A cela je répond qu'il est bien facile d'en faire la différence , & le coup n'a point occasionné la rupture de quelques Vaisseaux sanguins. Car si on examine l'Oeil peu de jours après le coup reçu , on appercevra par le Trou de la Prunelle que cette Cataracte a une forme ronde & voutée comme le Cristallin , ayant même de la consistance ; ce qui n'arriveroit pas , si c'étoit un simple Suc blanchâtre qui fût épanché.

D'ailleurs ce Suc blanchâtre ne peut s'épancher dans l'Humeur Aqueuse que par la rupture de quelques Vaisseaux , d'où il suit qu'il devroit être mêlé de Sang. Mais pour faire voir que cette espèce de Cataracte ne vient point d'un Suc blanchâtre épanché dans l'Humeur Aqueuse , c'est qu'elle ne se trouve jamais mêlée de ce Sang. Il est vrai que lorsqu'il y a eu rupture aux Vaisseaux ou aux Membranes par un coup qui a détaché le Cristallin , il paroît quelquefois du Sang dans l'Humeur Aqueuse ; mais il n'en paroît jamais dans le Corps du

Cristallin , comme cela devoit être , si ce que je prends pour le Cristallin , n'étoit qu'un Suc blanchâtre ; puisque ce Sang étant refous par les Remèdes , on apperçoit la Cataracte flottante dans l'Humeur Aqueuse sans aucune couleur de Sang. On doit conclure de-là que cette espèce de Cataracte ne vient point de ce prétendu Suc épanché , & qu'elle n'est autre chose que le Cristallin détaché de son Chaton , parce que souvent elle tombe d'elle-même au bas de l'Oeil , à l'endroit où on la place dans l'Opération ; & alors les Malades ne peuvent voir à lire que par le secours des Lunettes à Cataractes ; preuve certaine que c'est le Cristallin qui a été détaché , puisque ces Lunettes en font l'office.



CHAPITRE XVIII.

Des Signes des Cataractes.

LORSQUE la Cataracte commence , & que les Canaux du Cristallin se bouchent , la Lumière qui entre dans l'Oeil frappant l'endroit de l'obstruction , fait une ombre sur la partie de l'Oeil , où se doivent peindre les Faisceaux de la Lumière ; ce qui fait paroître aux Malades des Mouches dans l'air , ou des

Toiles d'Araignées qui vont de côté & d'autre selon le Mouvement du Globe de l'Oeil. Cette ombre prend différentes figures suivant la quantité de Canaux ou Tuyaux embarrassés du Cristallin , & selon leurs différens dérangemens comme des Cheveux , de la Poussière , des Toiles d'Araignées , Mouches , Crêpes , &c.

Il est difficile de connoître la Cataracte dans son commencement , parce que les signes précédens se trouvent à peu près les mêmes dans d'autres Maladies de l'Oeil , sans que ce soit des Cataractes. Car ces Mouches ou Ombres , se peuvent encore former par le relâchement des Vaisseaux de la Retine , lorsqu'ils se trouvent en quelques endroits séparés de la Choroïde ; en ce que la Lumière qui doit tomber sur ces endroits n'y pouvant faire impression , il en résulte une espèce d'Ombre sur la Choroïde.

Il y a encore une fausse Suffusion , dans laquelle on apperçoit une infinité d'Atomes dans l'Air ; mais ni dans l'une , ni dans l'autre de ces deux dernières Maladies , la Vue n'est point racourcie.

Les Signes certains d'une Cataracte commençante , sont que les Malades ne sont pas long-tems à s'appercevoir que la

Vue de l'Oeil affligé s'accourcit de plus en plus , qu'ils ne voyent pas si distinctement de loin qu'ils faisoient auparavant ; & que de huit en huit jours , leur Vue diminue sensiblement.

Mais aussi-tôt que la fonte dont j'ai parlé ci-dessus survient dans cette Humeur , on apperçoit la blancheur & l'opacité enfoncée dans la Chambre postérieure de l'Oeil , à l'endroit où est situé le Cristallin ; alors on connoît parfaitement bien la Cataracte par l'examen de l'Oeil , ce que l'on ne favoit auparavant que par le recit que le Malade faisoit de la diminution & de l'affoiblissement de sa Vue.

Après avoir rapportés les Signes qui font connoître la Cataracte , il faut parler de ceux qui désignent sa Maturité & ses Degrés ; ils sont au nombre de trois. Le premier est , lorsque la Cataracte paroît d'une opacité égale par-tout ; car quand l'opacité n'est pas égale en regardant par le Trou de la Prunelle , on apperçoit des endroits qui paroissent plus solides les uns que les autres.

Le second Signe paroît , le Malade étant placé le Dos tourné à la Lumière en lui présentant un Objet ; s'il le distingue , c'est une preuve que la Cataracte n'est pas encore mûre , à moins que ce

ne soit une des ces espèces de Cataracte , dont le Cristallin est demeuré au milieu de la Chambre postérieure de l'Oeil.

Le troisième Signe qui est le plus certain , c'est lorsque l'Opérateur regardant l'Oeil exposé à la lumière du jour , & trouvant le Cristallin d'une opacité égale , il ferme avec ses pouces les Yeux du Malade , & ayant frotté avec son pouce la Paupiere de celui où est la Cataracte , il l'ouvre aussi-tôt , tenant l'autre fermé ; pour lors si la lumière qui tombe sur la Prunelle , fait que l'Iris se resserre , & quoiqu'exposé à la même lumière , il se dilate de moitié , ou du quart de ce qu'il s'étoit ressermé , on peut juger certainement que la Cataracte est mûre. Je ne fais encore aucun Auteur qui ait décrit les Signes pour connoître & faire la différence de la Cataracte Membraneuse , d'avec celle qui est produite par l'altération de l'Humeur Cristalline ; cependant il est d'une grande conséquence d'en pouvoir faire la distinction , selon ceux qui n'admettent que des Cataractes membraneuses , afin de ne prendre point dans l'Opération l'une pour l'autre ; on en fera la différence , en ce que si la Cataracte est membraneuse , on la connoitra en ce qu'elle est plate , & que son milieu paroît souvent enfoncé ; au

222 TRAITÉ DES MALADIES

lieu que celle qui est produite par l'Humeur Cristalline , en regardant par le milieu de la Prunelle , on y distinguera une forme lenticulaire , plus élevée dans son milieu , que dans sa circonférence.

Il ne suffit point d'avoir examiné les Signes qui font connoître la maturité de la Cataracte , il est encore nécessaire de parler de ceux qui nous assurent que le Malade verra , la Cataracte étant abbatue. Ces Signes se tirent de la disposition de l'Oeil , & de la nature de la Cataracte. La première chose est de savoir , si les Organes de la Vision sont sains , & bien disposés ; ce qu'on connoitra par la facilité que l'Iris aura de se dilater & de se resserrer , comme nous avons déjà dit ; car si on n'apperçoit aucun mouvement à l'Iris , c'est une preuve certaine que le Malade ne verra point , quoique sa Cataracte soit abbatue , à moins qu'elle ne soit du nombre de celles qui viennent à la suite d'un coup , où l'Iris a été blessée ; car pour lors , si en plaçant la main devant l'Oeil ouvert , entre la Lumière & l'Oeil , le Malade apperçoit l'ombre de la main , & qu'étant retirée il voit une certaine clarté du jour , c'est une preuve que le fond de l'Oeil est sain.

A l'égard des Signes pronostics tirés

de l'Oeil , si l'Oeil malade est plus gros ou plus petit que le sain , c'est un mauvais signe , puisque la grosseur démesurée du Globe est une preuve certaine , que ce qui s'est épanché dans l'Oeil pour le rendre en cet état , a forcé les parties essentielles de la Vision , & que l'Oeil est atteint de Goutte sereine par l'allongement de ses Nerfs.

Si au contraire le Globe se trouve émacié , c'est encore un mauvais signe , puisque la diminution du Globe prouve que les Parties nerveuses ont été abbreuvées par un suc âcre & salé qui les a flétris & intercepté le cours des esprits dans l'Oeil.

Quant aux signes pronostics tirés de la Cararacte , il y en a de deux sortes , les uns regardent son ancienneté , & les autres ses différentes couleurs.

A l'égard de l'ancienneté , on doit remarquer qu'à mesure que les Cataractes membraneuses vieillissent , elles se rendent adhérentes à toute la partie postérieure de l'Iris , ou seulement à quelques points de sa circonference ; d'où dépendent les changemens qui arrivent pour lors à la Prunelle , comme certaines couleurs étrangères qu'elle prend , ou rides qu'on y remarque.

La difficulté , ou pour mieux dire , l'im-

possibilité où l'on a été de détruire ces adhérences dans l'Opération , en a fait entièrement abandonner l'usage à plusieurs Oculistes , quoiqu'il ne soit pas impossible d'en venir à bout , en coupant ces adhérences avec une Aiguille tranchante.

Quelque ancienne que devienne la Cataracte du Cristallin , elle ne se rend jamais adhérente à l'Iris. Elle s'en approche à la vérité si exactement , qu'elle lui fait perdre presque tout son mouvement. Aussi ne craint-on pas d'entreprendre son abbattement , à quelque degré d'ancienneté qu'elle soit arrivée , malgré ce qu'ont avancé plusieurs Auteurs sur l'impossibilité d'y réussir , pourvu que l'on ait la dextérité de couper les Fibres qui résistent à son abbattement , sans intéresser les parties auxquelles elles sont adhérentes.

Il est bon de dire un mot des Cataractes Barrées. On nomme Cataracte Barrée celle dont la partie antérieure est traversée par une ou plusieurs Fibres placées en divers sens. Comme ces sortes de Cataractes n'acquierent que très-rarement la consistance convenable pour être sûrement abbattues , il arrive très-souvent qu'il se trouve dans le Corps de ces Cataractes une matière blanchâtre ,

& quelquefois jaunâtre , laquelle s'épanche dans le moment de l'Opération , & se mêlant avec l'Humeur Aqueuse , la trouble. Il arrive pour l'ordinaire que cette matiere acquiert de la consistance , & forme par sa présence le même obstacle aux passages des Rayons de Lumiere , qu'avant d'être abbattue. Pour lors , si elle ne se précipite pas d'elle même au bas de la Chambre postérieure , l'on fera dans la nécessité après six semaines d'y reporter une seconde fois l'Aiguille , pour abbattre ce nouveau genre de Cataracte , qui aura acquis assez de consistance pour obéir aux impulsions de l'Aiguille.

Quant aux couleurs des Cataractes , l'expérience m'a fait connoître que de quelque couleur qu'elles soient , l'Opération réussit toujours , pourvu que les Signes qui marquent sa maturité , & la bonne disposition de l'Oeil soient présents. On peut dire cependant qu'entre ces différentes couleurs , celles d'un gris-cendré réussissent le mieux ; celles d'un blanc-céleste ; celles qui sont d'un brillant-argenté tirant sur le Verre de Vitre , & les blanches qui tirent sur le verd-de-mer suivent après ; les cendrées , de même que celles qui sont de couleur de plomb , & les roussâtres , ou de couleur

de Chataigne ; celles qui sont d'un blanc de Neige sont difficiles , & elles sont douteuses pour la réussite , aussi-bien que celles qui ont des Vaisseaux sanguins qui les traversent antérieurement.

Les fausses Cataractes dans lesquelles l'Opération ne peut servir que pour ôter la difformité , sont celles d'un blanc de Plâtre , ou qui ressemblent à un Grain de Grêle , ou enfin à de l'Ivoire blanche & polie.



CHAPITRE XIX.

De ce qu'il faut faire avant l'Opération de la Cataracte.

APRÈS avoir reconnu la Nature de la Cataracte , ses différentes Causes , les Signes qui nous marquent sa maturité , & ceux enfin qui nous annoncent le succès de son Opération en nous faisant appercevoir la disposition de l'Oeil , il reste à examiner si la Personne est en état de la supporter. Car si elle avoit quelque douleur de Tête , ou qu'elle fut incommodé de Fievre ou autrement , il faudroit remédier à ces accidens avant de l'entreprendre. Il faut sur - tout bien prendre garde de ne la point entreprendre trop tôt ; car on en

voit qui restent quatre ans , d'autres cinq , & même sept , avant d'acquiescer leur parfaite maturité. L'inconvenient est que ceux qui sont attaqués veulent voir , & n'ont pas la patience d'attendre un si long-tems. Il se trouve d'ailleurs des Opérateurs , qui pour gagner de l'argent les abbattent comme ils les trouvent , mures ou non ; ils flattent les Malades de recouvrer bien-tôt la Vue. Ceux-ci se laissent aisément séduire par un appas qui leur fait plaisir ; & le desir du gain fait que l'Opérateur , de crainte de perdre cette pratique , se hazarde à faire une Opération douteuse , s'embarassant moins de sa réputation pour l'avenir , que de son intérêt présent.

La Cataracte est semblable à un fruit que l'on doit laisser meurir sur l'Arbre. Si on veut le cueillir avant sa maturité , il faut en casser la queue ; au lieu qu'étant mur , il se sépare aisément de l'Arbre , & tombe quelquefois de lui-même. Si on se hâte de faire cette Opération , il arrive , ou que l'Aiguille passe sans succès au travers du Corps que l'on veut abattre à cause de sa mollesse , ou que les Fibres ciliaires n'étant pas assez deséchées pour pouvoir être cassées aisément par l'Aiguille , on les tiraille , & ce mouvement forcé se communique aux

autres parties de l'Oeil , d'où il fuit une Fluxion violente qui quelquefois fait perdre la Vue. Et quand même cet accident n'arriveroit point , on est obligé quelque tems après d'y reporter l'Aiguille , pour abbattre ce qui est resté de la première fois.

L'Opération de la Cataracte n'est pas indifférente à raison des suites fâcheuses qu'elle peut avoir ; sa réussite ne dépend pas moins de l'adresse de l'Opérateur , que de la bonne disposition du Malade. Il faut le bien préparer par les Saignées , les Bains , les Bouillons rafraîchissans , & les legers Purgatifs , avant de faire son Opération. On doit choisir même le tems le plus temperé , comme sont les Saisons du Printems & de l'Automne ; mais le Printems est préférable , parce qu'on entre toujours dans la belle Saison , ce qui n'est pas de même dans l'Automne. Je sai que l'on peut faire cette Opération en tout tems , mais celui que je marque est toujours le plus avantageux pour les Malades.

Outre ce que je viens de dire , il faut encore prendre un beau jour ; car les tems humides sont très contraires aux Malades , & causent des fontes abondantes qui donnent lieu à la décharge d'une grande quantité de sérosité four-

nie par la Glande lacrimale , ce qui attire sur l'Oeil des Fluxions fort opiniâtres.

Les Tonnerres sont aussi fort contraires dans les premiers jours de l'Opération , à raison de l'altération considérable qu'ils occasionnent aux humeurs de l'Oeil.



CHAPITRE XX.

De la maniere de faire l'Opération de la Cataracte.

TOUTES les choses marquées ci-dessus étant observées , on couvrira l'Oeil sain d'une Compresse , que l'on retiendra par un tour de bande ; & le Malade étant assis le visage tourné vers le jour , l'Opérateur se placera vis-à-vis sur une Chaise de telle hauteur que sa tête soit un peu plus élevée que celle du Malade , & qu'ils soient placés tous deux de maniere que la Tête de l'Opérateur ne fasse point d'Ombre sur l'Oeil où est la Cataracte. Il mettra ensuite les Jambes du Malade entre les siennes , afin d'être plus près de lui. Un Serviteur placé derrière mettra sa main gauche sur la Tête du Malade , & la droite sous le Menton , supposé que l'Opération se fas-

se à l'Oeil gauche , & appuyant ensuite la Tête du Malade contre sa Poitrine , il la retiendra ferme , de crainte que le Malade ne la tourne de côté & d'autre. L'Opérateur pose le Doigt Indice de la Main gauche sur la Paupiere supérieure , pour l'ouvrir & la retenir levée , & il appuyera le Pouce sur l'inférieure , pour la maintenir abaissée. Il prendra alors l'Aiguille à Cataracte qui doit être plate & tranchante pour les raisons que nous dirons ensuite. Il doit la tenir de la Main droite entre les trois premiers doigts , à peu près de la même manière que l'on doit tenir une Plume à écrire , en sorte que le Doigt du milieu pose sur l'endroit qui est éloigné d'un travers de doigt de l'extrémité du Porte - Aiguille. Il pose ensuite le Doigt annulaire & le petit Doigt sur la Tempe du côté qu'il doit operer , & ordonne au Malade de tourner l'Oeil vers le Nez , & l'Oeil ainsi tourner , il le pique dans le blanc à environ une demie ligne ou une au plus de distance de la Cornée transparente , évitant les Vaisseaux sanguins qui rampent sur la Conjonctive , & en détournant la pointe de l'Aiguille de l'Iris , crainte de la blesser. Aussi tôt que la pointe de l'Aiguille , qui doit entrer horizontalement par rapport à ses deux tranchans , a percé les Mem-

branes , fans la faire entrer plus avant , il faut la diriger droit vers la partie postérieure de la Cataracte fans rouler l'Aiguille. On la pousse pour lors jusqu'à ce que sa pointe ait atteint au-delà du milieu de la Prunelle , ce que l'on reconnoitra en appuyant la pointe derrière le corps de la Cataracte. Et pour ne point blesser la Membrane de l'Humeur Vitrée , on doit encore diriger la pointe de l'Aiguille vers le Corps de la Cataracte. On levera ensuite la pointe de l'Aiguille pour gagner la partie supérieure de la Cataracte que l'on baissera tout doucement pour la faire descendre au-dessous de la Prunelle , le plus près qu'on pourra de la partie postérieure de l'Iris. On levera pour lors l'Aiguille sans la retirer ; & pour s'assurer si toutes les attaches de la Cataracte ont été détruites , on fera tousser le Malade ; & si on voit remonter la Cataracte , on la rabattra sur le champ ; si elle ne remonte pas , on baissera la pointe de l'Aiguille pour appuyer encore sur le corps de la Cataracte , évitant de blesser la Membrane de l'Humeur Vitrée , ce qui pourroit occasionner la perte de la Vue , si on venoit à detacher cette Humeur. On fermera ensuite les Paupieres avec les deux Doigts qui les tenoient ouvertes , & ou

232 TRAITÉ DES MALADIES.
retirera doucement l'Aiguille.

Il faut observer que si on opere du côté droit, on se servira de la Main gauche. Il en est de même du Serviteur qui placera ses Mains d'une maniere opposée à celle que nous avons dit.

L'Opération faite, on trempera une Compresse dans un mélange de dix parties d'Eau commune tiède sur une d'Esprit-de-Vin, & on exprimera la Compresse pour en faire couler sur la piquure. On appliquera ensuite cette Compresse sur l'Oeil, & une semblable par dessus. On en fera autant à l'Oeil sain. Le tout sera assujetti par un simple tour de bande, laquelle ne doit appuyer que sur le haut de la Compresse, c'est-à-dire, sur les Sourcils, & on attache les deux bouts de la bande au Bonnet du Malade avec des Epingles.

Il faut mettre le Malade dans son Lit avec deux ou trois Oreillers derrière son Dos, pour le tenir élevé & comme assis. On fermera les Rideaux du Lit, les Fenêtres & les Volets, afin qu'il n'entre aucun jour dans la Chambre du Malade; on le laisse en repos sans lui parler, ni le faire parler. On arrosera d'heure en heure les Compresses avec la même Liqueur tiedie, & en faisant ceci on place la Lumiere derrière la tête du Malade,

afin qu'elle ne frappe aucunement les Yeux. Trois heures après l'Opération, on lui fait prendre un Bouillon, & deux heures après le Bouillon on le saigne. On continue de le nourrir de même pendant trois jours, en donnant des Bouillons de trois heures en trois heures. Vers le quatrieme jour on lui fait manger de la Soupe mitonnée jusqu'au septieme ou au neuvieme, auquel tems on le remet à la Viande.

Le matin & le soir on leve les Compressees de dessus les Yeux, pour faire entrer du mélange d'Eau & d'Esprit-de-Vin tiède dans l'Oeil. Vers le cinquieme jour de l'Opération, on découvre l'Oeil qui n'a pas été operé, supposé qu'il ne soit arrivé aucun accident à l'autre. On mettra dessus pendant cinq autres jours une Compresse seche, si le Malade voit de cet Oeil : sinon on le laissera exposé à l'air sans rien appliquer dessus.

Après neuf jours on couvrira l'Oeil operé avec une Compresse seche attachée au bonnet. Afin qu'il s'accoutume à recevoir la Lumiere par dessous ladite Compresse, on laisse entrer un jour foible dans la Chambre du Malade, enforte que l'on puisse s'y voir; & peu à peu on accoutume l'Oeil à la Lumiere, la faisant entrer dans la Chambre, & passer dans l'Oeil par degrés.

Il y a des Personnes qui ne peuvent demeurer couchées sur le Dos. Dans cette occasion , je le fais mettre dans un Fauteuil les pieds élevés sur un Tabouret , & entourer le Fauteuil de Rideaux , où ils demeurent quatre ou cinq jours. Puis je les fais coucher quand ils peuvent se tenir dans le Lit , les faisant coucher & lever quand ils sont trop fatigués d'une même situation.

Il y en a qui se trouvent si échauffées d'être couchées sur le Dos , que si on vouloit les obliger à s'y tenir , la Fievre les prendroit & causeroit des Fluxions sur l'Oeil. C'est pourquoi je les fais lever après vingt-quatre heures , & les fais mettre à côté de leur Lit dans un Fauteuil que l'on entoure du Rideau du Lit. Il faut seulement prendre garde en les faisant lever & coucher , qu'il aient toujours la Tête élevée , & ne fassent aucun effort dans ces mouvemens.

Les Aiguilles dont on se sert sont différentes , plates ou rondes ; les plates entrent mieux & plus aisément dans l'Oeil. Quelques-uns veulent qu'elles soient coupantes comme les Aiguilles des Chirurgiens. J'en ai inventé une espèce très-avantageuse , dont la pointe est comme celle d'une Lancette , enforte que la longueur du tranchant est seulement d'une

ligne , après quoi de plate qu'elle est elle devient ronde. Il faut que la pointe fasse l'ouverture aussi large qu'il est nécessaire , pour pouvoir avancer & reculer le corps de l'Aiguille dans la piqure , sans résistance de la part des Membranes ; ce que l'on est quelquefois obligé de faire dans l'Opération , pour abbattre quelques portions de la Cataracte , qui sont plus ou moins éloignées dans l'Oeil.



CHAPITRE XXI.

De la maniere d'operer aux Cataractes qui sont dans la Chambre de l'Humour Aqueuse.

LORSQU'É les Cataractes ont passé dans la Chambre antérieure de l'Humour Aqueuse , il faut y faire une Opération particuliere. Mais avant que d'en expliquer la Methode , je dirai de quelle façon elles peuvent passer par le trou de la Prunelle , & se loger entre l'Iris & la Cornée transparente.

Il y a trois sortes de Cataractes qui passent par le Trou de la Prunelle , une dans laquelle la consistance du Cristallin est molle ; l'autre où cette consistance est dure & pierreuse ; & une troisieme qui est en partie molle , & en partie pier-

reuse. Lorsqu'elle est molle , l'Humeur Aqueuse qui se trouve derriere ce Corps , le pousse & le fait nicher dans la Prunelle , de la maniere que j'ai dit en traitant des Cataractes. Lorsqu'au contraire ce Corps est dur , comme il arrive dans la Cataracte branlante , il passe tout d'un coup par le Trou de la Prunelle , au moindre effort que l'on fait en baissant la tête , par exemple en soufflant le feu , &c. Ce dernier cas peut arriver aussi à une Cataracte trois ou quatre ans après qu'elle a été abbattue.

Quand on veut faire l'Opération pour tirer le Corps du Cristallin qui auroit ainsi passé , il faut faire asseoir le Malade sur une Chaise , l'Oeil bien exposé au jour , ouvrir les deux Paupieres avec le Pouce & l'Indice , puis avec une Lancette bien tranchante fendre la Cornée transparente un peu au-dessous du milieu de la Prunelle , & continuer l'incision transversalement d'un côté à l'autre , en sorte qu'il ne reste pas plus d'une demie ligne de la Cornée transparente de chaque côté qui ne soit fendue. On introduira pour lors par l'ouverture que l'on a faite une Curette fine que l'on passera derriere le Corps du Cristallin , au moyen de laquelle on le fera sortir par l'incision faite à la Cornée. On appliquera ensuite

sur l'Oeil du Malade une Compresse trempée dans un Défensif , & on continuera à panser l'Oeil comme dans la vraie Cataracte ; après quoi on couchera le Malade dans son Lit sur le Dos la Tête peu élevée. Dès le lendemain on trouve la Playe cicatrisée par une Raye qui n'est pas plus apparente qu'un Cheveu. Quoique j'aie fait plusieurs de ces Opérations , je me contenterai d'en rapporter trois exemples ; savoir un de chaque espèce de Cataracte , qui se loge dans la Chambre antérieure de l'Oeil.

Le premier fut en 1707 , en présence de Mr. Mery , de l'Academie Royale des Sciences , à un Marchand de la Ville de Sedan , lequel vint à Paris à l'occasion d'une Cataracte branlante qui avoit passé par le Trou de la Prunelle dans la Chambre antérieure de l'Humeur Aqueuse. La Cataracte pressoit tellement l'Iris , qu'elle causoit au Malade une douleur de Tête très considérable , avec une Insomnie qui lui duroit depuis trois Mois. Je n'avois jamais entendu parler d'une semblable Opération ; mais faisant réflexion que j'ouvrais bien la Cornée , pour vider la matiere d'un Abscess qui se trouve derrière , je tirai la conséquence que je pouvois le faire également pour un Corps solide , & j'operai de même. Ce Corps

238 TRAITÉ DES MALADIES

étant tiré de l'Oeil ressembloit entièrement à du Plâtre. Je fis ensuite coucher le Malade sur le Dos. Le lendemain je m'y rendis avec Mr. Mery , & nous trouvâmes que le Malade avoit bien dormi , ce qu'il n'avoit pas fait depuis longtemps , que la Playe étoit cicatrisée , & l'Humeur Aqueuse , qui s'étoit écoulée par l'Opération , entièrement réparée.

La seconde Observation fut faite en 1708 par Mr. Petit fameux Chirurgien , & à présent Membre de l'Academie Royale des Sciences , à un Prêtre dont le Cristallin dans un effort qu'il fit quelques années après s'être fait abbattre une Cataracte , passa par le Trou de la Prunelle , & se logea entre l'Iris & la Cornée transparente. Mr. Petit , entre les mains duquel étoit ce Prêtre , me fit avertir pour être présent à l'Opération à laquelle Mr. Mery se trouva aussi. Mr. Petit ayant percé la Cornée avec une Aiguille , la fendit avec une Lancette , tira le Corps par cette ouverture , & nous trouvâmes que c'étoit le Cristallin. Ce Prêtre fut ensuite bien-tôt guéri. Je l'ai rencontré dans Paris plus d'une année après cette Opération , & je l'ai vu lire parfaitement bien avec une Lunette à Cataracte. Ce fait rapporté à l'Academie des Sciences n'a pas laissé d'être

contesté par Mr. de Woolhouse , qui a prétendu dans un de ses Ecrits , qu'on avoit fait disparoître cet Ecclésiastique pour ne pas être vû & examiné de lui. Il me pardonnera de le citer ici ; car je dois rendre justice à la vérité , comme ayant été un des Témoins de cette Opération , que Mr. Mery a fait inferer aussi-bien que la précédente dans les Memoires de l'Academie Royale des Sciences des années nommées.

Ma troisième Expérience fut en 1716 , à un pauvre Homme qui demeuroit au Fauxbourg S. Germain , Rue Cassette. Il fut blessé à l'Oeil ; le Cristallin se détacha , & passa par le Trou de la Prunelle , entre l'Iris & la Cornée transparente. Ayant fait l'ouverture de la Cornée transparente , je tirai ce Corps qui étoit en partie glaireux , & en partie pierreux , & devenu adhérent à la Cornée. L'adhérence détruite , je tirai le Cristallin qui tenoit à une des Fibres ciliaires assez longue , laquelle je coupai le plus avant qu'il me fut possible avec les Ciseaux. L'Opération réussit parfaitement bien , & le Malade guérit en peu de tems.



C H A P I T R E X X I I.

*De la manière de surmonter les accidens
qui arrivent dans l'Opération de la
Cataracte.*

IL ne faut pas croire que cette Opération se fasse toujours sans qu'il arrive des inconveniens, soit par la difficulté d'abbatre la Cataracte, soit à cause de certains mouvemens que les Malades se donnent aux Yeux, pendant que l'Opérateur travaille. Il est vrai qu'il y a des Opérations où pour peu qu'on touche le Corps de la Cataracte avec le plat de l'Aiguille, elle se détache & tombe presque d'elle-même, comme une Noisette bien mure qui se sépare aisément de son Calice : mais il y en a aussi qui sont sujettes à plusieurs grandes difficultés.

La première est d'éviter l'épanchement de Sang ; car en introduisant l'Aiguille, on peut ouvrir quelques-uns des Vaisseaux qui rampent dessus la Conjonctive. Ce Sang se glisse dans la Chambre antérieure, où se mêlant avec l'Humeur Aqueuse, la trouble, & ôte par-là à l'Opérateur la facilité d'agir.

Lorsque cet accident arrive, il faut
travailler

travailler promptement , afin d'abbattre le Corps de la Cataracte , avant que le Sang ait rempli toute cette Chambre ; auquel cas on fera obligé de retirer l'Aiguille sans opérer pour ne point risquer de gâter l'Oeil du Malade , en travaillant sans y voir.

Une seconde difficulté est , lorsqu'on trouve une Cataracte laiteuse ou caseuse au travers de laquelle l'Aiguille passe aisément , & divise le Corps de la Cataracte en plusieurs parties de différente consistance. Si ces parties ont assez de solidité , on ne laisse pas que de les abattre à force de les agiter avec l'Aiguille , en appuyant légèrement dessus ; mais si elles sont trop molles , on est obligé d'abandonner l'Opération , & de ne pas s'opiniâtrer , de crainte de trop fatiguer l'Oeil , & de causer d'autres accidens. Cette seconde difficulté se rencontre toujours lorsque les Cataractes ne sont point mures.

J'ai abbatu des Cararactes de vingt-cinq ans avec succès. Cela prouve le grand tort de certains Oculistes , qui pour engager les Malades à faire leurs Opérations avant leur maturité , leur disent , que s'ils attendent plus long-tems , la Cataracte deviendra adhérente , & ne pourra plus s'abbattre ; mauvaise préven-

tion qui a fait manquer l'Opération à bien des Malades.

Une troisième difficulté est , lorsqu'en abattant la Cataracte , on trouve que ce n'est qu'une Poche remplie de Pus , aussi-tôt que l'Aiguille a appuyé dessus , cette Poche s'ouvre & repand dans l'Humeur Aqueuse une matière blanchâtre , qui la trouble , & empêche de voir la Membrane qui enveloppoit cette matière , & par conséquent d'achever l'Opération. Il faut néanmoins donner à l'Aiguille les mêmes mouvemens que l'on donneroit , si l'on abbattoit une Cataracte , afin de placer , s'il est possible , la Poche au-dessous de la Prunelle ; quoique les Malades ne voyent pas clair , on retire l'Aiguille , la portion la plus solide de cette matière tombe au bas de l'Oeil , celle qui est plus liquide reproduit une espèce de Membrane qui s'attache autour de la circonférence postérieure de l'Iris , vers l'endroit où l'Iris s'unit à la Choroïde ; six semaines , ou deux Mois après , on y fait une seconde Opération pour l'abatre , & alors les Malades peuvent revoir.

J'ai fait deux Opérations semblables aux deux Yeux du Pere Saunier , Chanoine Regulier de Sainte Genevieve. La première fut à un Oeil en 1713 , quelques jours après Paques , dans lequel

j'abbattis la Poche qui enveloppoit une matière purulente. Il se répandit dans l'Humeur Aqueuse une liqueur blanchâtre abondante , qui la troubloit , mais qui ne m'empêcha pas de baisser le Corps solide qui l'enveloppoit ; cette matière purulente se corporifia , & forma une espèce de Membrane fine comme un Calpin ; six semaines après , j'y reportai l'Aiguille , & le Malade vit parfaitement bien par cette seconde Opération.

Je lui fis la deuxieme en 1715 , parce qu'ayant eu déjà cet accident , je me flattois qu'en retardant mon Opération de deux ans , la Cataracte acquereroit plus de solidité. Cependant en operant il m'arriva la même chose & je fus aussi obligé de reporter l'Aiguille une seconde fois , ce qui me réussit encore parfaitement bien.

On doit juger par ce que nous venons de dire , qu'en retardant l'Opération dans cette espèce de Cataracte , on ne doit point attendre une maturité assez parfaite pour y réussir. Dès la première fois il se fait une espèce de Membrane du Corps fluide qui s'est répandu dans l'Humeur Aqueuse , que l'on est obligé de rabattre environ six semaines après.

Une quatrieme difficulté est , lorsqu'en abbattant la Cataracte , elle entre dans

la Chambre antérieure de l'Oeil , & passe par le Trou de la Prunelle , comme il m'est arrivé à une Femme de la Rue St. Honoré en présence de Mr. Petit. Dès que j'eus appuyé l'Aiguille sur la Cataracte , il se répandit une matiere glaireuse dans l'Humeur Aqueuse , laquelle se porta avec beaucoup de rapidité dans la Chambre antérieure de l'Oeil , entre l'Iris & la Cornée transparente. Je ne laissai pas de poursuivre mon Opération autant que je le pus , sans qu'il me fut possible de retirer ce qui s'étoit coulé dans la Chambre antérieure de l'Oeil ; de sorte que je fus obligé de retirer l'Aiguille. Quelques mois après , tout ce qui s'étoit porté entre l'Iris & la Cornée transparente rentra par le Trou de la Prunelle dans la Chambre postérieure. Enfin quelque tems après , tout ce fluide se précipita au bas de la partie postérieure de l'Iris , & aussi-tôt la Malade vit clair , ce qu'elle n'avoit pas fait immédiatement après l'Opération.

Lorsqu'on fait cette Opération & que ce qui se porte par le Trou de la Prunelle dans la Chambre antérieure a assez de solidité , il faut pousser la pointe de l'Aiguille que l'on a dans l'Oeil , par le milieu du Trou de la Prunelle , sans toucher à l'Iris , piquer ensuite ce Corps

de Cataracte , & le rapporter dans la Chambre postérieure pour le placer à l'endroit ordinaire.

Il se rencontre une cinquième difficulté , lorsque la Cataracte se trouve attachée par certains Filamens , & qu'en l'abbattant elle remonte aussi - tôt que l'on a relevé l'Aiguille , & se remet en sa place , faisant un Pontlevis. Il faut pour lors retirer un peu l'Aiguille , & la piquer dans le milieu de ce Corps , ensuite le pousser au côté opposé que l'on a piqué. Par ce moyen les Filamens du côté de l'entrée de l'Aiguille se rompent , & on place la Cataracte en bas , de sorte qu'elle ne remonte plus , parce que le peu de Filamens qui restent attachés au côté opposé à ce corps , ne peuvent plus le relever , n'étant point assez forts pour résister à la pesanteur de la Cataracte qui les tire en bas.

Le cas que je viens de rapporter , arrive souvent dans cette Opération. En appuyant l'Aiguille sur la Cataracte , les Filamens qui la tiennent attachée en sa partie supérieure cassent facilement. Mais ceux qui sont aux deux côtés prêtent & obéissent , de sorte que l'Aiguille n'appuyant pas sur la Cataracte , elle remonte par ces Filamens de deux côtés qui n'avoient fait d'abord que plier.

C'est pourquoi en piquant , comme j'ai dit , dans le Corps de la Cataracte , on la pousse le plus loin que l'on peut au côté opposé , ensuite on la retire en bas , on la ramene du côté de la piquure , non pas en retirant l'Aiguille , mais en relevant le Manche , afin que la pointe qui est dans le Corps de la Cataracte la rapproche au-dessous de la Prunelle , où l'on a dessein de la placer.

Il arrive quelquefois qu'en relevant l'Aiguille , le Corps de la Cataracte tient à sa pointe. Pour lors on tient la pointe panchée en bas , on leve un peu les deux Doigts qui posent sur la Tempe , & on frappe adroitement un petit coup de ces deux Doigts sur la Tempe. Cela cause un ébranlement ou tremoussement à l'Aiguille qui fait que le Corps qui y tient tombe de lui-même en abandonnant sa pointe.

Il faut remarquer que tout ce qui tient ainsi la Cataracte attachée & la rend si difficile à abbattre , ce sont quelques Fibres ciliaires qui sont adhérentes à l'Iris , & à la Membrane qui recouvre le Cristallin. C'est ce que Mr. Antoine appelle accompagnemens de la Cataracte.

Pour ce qui est de briser la Cataracte , & de la hacher avec l'Aiguille , comme quelques Modernes se vantent de faire ,

cette Methode est pernicieuse , & on ne doit jamais s'en servir à moins qu'on ne se soit trompé sur la maturité de la Cataracte.

On voit bien par ce que je viens de dire , que cette Opération n'est pas aisée , qu'elle demande une main sure , légère , & un Opérateur qui se possède , attentif non seulement à abbattre la Cataracte , mais encore à manier l'Aiguille selon les differens incidens qui se rencontrent ; car de vingt Cataractes que l'on abbat , il ne s'en trouve pas deux tout-à-fait semblables.

Il faut aussi prendre garde lorsque l'Aiguille est dans l'Oeil , de ne pas la tirail-ler en devant , parce que ce mouvement fatigue les parties du fond de l'Oeil , d'où il résulte des Fluxions terribles. C'est pourquoi l'Opérateur doit être attentif aux differens mouvemens que les Malades donnent quelquefois à leurs Yeux , afin qu'il gouverne son Aiguille suivant ces mouvemens , sans quoi il lui peut arriver de piquer l'Iris , d'en couper les Fibres qui en font la rondeur , en un mot de gâter & perdre l'Oeil du Malade.

Ceux qui n'admettent que des Cataractes membraneuses , disent qu'il est d'une grande conséquence de savoir po-

sivement le siège de la Cataracte ; & ils ajoutent que ceux qui sont d'une opinion contraire attaquent le Cristallin sain , lorsqu'ils introduisent l'Aiguille pour faire l'Opération , & que par conséquent ils courent risque de faire perdre la Vue au Malade.

A cela je réponds premièrement , qu'il se rencontre très rarement des Cataractes membraneuses , & que de cent qu'on abbat , à peine en trouve-t-on une ou deux , où le Cristallin ne soit pas altéré , en second lieu , de la manière que j'ai dit qu'il faut introduire l'Aiguille dans l'Oeil , il est impossible de piquer le Cristallin , s'il n'est point altéré , ni d'endommager l'Humeur Vitrée , ni par conséquent de faire aucun tort à l'Oeil ; puisqu'on introduit l'Aiguille sur les Aponevroses des Muscles à très-peu de distance de la Cornée transparente ; & que d'abord qu'elle a percé les Membranes , on tourne le Manche de l'Aiguille vers le petit Angle ; par ce moyen , la pointe de l'Aiguille est portée directement derrière la Cataracte , sans aller du côté du Cristallin , s'il n'est point altéré ; ainsi je conclus , que soit que la Cataracte soit membraneuse ou non , il n'importe pour l'Opérateur , lorsqu'il dirige son Aiguille , comme je l'ai marqué ci-de-

vant , n'y ayant aucun risque à courir pour l'Oeil , comme le prétendent ceux qui n'admettent que les Cataractes membraneuses.


Après avoir expliqué tous les accidens qui arrivent pendant l'Opération de la Cataracte , il faut que je dise encore un mot de celles qui sont sujettes à devenir membraneuses. J'en trouve de trois sortes qui sont des Laiteuses , des Caséeuses , & des Purulentes.

Dans la Cataracte laiteuse il y a un Corps en partie solide , & en partie fluide. Par l'Opération on abbat aisément le premier , mais l'Aiguille passe toujours au travers du fluide , lequel forme souvent de nouveau une pellicule que l'on est obligé de rabattre une seconde fois , lorsqu'elle a acquis assez de solidité.

La Cataracte caséeuse a ses parties plus solides , ce qui rend l'Opération plus heureuse que de la précédente ; mais l'une & l'autre sont des Fruits qui ne sont pas murs. Si il reste du fluide qui n'obéisse point à l'Aiguille , il fera encore naître une Membrane comme la précédente.

On appelle la troisième espece Cataracte purulente , parce qu'en appuyant l'Aiguille dessus , comme j'ai déjà dit , pour l'abattre , il se répand une quan-

tité considérable de matiere purulente dans l'Humeur Aqueuse qui a la couleur jaune ou blanchâtre , & dans la Tunique , on n'y trouve plus le Cristallin. Cette Cataracte ne meurit jamais.



CHAPITRE XXIII.

Des moyens de remedier aux accidens qui suivent l'Opération de la Cataracte.

LE premier accident qui suit l'Opération de la Cataracte est l'épanchement de Sang , lorsqu'en introduisant l'Aiguille on pique quelques Vaisseaux sanguins des Membranes de l'Oeil. Ce Sang coule & séjourne dans la Chambre antérieure , où il trouble l'Humeur Aqueuse. Pour le résoudre promptement , il faut saigner un Pigeon sous l'Aile , & faire tomber quelques gouttes de son Sang dans l'Oeil operé , ce que l'on continue pendant trois jours soir & matin , ayant soin de panser l'Oeil avec l'Eau & l'Esprit-de-Vin ; en y mouillant aussi les Compressees qu'on applique dessus , comme j'ai dit ci-devant. Je préfère ce mélange d'Eau & d'Esprit-de-Vin au Collire fait d'Eau de Rose , de Plantin , de blanc d'Oeuf & d'Alun , parce que les Compressees trempée dans cette der-

niere liqueur se durcissent , & fatiguent l'Oeil , au lieu qu'avec la première elles sont toujours mollette.

Le second accident est le Larmoyement ou abondance de sérosités que la Glande lacrimale fournit dans l'Oeil après l'Opération. Cet accident est plus ou moins dangereux suivant la nature de la sérosité ; car si elle est âcre , elle cause une Fluxion qui devient quelquefois très violente & est suivie de douleurs cruelles dans la Tête , du côté que l'on a operé , qui semblent se fixer à la Dure-Mere , par l'endroit que les Malades désignent , à savoir tout le long de la partie intérieure de l'Os parietal , commençant vers la Suture coronale.

J'ai long-tems cherché quelle pouvoit être la Cause d'une douleur si vive à cet endroit , & je n'en ai pas trouvé de plus apparente que la continuité des Nerfs de l'Oeil aux parties que je viens de nommer , par laquelle l'inflammation se communique jusqu'aux Membranes ci-dessus. La preuve que j'en puis rapporter , c'est que ces mêmes accidens arrivent dans les Opthalmies violentes ; d'où je conclus que ce n'est pas le défaut de l'Opération , comme plusieurs le prétendent , supposans que l'on ait piqué avec l'Aiguille quelques Fibres.

nerveuses qui causent ces douleurs. Si cela étoit , cet accident ne devroit pas arriver dans d'autres Fluxions qui ne sont pas excitées aux Yeux par l'Opération , ni autre occasion de piquure.

Lorsqu'à cet accident se joint un battement dans l'Oeil , comme la pulsation d'un Artère , c'est une preuve certaine que la Playe de la piquure suppure en dedans , au lieu de suppurer en dehors de l'Oeil. Alors la Conjonctive & la Membrane commune avec la Paupiere se tumesce , & s'avance entre les deux Paupieres de la grosseur quelquefois du petit doigt. Si cette élévation est pâle , ce n'est qu'une serosité qui la cause ; & il est facile de la faire cesser par plusieurs Scarifications avec la Lancette. Si le bouffoufflement est rouge , c'est un engorgement dans les Vaisseaux sanguins qui fait suppuration dans l'interstice des Membranes du Globe , & qui s'écoule ensuite entre l'Iris & la Cornée transparente. Mais comme j'ai parlé de ce cas dans le Chapitre où j'ai traité de l'Ophthalmie qui abcède dans l'Oeil , je me contenterai de dire ici ce qu'il y a à faire pour remédier à l'accident dont il s'agit.

Aussi-tôt que l'on voit le Larmoyement , il faut saigner le Malade du Bras

de la Gorge , ou du Pied s'il est besoin , appliquer des Sangsues autour de l'Oeil & à la Tempe , mettre l'Emplâtre vésicatoire à la Nuque du Col , & faire le tout le plus promptement , afin de prévenir la suppuration & la perte de l'Oeil.

Le troisième des accidens qui surviennent à l'Oeil après l'Opération , est lorsque la Fluxion est longue , les Cils de la Paupiere inférieure se renversent en dedans , à cause que blessant les Yeux des Malades , ils sont fort long-tems sans les ouvrir , ce qui fait que la peau de la paupiere se relache & donne lieu au Cartilage de se retourner en dedans. Alors il s'y fait la maladie appelée Trichiaïse , qui n'est autre chose que le renversement du Cartilage de cette Paupiere en dedans , d'où il arrive que les Cils portent leur extrémité sur la Conjonctive , & même sur la Cornée transparente. Le frottement continuel de ces Cils occasionne des Fluxions & des Ulceres de longue durée à ces Membranes , si on n'y remédie par les moyens suivans. Je me contenterai d'en rapporter un exemple.

Mr. de St. Leon , Major à Bouchain , s'est adressé à moi au Mois de Juillet 1718 , après s'être fait abattre une Cataracte au mois d'Octobre 1717. Il avoit

154 TRAITÉ DES MALADIÈS

sur son Oeil une Fluxion violente avec Ulceres , & il ressentait de grandes douleurs dans le haut de la Tête , au dessus de l'Oeil , & à la Tempe du côté qu'on lui avoit fait l'Opération.

Je commençai d'abord par le faire saigner. Je lui appliquai ensuite à la Nuque du Col le Cautère potentiel écrasé , & en suffisante quantité pour faire une Escarre de la grandeur d'un Ecu , dont j'entretins l'Ulceres pendant deux mois ; & comme c'étoit un Homme fort échauffé , je lui fis prendre pendant dix-huit jours les Eaux minerales de Passy ; je lui fis l'Opération de la Trichiaïse dont j'ai parlé en traitant de cette Maladie , après quoi les Cils des Paupieres ne blessant plus , la Fluxion & les douleurs de Tête cessèrent ; enfin il fut si bien guéri en deux mois de tems , qu'il revit de son Oeil , ce qu'il n'avoit pas fait depuis dix mois.

Le quatrième accident est , lorsque la Cataracte étant abbattue , elle remonte ou toute entière , ou en partie. Dans le premier cas , si elle étoit bien mure quand on l'a abbattue , elle redescend d'elle-même ; mais si c'est seulement une portion de la Cataracte qui avoit de la fluidité , elle s'attache à la partie postérieure de l'Iris , & ne descend que par une seconde Opération.

Quelquefois il ne remonte rien de la Cataracte , mais il arrive souvent que les Malades voient bien d'abord après l'Opération , la Vue se continue de même , jusqu'au douzième ou quinzième jour ; ensuite elle diminue , & les Malades se plaignent de voir des Filamens passer devant leurs Yeux ; la raison est , qu'en abbatant la Cataracte , elle s'est séparée au milieu , où à l'extrémité des Fibres ciliaires , du côté qu'elles se joignent à la Membrane du Cristallin ; alors ces Fibres demeurant attachées à la grande circonférence de l'Iris , d'où elles prennent naissance , & venant à se rassembler derrière le Trou de la Prunelle , font entrevoir au Malade des espèces de Filamens , ce qui diminue en partie sa Vue , & l'empêche de voir aussi bien qu'il devrait faire après l'Opération de la Cataracte. L'Opérateur ne s'en étant pas aperçu d'abord , croit son Opération bien faite , comme elle l'est aussi pour ce qui le regarde.

Dans tous ces cas , où il est resté quelque portion de Cataracte derrière la Prunelle ; si la Vue en est trop affoiblie , on est obligé d'y reporter l'Aiguille , & de rabattre ce Corps. Cette seconde Opération est beaucoup plus pénible & plus douloureuse que la première , at-

tendu que la Pellicule formée de la portion restante de la Cataracte est attachée derrière l'Iris, quelquefois par deux ou trois Filamens qu'il faut détruire. C'est en cela qu'il faut de l'adresse, parce que ces attaches plient, prêtent & cedent ordinairement à l'Aiguille; de sorte qu'aussi-tôt qu'on relève l'Aiguille, la Pellicule remonte & se remet au même endroit où elle étoit. On est obligé souvent de la pousser avec l'Aiguille par le Trou de la Prunelle, jusques dans la Chambre antérieure pour la piquer, & la rapporter ensuite dans la postérieure, la poussant du côté du grand Angle. On fait enfin les mêmes mouvemens de l'Aiguille dont j'ai déjà parlé au sujet de la Cataracte qui fait le Pont-levis.

Le cinquième accident qui peut arriver après l'Opération est incurable, parce que la Vue est perdue; c'est lorsqu'il survient une Fluxion qui se porte sur le Nerf optique, & sur les Membranes internes de l'Oeil, alors ces parties se desechent, & se flétrissent, ce que l'on connoît par le retrecissement de la Prunelle, & parce que les Malades ne voyent plus la Lumiere.



CHAPITRE XXIV.

Des Abscès superficiel du Cristallin.

CETTE Maladie commence par des accidens semblables à ceux qui arrivent dans la Cataracte , en ce que les Malades croient voir un Nuage & une Ombre qui paroît dans l'air. Il se plaignent aussi d'une diminution de Vue de cet Oeil , de pesanteur douloureuse dans le Globe ; en regardant par le Trou de la Prunelle , on voit le Cristallin blanchâtre dans une portion de sa partie antérieure.

La matiere qui forme cet abcès superficiel , n'occupe guère plus de volume , que de deux têtes d'Epingle ; lorsqu'il est dans une parfaite maturité , le pus se vuide & s'épanche dans l'Humeur Aqueuse , & se précipite ensuite au bas de l'Oeil. Il se fait dans l'endroit de l'abcès une Cicatrice qui est de la grosseur de la tête d'une petite Epingle qui y demeure toute la vie , & fait que les Malades qui ont été une fois atteints de cette Maladie , voient toujours une Ombre dans l'air modifiée selon la forme de la Cicatrice.

J'ai remarqué que cette Maladie arri-

ve principalement à ceux qui se sont appliqués trop long-tems à regarder l'Eclipse du soleil , ou des Objets trop brillans. Cette Maladie est de si petite conséquence , qu'elle se guérit ordinairement , sans que le Malade soit obligé d'avoir recours à aucun remede , sinon à quelques Eaux convenables.



CHAPITRE XXV.

Des Maladies de la Retine.

JAI remarqué deux sortes de Maladies qui arrivent à la Retine. La première est la séparation , & le détachement de quelque portion de cette Membrane d'avec la Choroïde ; d'où il se forme dans l'endroit de cette séparation , une élévation ou replis qui arrête la Lumière , & ne lui permet point de passer jusques sur l'endroit de la Choroïde que ce replis recouvre ; ce qui fait comme un Ombre que les Malades voient dans l'air. La seconde est l'Atrophie de cette Membrane , dont on parlera dans le Chapitre suivant.

Il y a lieu de croire que la première de ces Maladies n'est occasionnée que par les Vaisseaux sanguins de la Retine qui sont devenus variqueux. En effet ,

il est aisé de juger que la dilatation de ces Vaisseaux peut occasionner la séparation de la Retine d'avec la Choroïde, dans l'endroit qui repond à ces vaisseaux dilatés.

J'ai toujours remarqué que cette Maladie est occasionnée par un froid à la Tête après un exercice violent, ou après quelqu'autre cause qui a mis le Sang en mouvement; d'où je conclus que le froid extérieur qui a frappé les pores de la peau a empêché la transpiration de certaine portion des liqueurs rarefiées dans les Vaisseaux sanguins, qui sont repandus dans la substance de la Retine, qui par délicatesse s'en est trouvée endommagée de la manière que je viens de dire. J'appelle cette Maladie un détachement de la Retine, d'avec la Choroïde; comme cette Membrane occupe assez d'étendue dans l'Oeil, ce détachement se fait souvent en plusieurs endroits; c'est pourquoi ses Signes sont multipliés selon la quantité de ces endroits séparés.

Ces Signes sont certains Objets, ou apparences que les Malades voyent en l'air plus ou moins éloignés de leurs Yeux, qui sont des espèces d'Ombres de différentes figures, modifiées selon la portion de la partie de la Retine qui est détachée.

Quant au Pronostic , le mal n'est aucunement dangereux pour la perte de la Vue ; il n'est qu'incommode & inquiétant pour les Malades. Cette Maladie ayant dans son origine les mêmes Signes que la Cataracte , on pourroit prendre l'une de ces indispositions pour l'autre ; mais afin que l'on ne s'y trompe point , il faut montrer la différence , qui est que dans la Cataracte , la Vue s'accourcit & se trouble de jour en jour : au lieu que dans la Maladie dont je parle , la Vue subsiste , tant dans sa finesse , que dans sa longueur.

Quoique cette Maladie ne soit point parfaitement guérissable par les Remèdes , & que les Personnes qui en sont une fois attaquées , voyent toute leur vie quelqueune de ces Ombres , on ne laisse pas d'en diminuer le nombre , & d'effacer une partie de leur largeur ; pour cet effet , on se sert de bouillons avec les Ecrevisses , de Purgatifs réitérez , d'Eufraise prise le matin en manière de Thé , des poudres de Vipères , de Cloportes & d'Eufraise mêlés ensemble.





CHAPITRE XXVI.

De l'Atrophie de la Retine.

LA Retine atrophiee ou flêtrie , fait que les Rayons de Lumière ne recevant point la modification suffisante dans cette Membrane , blessent par leur vivacité la Choroïde ; d'où il arrive une confusion dans la Vision , enforte que les Malades dans le premier coup d'Oeil , voyent parfaitement bien ; mais s'ils se tiennent un peu de tems à lire , ou à regarder quelque Objet brillant , il leur prend sur le champ une fatigue dans la Tête , & un trouble dans la Vue , qui les obligent de fermer les Yeux ; & un moment après en les rouvrant , ils voyent comme au premier coup d'Oeil , quoique pour peu de tems.

Ceux qui travaillent à la Broderie , à faire des Bas au Metier , & les Cordonniers sont sujets à cette Maladie. Les premiers , parce que le brillant de l'Or , de l'Argent & des autres couleurs par leur vivacité , fatiguent & offensent les parties de la Vue ; & les Cordonniers qui sont obligés de chercher le Trou fait avec l'Alene pour passer leur Fil , par cette attention continuelle , fatiguent

quelquefois leur Vue de telle sorte , qu'ils sont contraints de quitter leur Metier. Toutes ces Personnes ne peuvent travailler que peu de jours dans la semaine.

Il y en a qui ne sont pas obligés de travailler comme les Ouvriers , & qui ne peuvent cependant se servir un quart d'heure de leur Vue , sans avoir la Tête fatiguée , & c'est de ceux-là principalement dont je parle ici.

Les Remèdes ne guérissent point cette sorte de Maladie , il n'y a que le repos & le peu d'exercice de la Vue.

Il faut que toutes ces sortes de Personnes qui travaillent à des Ouvrages fins & brillans , s'ils veulent continuer , se servent de Conserves vertes , & de Lunettes.



CHAPITRE XXVII.

De la goutte sereine parfaite.

ON appelle Goutte sereine un Aveuglement total qui provient d'une Paralysie des parties principales de l'Organe immédiat de la Vision.

Quelque partie du corps que la Paralysie attaque , elle a des degrés différens qui la rendent parfaite ou imparfaite. Il en est de même de la Goutte sereine

qui fait perir entièrement la Vue , ou du moins elle en laisse si peu , que les Malades n'en sauroient faire un grand usage. Je serai obligé pour plus de netteté de faire deux Chapitres de cette Maladie ; dans le premier , je ne parlerai que de la Goutte sereine , où la Vue est entièrement perdue , & je traiterai dans le second de celle où il n'en reste qu'une partie.

Il y a plusieurs Causes capables de produire la Goutte sereine ; la première est l'Apoplexie légère , dont l'Humeur , au lieu de se jeter sur les Nerfs des autres parties du Corps , se porte seulement sur les Nerfs visuels qu'elle obstrue & rend paralitiques.

Les autres Causes de cette Maladie dependent de quelqu'autre Humeur , qui s'infiltré dans ces Nerfs , ou qui tombe simplement dessus , & les comprime , ce qui empêche leur action. Ainsi soit que ces Nerfs soient obstrués , ou comprimés par du Sang , du Pus , ou de la Pituïte ; toutes ces différentes matières peuvent causer une Goutte sereine.

Si le Sang devient trop salé , il y produit peu à peu cette Maladie par sa fâcheuse , qui flétrit & dessèche les parties principales de la Vision , en les desséchant , pour ainsi dire , comme de la

Viande qu'on auroit salée , d'où la Vue se perd entièrement.

Nous voyons souvent des Gouttes sereines succeder à des Fievres aiguës par le transport qui se fait dans les Nerfs visuels de l'Humeur qui les causoit. Une Fievre violente qui fait une trop grande rarefaction du Sang dans les vaisseaux voisins de ces mêmes Nerfs , produit aussi quelquefois un semblable effet ; lorsqu'une Humeur vérolique se porte sur les Nerfs visuels , où elle cause des douleurs & insomnies , il en résulte souvent une Goutte sereine.

Cette Maladie commence ordinairement par des douleurs profondes dans la Tête , & à mesure qu'elles cessent , la Maladie augmente ; cependant il est arrivé à bien des Personnes de se trouver aveugles tout d'un coup , sans avoir ressenti de douleur. Dans plusieurs autres la douleur a accompagné la Maladie qui se formoit peu à peu ; de sorte que la Vue perit insensiblement , en diminuant de jour en jour.

Lorsque la Goutte sereine est arrivée sans douleur , & qu'il n'y a qu'un Oeil qui en soit affligé , on n'y connoît rien en regardant les Yeux pendant qu'ils sont tous les deux ouverts ; mais en fermant l'Oeil sain , on remarque que la
Prunelle

Prunelle de celui qui est malade se dilate , quoiqu'exposé à la lumière , & demeure en cet état , jusqu'à ce qu'on ouvre l'Oeil sain ; alors la Prunelle de l'Oeil malade qui étoit dilatée , se retrecit comme celle du bon , dont elle emprunte le mouvement. On connoît par ce seul Signe qu'il n'y a plus du tout de Vue dans l'Oeil malade ; & ce Signe est si particulier à cette Maladie , qu'il ne se trouve point dans le Glaucome , où la Prunelle demeure toujours dans la même dilatation.

Il se trouve aussi une autre espèce de Goutte sereine , dans laquelle la Prunelle est toujours retrecie , soit qu'on ouvre l'Oeil sain , ou qu'on le ferme , comme nous avons dit dans le Chapitre de la Vision.

Les Signes de la Goutte sereine sont visibles par l'inspection des Yeux , soit que la Prunelle soit dilatée , ou qu'elle soit retrecie.

Comme parmi les Muscles du Corps il s'en trouve que l'on nomme Antagonistes qui font des actions opposées , comme de fléchir & d'étendre , &c. Il en est de même des Fibres motrices de l'Iris , dont les unes servent à la dilater , & les autres à la retrecir. Or dans la Goutte sereine parfaite , la Prunelle se

trouvant dilatée , ce sont les Fibres qui devroient faire la constriction , qui sont paralitiques d'une maniere très particulière , comme je viens d'insinuer. Si au contraire elle est retrecie , ce sont celles qui servent à la dilatation , qui sont infirmes. Dans l'une & l'autre de ces indispositions la Vue est perdue.

La Goutte sereine a passé jusqu'à présent pour être incurable ; cependant j'ai des experiences contraires ; & j'ai observé plusieurs fois que celle-là est principalement incurable , qui suit une Fievre aigue , dont l'Humeur qui la cauçoit se dépose sur les Nerfs visuels. Si l'Humeur n'attaque qu'un des Yeux , Il est à craindre que la Fievre reprenant dans l'année , le même mal n'arrive à l'autre Oeil. J'ai vu ce cas arriver encore à tous ceux à qui la Goutte sereine commence par une légère Inflammation , accompagnée de douleurs dans la Tête , du côté de l'Oeil affligé. Cela m'a souvent fait penser en moi-même , quoique je n'aye jamais osé le tenter , qu'en extirpant l'Oeil perdu , on pourroit peut-être empêcher que l'Oeil sain ne tombât dans le même accident. Ce seroit une consolation pour la Personne si elle pouvoit éviter le dépôt de la même Humeur sur l'autre Oeil , qui arrive pres-

que toujours une année ou deux après la perte du premier.

J'ai réussi à la guérison de plusieurs Gouttes sereines , lorsque j'ai traité les Malades , aussi-tôt qu'ils en ont été attaqués , en les faisant saigner du Bras , du Pied & de la Gorge , selon que les Vaisseaux sont trop remplis , & prendre une ou deux fois l'Émetique à deux jours de distance.

Les Remèdes propres pour la Paralysie , conviennent aussi à cette Maladie. On peut appliquer le Séton derrière le Col , ou l'Emplâtre vésicatoire. Je trouve le Cautère trop lent , en ce qu'il donne le tems à l'Humeur qui cause la Goutte sereine , de s'épaissir , & de devenir rebelle aux Remèdes que l'on pourroit faire dans la suite.

Il y a douze ans qu'un Curé de la campagne du Diocèse de Paris me vint consulter peu de jours après une attaque de Goutte sereine sur l'Oeil. Je lui fis prendre l'Émetique dès le premier jour ; le lendemain , il fut saigné de la Gorge ; deux jours après , ayant repris une seconde fois l'Émetique , la Vue commença de revenir à cet Oeil , qui se retablit peu à peu par l'usage de la vapeur d'Esprit de Vin reçu dans l'Oeil.

Outre la Goutte sereine dont nous ve-

nons de parler , il y en a une qui attaque principalement les Filles qui ne sont point réglées , aussi-bien que les Femmes grosses , & quelquefois les Hommes par la suppression d'un Flux hémorroïdal.

Il y a des Auteurs qui attribuent la Cause de cette Maladie à une grosseur demesurée de l'Humeur Vitrée ; & ils prétendent pour le prouver , que le Globe de l'Oeil est plus gros dans ce cas , qu'il ne le doit être naturellement. J'ai fait tout mon possible pour découvrir si en effet cette grosseur en feroit la cause , mais je n'y ai jamais rien remarqué de contraire à son état naturel.

Mon sentiment sur ce mal , est qu'il est causé par quelque Humeur qui tombe sur les Nerfs visuels , & les comprime. Les accidens semblent appuyer mon opinion , en ce que les Malades ressentent une pesanteur accompagnée de douleurs plus ou moins vives , sur la partie postérieure du Globe de l'Oeil ; ce qui marque que les Nerfs visuels souffrent par quelque dépôt d'Humeur , qui se fait sur eux , avant que d'entrer dans l'Oeil. D'ailleurs la Goutte sereine de cette espèce , est plus souvent guérie que la précédente , parce que ce n'est sans doute qu'une simple compression des Nerfs , & non pas la grosseur demesurée de l'Humeur Vitrée.

Les Remedes de cette espece de Goutte sereine , sont les Saignées du Pied , & ceux qui provoquent les ordinaires aux Filles , & le Flux hémorroïdal aux Hommes. Outre cela , pour détourner l'Humeur qui porte aux Yeux , se sert de Cloportes , d'Eufraise , soit en poudre , ou en boillons , des bouillons de Vipere , & on appliquera sur les Yeux une Eau Ophtalmique , & la vapeur du Baume de Fioraventi.

Les Enfans ne sont point exempts de cette maladie , puisqu'on en voit naître d'aveugles. Elle ne se fait point connoître d'abord , mais on s'en apperçoit à mesure qu'ils avancent en âge. J'en ai guéri plusieurs par le simple usage de mon Eau Ophtalmique , entre lesquels il s'en est trouvé qui à l'âge de deux ans , n'avoient pas encore donné des marques de Vue. Il est à remarquer que la Prunelle de ces Enfans , quoiqu'elle n'ait point de mouvement , n'est pas cependant plus dilatée que dans l'état naturel de cet âge ; ce qui fait connoître que cette Maladie n'est qu'une espece d'engourdissement , ou foiblesse des parties principales de l'Organe de la Vision.



CHAPITRE XXVIII.

De la Goutte sereine imparfaite.

J'A P P E L L E Goutte sereine imparfaite, celle dans laquelle les Malades voyent encore , mais imparfaitement. Cette Maladie a plusieurs degrés , selon la quantité des Fibres nerveuses attaquées de Paralysies ; quelquefois ce n'est qu'une espèce d'engourdissement qu'il se fait dans ces Fibres ; quelquefois il arrive que l'on ne voit que la moitié d'un Objet , sans appercevoir l'autre , parce qu'il n'y a qu'une Moitié de l'Oeil qui voit , l'autre moitié étant atteinte de Paralysie. On connoitra facilement le degré de cette Maladie , en faisant regarder la Personne dans un livre , son Oeil sain étant fermé ; car pour lors elle ne voit qu'une certaine portion de la page , au lieu qu'avec l'Oeil sain , elle la voit toute entiere.

Quelquefois les Fibres sont presque toutes abreuvées de l'Humeur qui cause la Paralysie ; c'est pourquoi les Malades apperçoivent seulement la clarté de la lumiere , sans distinguer les Objets. Cette Maladie est souvent produite par ce qu'on appelle Vapeur ; & j'ai vu souvent

des Femmes être privées de la Vue pendant demi-heure , une heure même , & quelquefois deux ou trois jours. Ce dernier cas arrive quelquefois dans les Accouchemens.

Cette Maladie a les mêmes causes que la Goutte sereine parfaite , excepté celle qui provient des Vapeurs ; mais l'Humour n'est pas si abondante , ce qui fait que l'Oeil n'est pas si affecté.

J'ai vu des Personnes affligées de ce mal par une Dartre venue autour des Yeux , que l'on avoit fait rentrer par une pomade ; & que faisant reparoître la Dartre par l'usage des bouillons aperitifs , & des sudorifiques , la Vue est revenue. D'autres en ont été attaqués par un froid subit reçu à la Tête après y avoir eu chaud. Les Signes de la Goutte sereine imparfaite sont assez faciles. On connoitra à quel degré est la Vue , si on examine bien l'Oeil , soit que la Prunelle en soit dilatée ou retrecie ; par exemple , si dans ces deux états , l'Iris a un quart de mouvement , on juge qu'il y a un quart de Vue dans l'Oeil ; si elle a la moitié de son mouvement , il y a la moitié de la Vue.

Sa guérison s'obtient par les Remedes généraux , & les autres proposés dans la Goutte sereine parfaite. On prendra

aussi des bouillons de Vipere ou les Eaux minerales chaudes , si l'on croit que la Maladie soit causée par une matiere épaisse & visqueuse ; si au contraire elle est produite par une matiere âcre & subtile , les Eaux minerales froides y seront plus salutaires.

On se servira deux ou trois fois le jour de la vapeur d'Esprit-de-Vin reçue à l'Oeil , & de celle de l'infusion du Caffé par un entonnoir , comme je l'ai marqué au Chapitre de la Paralysie des Paupieres.

J'ai parfaitement guéri plusieurs Personnes affligées de cette Maladie par ces Remedes. J'en rapporterai une seule experience à cause de sa singularité. Il y a onze ou douze ans , qu'un Chanoine Regulier de Rheims vint à Paris me consulter ; j'apperçus qu'un de ses Yeux étoit attaqué d'une Paralysie imparfaite. Il y avoit une dilatation à la Prunelle , qui n'avoit qu'environ un quart de son mouvement de constriction ; mais je fus très surpris de ce qu'il me dit qu'en regardant dans un livre (l'Oeil sain étant fermé ,) il y voyoit son Oeil malade parfaitement représenté. La première idée que j'eus de ce Chanoine , fut de le croire un Hipocondriaque ; cependant pour m'assurer de la vérité , je le priai

de fermer l'Oeil sain , & de regarder dans un livre , ensuite de quoi je lui demandai ce qu'il voyoit sur la page , il me répondit qu'il appercevoit les lignes , comme des rayes noires , sans distinguer les lettres , & que dans le milieu , il voyoit son Oeil représenté. Je le priaï de me dire puisqu'il assuroit de voir son Oeil , de quelle couleur étoit son Iris , & la disposition de certaines rayes qui le traversent ; il me répondit là dessus si juste , & me les désigna si bien , que je ne les voyois pas mieux moi-même dans son Oeil. Ce jeune Chanoine fut guéri en trente jours par l'usage des Purgatifs , des Bouillons rafraîchissans , & des Remedes spiritueux appliqués sur son Oeil ; en sorte qu'il revit parfaitement bien à lire de cet Oeil , sans en appercevoir la représentation.

Mr. Petit de l'Academie des Sciences , m'a assuré avoir vu la même maladie.



CHAPITRE XXIX.

Sur les manieres de panser les Yeux.

IL n'arrive que trop souvent , que des Remedes appliqués aux Yeux mal à propos , y attirent des accidens si fâ-

cheux , qu'il en résulte quelquefois la perte entière de la Vue. On ne sauroit prendre trop de précaution pour n'y être pas trompé. Les malades ne manquent jamais de Personnes officieuses pour leur conseiller de se servir d'une infinité de Remedes , dont ils ne savent pas l'effet ; & l'envie qu'ils ont de guérir , les porte à les employer , sans savoir s'ils conviennent à l'espèce de Maladie dont ils sont affligés.

Pour remédier aux suites ordinaires de ces pernicioeux conseils , j'en démontrerai toutes les conséquences , après avoir donné en général une manière de panser les Yeux. On s'est presque fait une coutume de bander les Yeux dans la plupart de leurs Maladies ; mais c'est souvent leur faire un très grand tort ; parce qu'étant ainsi couvert , la Vue se rend plus sensible au jour & le mal s'entretient souvent plus long-tems qu'il ne feroit , si on n'y mettoit pas de bandage ; c'est pourquoi quand on peut tenir les Yeux à découvert , sans que les Malades soient beaucoup incommodés de la lumière , ils en reçoivent plus d'avantages , d'autant que l'air qui les touche étant temperé , les rafraichit continuellement. Si au contraire on les tient fermés , il s'amasse un limon entre le

Globe & les Paupieres, qui ne cesse point de fatiguer l'Oeil, ce qui augmentela Maladie.

Il y a des Personnes qui pour nettoyer l'Oeil, lorsqu'il y a abcès, se servent de fausses Tentés, c'est-à-dire des Rouleaux de linge dont le bout est éfilé, pour essuyer le Globe; cette maxime est très pernicieuse; l'irritation que fait le linge est seule capable d'augmenter la Fluxion de cet Oeil, & fait même passer souvent la Maladie sur l'autre. Il ne faut introduire aucune Tente ni Charpi pour essuyer l'Oeil; il suffit de faire tiedir une eau convenable, dans laquelle on trempera un linge ou une Eponge; & en l'exprimant, on tâchera de faire tomber quelques gouttes de la liqueur dans l'Oeil; on lavera aussi les Paupieres en frottant légèrement dessus. Le seul frottement de la Paupiere essuye l'Oeil; & fait sortir tout ce qu'il y a d'étranger sur la surface du Globe. Si l'Oeil étoit trop collé, comme il arrive dans la petite Vérole, on prend une Plume qui ait de la Barbe, on la trempe dans le Collire convenable, & on la passe doucement entre les Cils & le Cartilage des Paupieres, sans trop appuyer sur le Globe de l'Oeil.

Si on est ohligé de mettre quelque Compresse, ou quelque Remede sur les

Yeux , en forme de Cataplasme , il faut bien se garder de trop ferrer le Bandage. Pour éviter cet inconvenient , on fait passer le Bandeau sur les Sourcils , jusqu'au - dessus desquels la Compresse doit porter. On observera encore qu'il suffit de panser les Yeux cinq ou six fois dans la journée , souvent même bien moins , suivant la Maladie , parce que les pansemens trop fréquens les irritent.

Il me reste à dire un mot des Remedes qui étant mal employés , causent souvent plus de dommage aux Yeux que la Maladie même. Si une personne reçoit un coup à l'Oeil , & qu'on y applique un Remede âcre & piquant , il ne manquera pas d'y attirer une Fluxion plus violente par son irritation , que ne l'auroit fait le coup même ; d'autant que le coup a déterminé le Sang & les liqueurs à se porter dans les Vaisseaux fins & délicats de l'Oeil. Si au lieu de les vider par quelques Saignées , ou de résoudre le Sang par des Remedes doux , on y en met au contraire qui l'irritent , il arrivera que le dépôt sera plus violent , & la Maladie plus grande.

Ce que je viens de dire à l'occasion des coups , peut aussi s'appliquer pour toutes les Inflammations des Yeux , qui dépendent le plus souvent du vice de

la Lîmphe qui est devenue trop âcre ; alors les Remedes âcres & cuifans , tels que font les Eaux de Couperose , &c. au-lieu de corriger cette Lîmphe , ne feront qu'augmenter la Maladie. On débite depuis quelque tems à Paris , une Eau , ou Secret , que l'on prétend être souveraine à toutes les Maladies des Yeux , que l'on dit avoir été vendue comme un Remede particulier à S. A. E. Monsieur de Baviere ; cependant j'ai remarqué que l'application de cette Eau dans le commencement des Fluxions , fait souvent un très grand tort aux Yeux des Malades ; je ne m'en suis pas étonné , depuis que l'on m'en a communiqué la composition. Elle se fait avec de l'Eau de pluye amassée pendant la Lune de Mars , sur un demi-septier de cette Eau , on y dissout une certaine quantité de Couperose blanche pour en mettre dans les Yeux ; je rapporte ceci , afin que l'on ne se serve pas de semblables Eaux dans les cas où elles pourroient être nuisibles , d'autant qu'étant beaucoup piquantes , il arrive souvent qu'elles attirent un dépôt sur l'Oeil , qui fait dégénérer en abcès une Fluxion simple , & qui peut même faire perdre la Vue.

J'ai pourtant remarqué , que dans les Fluxions , lorsqu'elles ont duré long-

tems , ces Remedes forts y faisoient bien , & guérissent une Maladie qu'ils auroient augmentée dans le commencement ; ainsi il y a des cas où l'on peut s'en servir , & qui sont hors de la Regle générale.

Je puis rapporter à ces deux cas , toutes les autres Maladies des Yeux en général ; ce qui doit faire connoître que ce n'est pas assez d'avoir un tel Remede , & des eaux propres à ces maux. Il faut connoître en quel tems , & à quel degré du mal il faut s'en servir.

Les Maladies des Yeux dépendent ordinairement d'un vice du Sang , qu'il faut corriger dans sa source ; ce que les Remedes extérieurs ne sauroient faire. Il y a même des cas particuliers , où pour peu que ces remedes soient actifs , les Yeux ne sauroient les supporter sans un très grand danger ; c'est ce qui fait naître tous les jours des accidens sans nombre , par l'ignorance des Personnes qui les conseillent ou qui les donnent , n'ayant pas une expérience suivie de leur propriété , & de l'état de la Maladie où on peut les appliquer.

Il y a aussi telles Maladies des Yeux qui ne cedent à aucun Remede , & que les Malades garderoient toujours , si on n'y faisoit pas des Opérations. Tout ce

que je viens de rapporter est assez sensible , pour faire connoître qu'une personne qui veut traiter les Maladies des Yeux , doit non seulement connoître les Remedes qu'il convient d'appliquer , mais encore ne pas ignorer les moyens de corriger les différentes qualités vicieuses que le Sang & la Lymphes peuvent avoir acquises ; c'est pourquoi elle a besoin des conseils d'un bon & prudent Médecin , pour corriger les différentes altérations du Sang par les Remedes qui y sont convenables. Il faut outre cela avoir la main bonne & sûre , avec les connoissances nécessaires pour les Opérations , lorsqu'il en est besoin.

Lorsqu'il y a une disposition à supuration dans les Membranes du Globe de l'Oeil , il y en a qui appliquent des Cataplasmes anodins avec la mie de Pain , le Lait , &c. Mais ces Remedes accélèrent la supuration & la fonte du Globe ; il faut au contraire se servir des Résolutifs , qui empêchent qu'elle ne se fasse trop abondante ; par-là on conserve encore un peu de Vue après la guérison de l'abcès , autrement il n'y aura point de Vue , si on détermine l'Oeil à une trop abondante supuration.

C'est une pratique très-pernicieuse d'appliquer des Emplâtres sur les Yeux ma-

lades , parce que s'il arrive qu'il y ait trop d'humeur dans la Tête , ils ne manqueront pas de la déterminer aussi-tôt sur les Yeux , d'où il résulte des abcès & perte de la Vue.

Une des Causes qui rendent fort longue la Guérison des maux des Yeux , c'est que les Remedes qu'on applique dedans , n'y fauroient séjourner , étant bien-tôt chassés par les larmes & le mouvement continuel des Paupieres.

Il ne faut rien appliquer aux Yeux qui soit actuellement froid ; car quoiqu'il semble dans les Inflammations que l'on soit d'abord soulagé par les choses froides , elles y sont cependant très-pernicieuses , parce qu'elles ralentissent le mouvement du sang dans les vaisseaux superficiels , & empêchent la transpiration , ce qui augmente le mal. Il faut cependant remarquer que cela ne s'observe point à l'égard des Remedes spiritueux , que l'on ne doit point chauffer , crainte d'alterer leurs qualités. Rien aussi n'est plus pernicieux que les Remedes huileux , puisqu'en bouchant les pores , ils en entretiennent les obstructions.

Il faut en général toujours avoir en vue dans l'usage des Remedes , dont on se sert , qu'ils soient propres à détruire la cause qui a produit la maladie ; ainsi

comme celles des Yeux tirent leur origine , ou d'une trop grande plénitude de Sang , ou de quelque qualité vicieuse qu'il a contractée , il faut en diminuer la quantité par l'usage de la Saignée , ou en corriger les différentes altérations par des Remedes convenables , soit Purgatifs , Vomitifs , ou Sudorifiques , Alterans , Adoucissans , Rafraîchissans , &c. comme nous avons dit.

J'ai remarqué , en traitant de chaque Maladie , les Remedes qui conviennent à leur Guérison , & j'ai choisi entre tous ceux qui pouvoient apporter le moins de dommage aux Yeux ; & les soulager le plus promptement. Lorsque les Maladies ne cedent pas à ces moyens , il y a d'autres Remedes spécifiques qui ne s'appliquent que selon les cas particuliers , & que l'on ne peut point donner comme Remedes généraux. Je me suis servi avec succès de ceux que j'ai donnés pour chaque Maladie.





CHAPITRE XXX.

Des moyens de soulager la Vue par les Lunettes.

J'AI dit en parlant de la Vue en général , qu'il y en avoit de trois sortes ; savoir la bonne Vue , la Presbite & la Miops. Ces trois sortes de Vues sont sujettes à s'affoiblir de différentes manieres. J'entens par foiblesse de Vue , ne plus voir si distinctement les Objets , par exemple , ne pouvoir plus lire. Ces trois sortes de Vues tombent dans cet inconvénient ; la bonne , lorsque les Yeux deviennent humides & larmoians. Cette eau qui les abreuve continuellement fatigue beaucoup la Vue. Il faut que les Personnes à qui cela arrive , aient recours aux Lunettes convexes , d'un degré qui leur convienne pour lire ou travailler ; ce qu'elles ne pourroient bien faire sans ce secours.

Les Presbites ne sauroient lire que difficilement les Caractères menus , ni distinguer les Objets fins , sans que les Yeux , & même la Tête en soient fatigués , quoiqu'ils distinguent bien les gros Objets dans une distance assez éloignée. Cela vient de ce que le Cristallin

se trouvant moins convexe qu'à l'ordinaire , fait que les Rayons réfléchis des Objets proche de l'Oeil , s'écartent trop de l'endroit où ils devroient se réunir pour produire la Vision ; ce qui n'arrive point à l'égard des Objets éloignés , à cause que les Rayons réfléchis de ces Objets étant plus convergens ont un Foyer proportionné. Pour remédier à ce défaut , il faut se servir d'abord de Conserve qui ne grossissent point , pour passer ensuite à l'usage des Lunettes plus convexes , qui raccourcissent davantage le Foyer.

La Vue des Miopes s'accourcit à un point , qu'ils ne sauroient lire , ni distinguer les Objets , sans le secours des Lunettes concaves ; cela procède de ce que le Cristallin est plus vouté qu'à l'ordinaire. La concavité de ces Lunettes doit être d'autant plus considérable , que la Vue est courte.

Il arrive souvent qu'après l'usage des Lunettes pendant plusieurs années , le Cristallin reprend sa forme convenable , de sorte qu'on n'a plus besoin de ce secours. On observe encore que plusieurs Personnes n'étant ni Miopes , ni Presbites , ont été obligées de se servir de Lunettes pendant long-tems , à cause du Larmoyement , & que cette

284 TRAITÉ DES MALADIES
Maladie venant à cesser , elles les ont
abandonnées.



CHAPITRE XXXI.

De la différence des Lunettes.

TOUTES les Lunettes sont pour la plupart , ou concaves , ou convexes. Les unes & les autres ont différens degrés ou Foyers. Il y a outre cela des Lunettes unies & plattes , appelées Conservees. De celles-ci il y en a de deux qualités ; les unes sont de Verre verd , & les autres de Verre blanc. Des convexes , le premier degré grossit très peu & peut servir de Conservees ; les autres grossissent à proportion de leur convexité.

On appelle Foyer dans des Lunettes , l'endroit où les Rayons de lumieres qui passent par la Lunette , se rassemblent sur un Corps opposé à la lumière ; & c'est par la différente distance de ces Foyers , qu'on mesure les degrés des Lunettes.

Il est de grande conséquence de ne se point mettre trop tôt dans l'usage des Lunettes , & y étant une fois accoutumé , de ne point changer trop souvent leurs degrés , parce qu'à la fin on n'en

trouve plus de propres à sa Vue.

Ceux qui ont la Vue Miops , ne doivent se servir de Lunettes concaves , que le moins qu'ils pourront pour lire , encore doivent-ils commencer par les moins concaves.



CHAPITRE XXXII.

Des moyens de s'exempter de l'usage des Lunettes.

IL faut que je dise un mot de la manière de conserver la Vue , & d'éviter de se servir de Lunettes. Par ce moyen beaucoup de Personnes s'en exempteront , quoique cela ne réussisse pas absolument à tout le monde.

Je commencerai par en exclure les Miopes , parce que les Remèdes ne fauroient alonger leur Vue , il n'y a que la bonne Vue & la Presbite , qui puisse ressentir les avantages de ces moyens.

Une humidité abondante dont les Yeux de quelques Personnes se remplissent continuellement , affoiblit comme nous avons dit la bonne Vue ; dans ce cas , je me fers de mon eau Ophthalmique , laquelle étant appliquée trois fois dans la journée, desseche l'humidité & fortifie la Vue. Les Remèdes capables d'évacuer la Pi-

tuite du Cerveau , comme les Purgatifs & la fumée du Tabac , soulagent cette sorte de Vue.

Les Presbites peuvent s'exempter de Lunettes , en remettant le Cristallin dans son état naturel , lorsqu'il commence à changer , en se servant d'une Eau composée avec de la Sauge , du Romarin , de la Lavande & du Thim , dans le tems que ces Herbes sont en fleur , de l'Absinthe & de l'Origan , parties égales de chacune infusées dans l'Eau-de-Vie pendant quarante jours , après lesquels on passe l'Eau-de-Vie à clair , & on s'en sert de la manière suivante. On mêlera une partie de cette Eau-de-Vie dans quatre parties d'eau distillée de Bleuet , ou Cyanus de bleds , ou de l'Eau distillée d'Eufraise ; on en met dans une cuillère , que l'on a chauffée auparavant pour la faire tiédir. On baigne son Oeil dedans en clignottant les Paupieres , afin qu'elles pompent de cette Eau , & la portent autour du Globe , ce que l'on fait quatre ou cinq fois de suite le matin & le soir.

Quand on s'est servi pendant quinze jours de cette eau , au degré que je viens de le dire , on ne mêle plus que trois parties des Eaux susdites avec une partie d'Eau-de-Vie. Lorsque l'Oeil est ac-

coutumé à ce second degré , on mêle moitié Eau-de-Vie , & moitié de ces Eaux, & on s'en tient là. On augmente ces degrés , afin que l'Oeil étant picotté & ranimé par la force de l'Eau-de-Vie, les fucs nourricier des Humeurs de l'Oeil se raniment aussi , & se portent plus abondamment dans le Cristallin pour le rétablir.



CHAPITRE XXXIII.

Des Causes accidentelles qui peuvent blesser la Vue.

OUTRE les Causes que j'ai rapporté des foibleſſes de Vue , il y en a encore d'autres qui l'affoibliffent , & la font perdre quelquefois. Cet inconvenient peut arriver , lorsqu'une Lumiere trop vive frappe les Yeux , ſoit qu'elle procède d'un Soleil trop brillant ou trop chaud , de l'éclat du Feu , de celui des Eclairs , de la Neige , ou de quelque reverberation d'un Objet luifant. J'en donnerai quelques exemples que j'ai vu.

Une perſonne après avoir cueilli des Fraiſes au ſoleil , a vu pendant plus de deux mois une Fraiſe voltiger devant ſes Yeux , avec alteration de ſa Vue ; l'impreſſion du rouge de ce fruit avoit frap-

pé tellement les endroits de l'Oeil où les Objets se peignent , qu'elle croyoit toujours la voir.

J'ai vu un Homme dans la Rue Royale à Paris , qui a perdu la Vue pour s'être trop approché de la lumière & de la chaleur du Feu , en voulant attacher un Fil à une Poularde qui tournoit à la Broche.

Un Ouvrier de la Monnoye de Paris , qui jettoit le Metal dans un Creuset rougi , devint aveugle par l'éclat du brillant du Feu.

J'ai vu de semblables effets par des coups d'éclairs fort vifs ; & plusieurs Personnes ont perdu leur Vue à moitié , pour avoir regardé trop long-tems les Eclipses du Soleil.

Le même accident est arrivé à des Prisonniers , qui ayant été long-tems dans un Cachot , ont été exposés tout d'un coup au grand jour.

D'autres ont eu ce malheur pour avoir marché long-tems sur la Neige pendant un trop grand jour.

L'application excessive à écrire , ou à lire des écritures de chicane , & de menus Caractères , les veilles que l'on donne à un travail appliquant , passer les nuits & les jours à jouer ; ce sont des excès qui affoiblissent la Vue , & dont
on

on doit s'abstenir , si l'on veut la conserver.

Pour ce qui est de la trop grande lumière & de la Neige , il suffit d'avoir la précaution de fermer les Paupieres ; ou si l'on est obligé de les ouvrir pour y voir , il faut que ce ne soit qu'à demi , pour empêcher qu'il n'entre trop de Rayons de lumière dans l'Oeil.



CHAPITRE XXXIV.

De l'Opération qui convient à l'Oeil , pour y appliquer un Oeil postiche.

CE n'est pas assez de connoître les Maladies des Yeux , & de savoir les moyens de les guérir ; il faut encore lorsqu'un Oeil est absolument inutile & difforme , que l'Oculiste sache la manière de mettre cet Oeil en état de pouvoir y appliquer un Oeil postiche ; en sorte qu'ayant la même forme du bon , il remue aussi comme lui. L'Art doit en cela si bien imiter la Nature , qu'on ne puisse faire la différence de l'un à l'autre.

Pour cet effet , si en traitant un Abscès du Globe , on s'apperçoit pendant la supuration , que la Vue de cet Oeil doit être perdue sans ressource , il faut ap-

porter ses attentions , pour faire en sorte que cette suppuration devienne assez abondante pour fondre ou diminuer le quart , ou le tiers du Globe ; ce que l'on obtiendra en retardant la suppuration , parce que le séjour du pus y feroit plus de perdition de substance ; c'est pourquoi d'abord que l'on jugera qu'il se fera assez amassé de matière , on lui donnera issue par les Remèdes mondifiants ; par ce moyen , après la suppuration , le Globe deviendra dans l'éclat qui convient , pour que la Personne puisse y souffrir un Oeil postiche.

Si le Globe se trouve trop gros , la Vue de cet Oeil étant perdue , soit par un Staphilome , ou quelque'autre cause , il faudra ôter de cet Oeil ce qu'il a de trop , en coupant & emportant l'Iris avec la Cornée transparente ; en sorte que l'on coupe toute l'extrémité de la circonférence de la Conjonctive , une demie ligne au-delà de la Cornée transparente ; par ce moyen les humeurs contenues dans le Globe se vident , le Globe se resserre & se referme , & la Playe de l'incision guérie , il restera une espèce de Globe qui fera moins gros que n'étoit le premier ; alors on y mettra un Oeil postiche qui doit être concave par derrière , pour loger ce qui reste de

l'Oeil , & assez gros du reste , pour remplir toute la capacité des deux Paupieres. Si on lui fait remplir ce vuide comme il faut , & qu'il soit égal au bon Oeil pour la grosseur , la largeur , la forme , la couleur & la figure de l'Iris , le trou de la Prunelle , on ne le distingue pas du naturel ; ce qui m'a parfaitement bien réussi , quand je l'ai entrepris.

Quoique nous venions de dire que l'Oeil postiche étant bien appliqué , doit avoir un mouvement à peu près semblable au naturel , par le moyen de la portion restante du Globe , il est aisé de voir que si par quelque accident fâcheux , on se trouve obligé d'emporter entièrement le Globe de l'Oeil , le postiche n'aura de mouvement , que celui que les Paupieres lui peuvent communiquer.

F I N.



TABLE

DES MATIERES

PRINCIPALES.

A.

A B C É s du grans Angle.	Page 39.
Il est produit par plusieurs causes.	<i>ibid.</i>
La maniere dont cet Abcès se forme.	41. 42.
Signes de l'Abcès du grand Angle.	43
Son prognostique.	44
Sa guérison.	<i>ibid.</i>
Opération qu'on y fait.	45.
Abcès. de la Cornée.	172
Abcès de l'Oeil, ce que c'est.	171
Endroits qu'il occupe.	<i>ibid.</i>
Ses signes.	
Manière d'y faire la ponction.	179
Abcès des paupieres	59. 90.
Opération que l'on y fait.	<i>ibid.</i>
Abcès entre la Conjonctive & la Sclérotique,	
ce que c'est.	172. 173.
Le tems d'y faire l'opération.	173. 174.
Abcès qui se forment entre le Globe de l'Oeil	
& l'Orbite.	106.
Leurs signes.	<i>ibid.</i>
Leurs causes.	<i>ibid.</i>
Leurs remedes.	107.

Maniere de les ouvrir.	<i>ibid.</i>
<i>Abcès</i> superficiel du Cristallin.	257.
Ses signes.	<i>ibid.</i>
Ses causes.	258.
<i>Abondance</i> non naturelle de l'Humeur aqueuse , & ses causes.	129.
<i>Accompagnement</i> de la Cataracte , ce que c'est.	246.
<i>Ægilops</i> , ce que c'est.	46.
<i>Albugo</i> , ce que c'est.	182. 183.
Ses figures.	<i>ibid.</i>
Comment il se distingue d'avec les abcès & les cicatrices de la Cornée.	<i>ibid.</i>
<i>Amas</i> d'humeurs qui se font derriere le Globe de l'Oeil.	109.
Trois observations de cette maladie. <i>ibid.</i> & <i>suiv.</i>	
<i>Anchilops</i> , ce que c'est.	39. 40.
<i>Angle</i> de l'Oeil.	3.
<i>Artères</i> des Yeux.	20. 21.
<i>Athéromes</i> des paupieres.	92.
Il y en a de trois sortes , que je réduis à une.	<i>ibid.</i>
Sa cause.	<i>ibid.</i>
Ses signes.	93.
Son pronostique.	<i>ibid.</i>
Opération pour la guérir.	<i>ibid.</i>
<i>Atrophie</i> ou diminution de la rétine.	261.
Ses signes.	<i>ibid.</i>
Les personnes qui y sont sujettes.	<i>ibid.</i>

B.

B LANC de l'Oeil.	10.
<i>Besicles</i> pour les Louches.	125.

C.

C A N A L nazal , ce que c'est.	6.
<i>Cancer</i> des paupieres.	68.
Ses causes.	69.
Remedes pour le guérir.	<i>ibid.</i>
Remede palliatif.	7.
<i>Caroncule</i> lacrimale.	6.
<i>Cataracte</i> en général.	184. & suiv.
Il y a differens sentimens sur la nature des Cataractes.	<i>ibid.</i>
Il y a plusieurs sortes de Cataractes du Cris- tallin.	185.
Il y a deux sortes de Cataractes membra- neuses.	<i>ibid.</i>
Division des Cataractes.	187.
<i>Cataracte</i> vraie , ce que c'est.	188.
Maniere dont les Cataractes se forment.	<i>ibid.</i>
La vraie Cataracte a son siége dans l'hu- meur Cristalline.	191.
Ce que c'est que la vraie Cataracte.	<i>ibid.</i>
Observation d'une Cataracte tombée d'elle- même.	195.
Il y a trois sortes d'alterations du Cristallin dans les vraies Cataractes.	195. 196.
Situation des vraies Cataractes.	<i>ibid.</i>
<i>Cataracte</i> caseuse & laiteuse , ce que c'est.	194.
<i>Cataracte</i> de naissance.	195.
<i>Cataracte</i> douteuse , ce que c'est.	196.
Combien de sortes il y en a.	<i>ibid.</i>
<i>Cataracte</i> membraneuse , ce que c'est.	<i>ibid.</i> & 196.
Maniere dont elle se forme.	<i>ibid.</i>
Observation sur la Cataracte membraneuse.	<i>ibid.</i>
Autre observation.	197.

Autre observation sur les Cataractes membraneuses.	198.
La Cataracte membraneuse , les endroits où elle se place.	199.
<i>Cataracte</i> filandreuse , ce que c'est.	201.
<i>Cataracte</i> provenue par coup.	201.
Observation sur cette Cataracte..	<i>ibid.</i>
Les differents endroits où cette Cataracte se place dans l'Oeil.	203. 204.
<i>Cataracte</i> causée par l'altération de la membrane qui revet le chaton du Cristallin.	204.
Signe de cette Cataracte.	<i>ibid.</i>
<i>Cataracte</i> fausse , ce que c'est.	205.
Glaucome , ce que c'est.	<i>ibid.</i>
Signe du Glaucome.	206.
Ses causes.	<i>ibid.</i>
Son prognostique.	208.
<i>Cataracte</i> branlante , ce que c'est.	209.
Ses signes.	210.
Moyen d'y remedier.	<i>ibid.</i>
<i>Causes</i> internes des Cataractes.	<i>ibid.</i>
<i>Causes</i> externes des Cataractes.	213.
Observations sur les Cataractes provenues de coup.	<i>ibid.</i>
Autre exemple de Cataracte , provenue par coup.	215.
Signes des Cataractes.	218.
Signe pour connoître la maturité de la Cataracte.	221.
Signe pour connoître la Cataracte membraneuse d'avec celle du Cristallin.	222.
Signe pour connoître si le malade verra après l'opération de la Cataracte.	223.
<i>Cataractes</i> barrées , ce que c'est.	226.
Etat où doit être la personne pour lui faire l'opération de la Cataracte.	227.
Combien de tems une Cararacte est à se mûrir.	<i>ibid.</i>

- Il est de conséquence que la Cataracte soit bien mûre avant son opération. 226. 227.
- Préparation qu'il faut faire au malade avant l'opération. 226. 230.
- Tems qu'il faut choisir. *ibid.*
- Maniere de faire l'opération de la Cataracte. 230. 231.
- Maniere de panser le malade après l'opération. 231. 232.
- Regime que doit observer le malade pendant les neuf premiers jours. 223.
- Differentes aiguilles pour l'opération de la Cataracte, 235. 236.
- Maniere dont est faite celle dont je me sers. *ibid.*
- Maniere de faire l'opération des Cataractes qui sont dans la chambre de l'Humeur Aqueuse. 237.
- Trois sortes de Cataractes peuvent passer dans la Chambre antérieure de l'Oeil. *ibid.*
- Observation des Cataractes situées dans la Chambre antérieure de l'Oeil. 239.
- Maniere de surmonter les accidens qui arrivent dans les opérations de la Cataracte. 240.
- Observations sur les Cataractes purulentes. 241.
- Premier accident qui arrive en abattant la Cataracte. 242.
- Second accident. *ibid.*
- Troisième accident. 241.
- Quatrième accident. 243.
- Cinquième accident en abattant la Cataracte. 245.
- Sixième accident. 246.
- Méthode de ceux qui brisent la Cataracte en l'abattant, rejetée. 247.
- Ce qu'il faut observer pour le maniement de l'Aiguille dans l'Oeil en abattant la Ca-

taracte.	<i>ibid.</i>
Trois sortes de Cataractes qui sont sujettes à reproduire une membrane après avoir été abatues.	248.
Les moyens de remédier aux accidens qui suivent l'opération de la Cataracte.	249.
Premier accident, & le moyen d'y remédier.	<i>ibid.</i>
Second accident, & le moyen d'y remédier.	<i>ibid.</i> & 250.
Troisième accident, & le moyen d'y remédier.	251.
Quatrième accident, & le moyen d'y remédier.	252.
Cinquième accident, & sans remède	254.
Cause générale des Fluxions.	136. 137.
Cause accidentelle qui blesse la vue.	273. 274.
Cercles ciliaires.	10.
Chassie, ce que c'est.	5.
Chassie, espèce de Fluxion.	239.
Ghemoisis, ce que c'est.	142.
Choroïde, membrane de l'Oeil.	10.
Chute de l'Uvée, Voyez Staphylome.	
Cils des paupieres, leurs usages.	3.
Circulation de l'humeur aqueuse dans l'Oeil.	20.
Confusion des humeurs de l'Oeil par un coup.	131.
Convulsion de la paupiere.	83.
Sa cause.	84.
Remèdes qui font cesser la convulsion des Paupieres.	<i>ibid.</i>
Cones objectifs, cones oculaires.	25.
Conduit lacrimon.	6.
Conjonction contre nature des paupieres, ce que c'est.	81.
Cornée, membrane de l'Oeil, sa description.	10.
On peut la diviser en plusieurs lames.	<i>ibid.</i>
Corps transparent, ce que c'est.	13.

DES MATIERES. 299

<i>Couleur noire dont l'Uvée est enduite.</i>	11.
<i>Chambre antérieure & postérieure de l'humeur aqueuse.</i>	12.
<i>Corps vitré.</i>	13.
<i>Cristallin, sa description.</i>	14.

D.

D ARTRES des paupieres.	74.
Ses signes.	ibid.
Sa cause.	ibid.
Sa guérison.	75.
<i>Déplacement forcé du Cristallin.</i>	98.
<i>Dérangement. des Cils. Voyez Trichiaise.</i>	
<i>Dessèchement. du Cristallin. Voyez Glaucome.</i>	
<i>Difficultés qui arrivent dans l'opération de la Cataracte.</i>	240. 241.
<i>Dilatation de l'Iris.</i>	29.
<i>Distribution. des Arteres dans les différentes parties du Globe de l'Oeil.</i>	19.
<i>Différence qu'il y a entre les personnes qui louchent dès leur enfance, & celles à qui ce défaut arrive dans un âge plus avancé.</i>	124.
<i>Différentes manieres de saigner l'Oeil.</i>	144.
<i>Division de l'Ophthalmie.</i>	138.

E.

E PAISSISEMENT & le séjour du sang fait grossir le Globe de l'Oeil.	128.
<i>Eraillement des paupieres, ce que c'est.</i>	87.
Ses causes.	ibid.
Ses signes.	ibid.
Maniere de le guérir.	87.
Opération pour le guérir.	88.
<i>Epanchement du sang entre les tuniques de la Conjonctive.</i>	104.

Ses remedes.	<i>ibid.</i>
Excroissances de chair sur le globe de l'Oeil.	115.
Leurs causes.	<i>ibid.</i>
Excroissance de chair sur la Cornée transparente.	115.
Opération pour la guérir.	116.
Excroissance de chair sur la Conjonctive : Opération pour la guérir.	117.
Excroissance de chair entre les paupieres & le globe de l'Oeil.	105.
Il y en a de deux sortes.	<i>ibid.</i>
Leurs causes.	106.
Leur prognostique.	<i>ibid.</i>
Leur guérison.	<i>ibid.</i>
Expérience de Physique qui prouve l'organe immédiat de la vue.	26.

F

F A I S S E A U X coniques.	<i>ibid.</i>
Fibres charnues ou muscles rayonnés de l'Iris.	12.
Fibres ou procès ciliaires	14.
Fistule lacrimale , ce que c'est.	46.
Il y en a d'apparentes & de cachées.	<i>ibid.</i>
Fistule lacrimale compliquée.	47.
Inflammation , survient de tems en tems à la Fistule lacrimale.	48.
Pourquoi la Fistule lacrimale jette de la matiere dans de certains tems , & point dans d'autres.	<i>ibid.</i>
Causes de la Fistule lacrimale.	<i>ibid.</i>
Prognostique de la Fistule lacrimale.	48.
Maniere de la guérir.	49.
Inconvenient qu'il faut éviter dans son Opération.	50. 51.
Préparation pour venir à l'opération de la	

DES MATIERES

201

Fistule lacrimale.	51.
Maniere d'en faire l'opération,	ibid.
Fistule des paupieres.	38.
Opération pour la guérir.	56.
Maniere de guérir la Fistule qui suit l'Orgeolet.	ibid.
Fistule sous le globe de l'Oeil.	61.
Sa guérison.	62.
Fistule par des humeurs froides.	ibid.
Foiblesse de vue , ce que c'est.	284. 285.
Foiblesse de vue , se connoit par le peu de mouvement de l'Iris.	29.
Fungus de chair sur le globe de l'Oeil.	117.

G.

G ALLES des paupieres.	72. 73.
Leurs signes.	ibid.
Leurs causes.	ibid.
Remedes pour les guérir.	74.
Glandes ciliaires , ce que c'est.	6.
Glandes lacrimales , ce que c'est.	5.
Glaucome , ce que c'est.	205.
Ses signes.	206.
Ses causes.	206. 207.
Son prognostique.	208.
Globe de l'Oeil , ce que c'est,	10.
Goutte sereine parfaite , ce que c'est.	263. 264.
Ses causes,	ibid.
Ses signes.	265.
Ses remedes.	266s 267.
Observation sur ce fait.	ibid.
Goutte sereine des femmes grosses , des filles qui ne sont pas réglées , & des hommes , par la suppression des hémorroïdes.	267.
Leurs signes.	268.
Leurs remedes.	ibid.
Goutte sereine des enfans.	268. 269.

Remedes qui y conviennent.	<i>ieid.</i>
<i>Goutte</i> fereine imparfaite , ce que c'est.	269. 270.
Ses caufes.	<i>ibid.</i>
Ses fignes.	<i>ibid.</i>
Remedes pour la guérir.	<i>ibid.</i>
Obfervation finguliere fur ce fait.	271. 272.
<i>Gravelle</i> des paupieres , leur guérifon.	66.
<i>Grain</i> de petite verole.	165.
<i>Graiffe</i> qui environnent le globe de l'Oeil , & ses ufages.	7.
<i>Grêlés</i> des paupieres , maniere de les guérir.	66. 67.
<i>Groffeur</i> demefurée du globe de l'Oeil.	128.
Deux maladies groffiffent le globe de l'Oeil.	129.

H

H U M E U R aqueufe , ce que c'est.	12.
L'humeur aqueufe groffit le globe de l'Oeil.	128.
L'humeur aqueufe fe reproduit.	129.
<i>Humeur</i> vitrée , ce que c'est.	13.
<i>Hydatides</i> . ou <i>Phlyctenes</i> des Paupieres & de la Conjonctive.	105.
Leurs fignes.	<i>ibid.</i>
Leurs prognostiques.	<i>ibid.</i>
Opération pour les guérir.	<i>ibid.</i>
<i>Hydropifie</i> des paupieres.	91.
Maniere d'y faire la ponction.	<i>ibid.</i>
<i>Hypopium</i> , ce que c'est.	172.

I

I R i s . ce que c'est.	11.
<i>Inflammation</i> des paupieres.	89.
<i>Inflammation</i> qui survient de tems en tems à la	

Fistule lacrimale.

47.

Inflammation de la Conjonctive. Voyez *Ophthalmie*.

L,

L I G A M E N S ciliaires . ce que c'est.	11.
L Loupes des paupieres.	63.
<i>Louches</i> , ce que c'est.	121.
Difference des <i>Louches</i> .	<i>ibid.</i>
De ceux qui deviennent <i>Louches</i> dans un âge avancé.	123.
La cause.	124.
Les signes.	125.
Difference de ceux qui deviennent louches dès l'enfance , & de ceux qui sont plus avancez en âge.	124.
Remedes des enfans qui louchent.	125.
Besicles pour les <i>Louches</i> .	126.
Nez de masque , qui convient mieux aux <i>Louches</i> que les Besicles.	<i>ibid.</i>
Remedes pour guérir les personnes plus avancées en âge que les enfans.	131.
Lumiere , maniere dont elle reflechit.	25.
<i>Lunettes</i> , leurs differences & leurs foyers.	284.

M

M A L A D I E S qui suivent les coups reçus à l'Oeil.	133.
Maniere de panfer les yeux.	273.
Précaution qu'il y faut prendre.	<i>ibid.</i>
Maniere d'examiner l'Oeil , pour connoître l'état de la vue.	34.
<i>Meliceris</i> . Voyez <i>Atheromes</i> ..	
<i>Membranes</i> communes & propres du globe de l'Oeil.	10.
<i>Membranes</i> de l'humeur vitrée.	13.

<i>Mouvemens convulsifs des paupieres.</i>	83.
Maniere de les guérir.	<i>ibid.</i>
<i>Mouvement de l'Iris.</i>	27.
<i>Moyen de fortifier la vue , pour s'exemter de l'usage des Lunettes.</i>	285.
<i>Muscles de l'Oeil.</i>	8.
Leurs usages.	9.
<i>Muscles des Paupieres.</i>	3.
<i>Muscles rayonnez de l'Iris.</i>	12.

N.

N E z de masque , qui convient mieux aux Louches que les Bescicles.	125.
<i>Nerfs optiques.</i>	13.
<i>Nerfs qui se distribuent à toutes les parties de l'Oeil.</i>	<i>ibid.</i>

O.

O B J E T de ce Traité.	1.
<i>Observation singuliere d'ordure entrée dans l'Oeil.</i>	158.
<i>Onglet ou Pterygion.</i>	117.
Ses remedes.	<i>ibid.</i>
Opération pour le guérir.	119.
<i>Onix , ce que c'est.</i>	172.
<i>Opération , d'une tumeur singuliere dans l'orbite.</i>	112.
<i>Opération que l'on fait aux paupieres unies dès la naissance.</i>	101.
<i>Opération que l'on fait aux paupieres unies avec le globe de l'Oeil.</i>	102.
<i>Opération d'un Fungus charnu sur le globe de l'Oeil.</i>	117.
<i>Opération qui guérit en un moment la paupiere abaissée & paralytique.</i>	86.
<i>Ophthalmie en général.</i>	136.
Il y a différentes espèces d'Ophthalmie.	<i>ibid.</i>
Causes des Ophthalmies.	137.

DES MATIERES	305
Division de l'Ophthalmie.	138.
<i>Ophthalmie seche.</i>	<i>ibid.</i>
Ses signes.	<i>ibid.</i>
<i>Ophthalmie humide.</i>	139.
Ses causes.	<i>ibid.</i>
Ses signes.	<i>ibid.</i>
<i>Ophthalmie qui succede au Rhume.</i>	140.
Ses signes.	<i>ibid.</i>
<i>Ophthalmie avec chassie seche.</i>	167.
Ses signes.	<i>ibid.</i>
<i>Ophthalmie qui occupe le globe de l'Oeil du côté des angles.</i>	140.
Ses signes.	<i>ibid.</i>
<i>Ophthalmie boutonée.</i>	<i>ibid.</i>
Ses signes.	<i>ibid.</i>
<i>Ophthalmie avec de petits abcès sur la cornée & la conjonctive.</i>	142.
Ses signes.	<i>ibid.</i>
<i>Ophthalmie érépélateuse.</i>	<i>ibid.</i>
Ses signes.	<i>ibid.</i>
<i>Ophthalmie appelée chemoisis.</i>	143.
Ses signes.	<i>ibid.</i>
Observation sur cette Ophthalmie.	145.
<i>Ophthalmie vénérienne.</i>	<i>ibid.</i>
Ses signes.	146.
<i>Ophthalmie de la Choroïde.</i>	<i>ibid.</i>
Ses signes.	<i>ibid.</i>
<i>Ophthalmie causée par un ordure dans l'Oeil.</i>	147
<i>Ophthalmie par coups reçus à l'Oeil.</i>	<i>ibid.</i>
<i>Ophthalmie par la rupture des vaisseaux qui rampent sur la conjonctive.</i>	<i>ibid.</i>
Ses signes.	148.
Prognostique de l'Ophthalmie,	<i>ibid.</i>
Progrès de l'Ophthalmie humide.	<i>ibid.</i>
Progrès de l'Ophthalmie érépélateuse.	<i>ibid.</i>
Progrès de l'Ophthalmie Chemoisis.	149.
Progrès de l'Ophthalmie vénérienne.	<i>ibid.</i>
Progrès de l'inflammation de la Choroïde.	<i>ibid.</i>
Progrès de l'Ophthalmie par les coups reçus à	

çus à l'Oeil.	ibid.
Progrès de l'Ophthalmie qui suit les coups de tête.	ibid.
De la guérison des Ophthalmies.	150.
Differentes manieres de saigner l'Oeil pour la guérison des Ophthalmies.	151.
Remede de l'Ophthalmie seche.	152.
Remede de l'Ophthalmie humide.	ibid.
Remede de celle qui suit le Rhume.	153.
Remede de celle qui est avec chassie.	158.
Remede de celle qui occupe le globe du côté des angles.	ibid.
Remede de la boutonée.	159.
Remede de celle où il y a des abcès sur la Cornée & la Conjonctive.	ibid.
Remede de l'éresipelateuse.	160.
Remede de la chemoisis.	ibid.
Remede de la vénérienne.	161.
Remede de celle de la Choroïde.	162.
Remede de celle qui dépend des ordures entrées dans l'Oeil.	ibid.
Remede de celle qui dépend des coups reçus à l'Oeil.	164.
Remede de celle qui dépend de la rupture des veines de la Conjonctive.	ibid.
Remede de l'Ophthalmie qui suit la petite verole.	165.
Orbite , ce que c'est.	2.
Organe immédiat de la Vue.	28.
Opinion de M. des Cartes sur l'organe immédiat de la vue.	ibid.
Opinion de M. Mariotte sur l'organe immédiat de la Vue.	ibid.
Orgeolet.	65.

P.

- P**ARALYSIE de l'Iris qui dépend de la
Choroïde. 35.
Paralysie de l'Iris qui ne dépend point de la
Choroïde. *ibid.*
Paralysie de la paupiere supérieure, ce que c'est. 80.
 Il y en a de deux sortes. 81.
 Maniere de guérir la Paralysie de paupieres. *ibid.*
Parties qui composent le globe de l'Oeil distin-
guées en deux classes. 2.
Paupieres, ce que c'est. 3.
Perte de Vue se connoit par l'immobilité de l'Iris,
soit dans la dilatation ou constriction. 19.
Points lacrimaux, ce que c'est. 5.
Pomette. Voyez *Staphilome*.
Pourquoi certaines vues voient les images des
objets confuses. 26.
Procès ciliaires. Voyez *Fibres ciliaires*
Prunelle ou Pupille. 11.
 La prunelle a un mouvement de dilatation &
de constriction. 27.

R.

- R**ENVERSEMENT de la paupiere inferieure. 96.
 Ses causes. *ibid.*
Remedes pour la guérir. 97.
 Opération pour la guérir en peu de jours. *ibid.*
Retine, ce que c'est. 13.
 Maladies de la Retine. *ibid.*
Rayons visuels, modifiez par les parties de l'Oeil. 24.
Rayons de lumiere, de la maniere dont ils re-
flechissent des objets. 25.
Refraction de la lumiere, pourquoi elle se fait. 24.
Raisiniere. Voyez *Staphilome*.

Réflexion de la paupiere superieure. Voyez
Paralyse de la Paupiere.
Rétréçissement de l'Iris. 29.

S.

S A c lacrima, ce que c'est. 6.
Sclerotiques, ce que c'est. 10.
Siège de la vraie Cataracte. 192.
Situation de la vraie Cataracte. 193.
Staphylome, ce que c'est. 285. 286.
Stéatome. Voyez *Atherome*.

T.

T A C H E S qui suivent les ulceres de la
 Cornée transparente. 177.
Opération qu'on y fait 178.
Remede dont on se sert pour les guérir. *ibid.*

Tache du Cristallin.

Tarse. Voyez *Cartilage des Paupieres*.

Tête de mouche. Voyez *Staphilome*.

Trichiaise, ce que c'est. 76.

Deux espèces de *Trichiaise*. 77.

Cause de la *Trichiaise*. *ibid.*

Son pronostique. 78.

Ses remedes, *ibid.*

Opération qui la guérit. 78.

Tumeur adipeuse, ce que c'est. 49.

Sa situation. 5.

Ses signes. *ibid.*

Opération pour la guérir. 96.

V.

V A I S S E A U X qui reportent le superflu du
 sang & des liqueurs de l'Oeil dans les
 gros vaisseaux. 21.

Varice de la Retine. 22.

DES MATIERES.

	309
Ses causes.	259.
Ses signes.	ibid.
Son pronostique.	250.
Signe pour distinguer cette maladie de la Cataracte.	ibid.
Veines qui donnent issue à l'Humeur aqueuse.	20.
Verues ou Poireaux des paupietes.	65.
Leurs differentes especes.	ibid.
Maniere de les guérir.	68.
Vision , ce qui en fait l'Organe immédiat.	26.
Ulcères de la Cornée transparente.	175.
Leurs signes.	ibid.
Leurs remedes.	177
Ulcères qui suivent la petite verole.	167.
Il y en a de deux sortes.	ibid.
Remedes pour les guérir.	180.
Union étroite de la Choroïde avec le nerf optique.	31.
Usage des paupieres.	7.
Usage des graisses qui environnent l'Oeil.	ibid.
Usage des différentes parties de l'Oeil , qui modifient les rayons visuels.	28.
Uvée , membrane de l'Oeil.	10.
Vue il y en a de trois sortes.	35.
Bonne Vue.	ibid.
Vue Miops.	ibid.
Vue Presbite.	ibid.
Cause de la variation des Vues.	38.
Maniere de connoître les defferens degrés de Vue qu'il y a dans l'Oeil.	33.

Y.


YEux louches. Yoyez *Louches*.

Fin de la Table des Matieres Principales.

[Faint, illegible text]

It is a very common mistake to suppose that the only way to get a good result is to use a large quantity of material. This is not true. The best results are often obtained by using a small quantity of material, provided it is of good quality and is used in the right way.

Y. (H) touches. Y. (H) touches.



HISTOIRE D'UN REMÈDE

TRÈS EFFICACE

POUR LA FOIBLESSE ET ROUGEUR

DES YEUX,

ET AUTRES MALADIES DU MÊME ORGANE.

Avec un Remède infallible contre la morsure
du chien enragé.

Par le Chevalier HANS SLOANE, Baronnet,
Médecin du Roi d'Angleterre & ancien
Président de la Société Royale & du
Collège des Médecins de Londres.

Traduits de l'Anglois & enrichie de notes par M.
CANTWEL, Docteur Régent de la Faculté de
Médecine de Paris, & Membre de la Société
Royale de Londres.



A AMSTERDAM ET A LEIPZIK,
Chez ARKSTÉE & MERKUS.

M. DCC. LXVII.



AU ROY DE FRANCE



Le petit Ouvrage que j'ai l'honneur
présenter à VOTRE MAJESTÉ
celui du célèbre Chevalier Shonke
y avoit environ trente-cinq an
il étoit seul possesseur du Royaume
et il enseignoit la composition. Lors-
qu'il en a donné la recette au Roi
Anglois. Son penchant à être
au genre humain. A été le seul
qui l'a porté à en acquiescer la con-



A U R O I D E F R A N C E .



I R E ,

*LE petit Ouvrage que j'ai l'honneur
de présenter à VOTRE MAJESTÉ,
est celui du célèbre Chevalier Sloane.
Il y avoit environ trente-cinq ans
qu'il étoit seul possesseur du Remède
dont il enseigne la composition, lors-
qu'il en a donné la recette au Roi
d'Angleterre. Son penchant à être
utile au genre humain, a été le seul
motif qui l'a porté à en acquérir la con-*

noissance , & à le perfectionner. *VOTRE MAJESTÉ* en me permettant de lui dédier la traduction de cet Ecrit , qui renferme une découverte si rare , & j'ose dire , si nécessaire au bien de ses Peuples , me procure le même honneur qu'a eu le Chevalier Sloane. Que je suis heureux , *SIRE* , que cette faveur de *VOTRE MAJESTÉ* , me fournisse l'occasion de l'assurer du zèle & du très-profond respect avec lesquels je suis ,

S I R E ,

De Votre Majesté , le très-humble
& très-obéissant Serviteur ,
& fidèle Serviteur.

CANTWEL.

JE souffigné, Docteur-Régent de la Faculté de Médecine en l'Université de Paris, nommé par ladite Faculté pour examiner un Manuscrit intitulé : *Histoire d'un Remède efficace pour la foiblesse & la rougeur des yeux, & pour plusieurs autres Maladies du même organe, &c.* traduit de l'Anglois, par M. CANTWEL, Docteur-Regent de ladite Faculté, & membre de la Societé Royale de Londres; ai lû avec attention ledit Manuscrit, que je crois devoir être très-utile au Public; j'ai remarqué dans les Notes que M. CANTWEL y a ajoutées, une saignée, dont il a introduit l'usage à Paris, & qui peut être très-avantageuse pour toutes les maladies de la tête; j'y ai observé de plus la découverte d'un remède efficace contre la morsure du chien enragé, & l'histoire naturelle des autres remèdes qu'on a employé avec quelque succès jusqu'à présent contre cette maladie. Je ne doute pas que le Public ne reçoive avec plaisir un Ouvrage si intéressant.

COLDEVILARS,
ancien Doyen & censeur
de la Faculté de Médecine.

JE souffigné, Docteur-Regent de la Faculté de Médecine en l'Université de Paris, Conseiller du Roi, Médecin ordinaire de Sa Majesté en son grand Conseil, en la Prévôté de son Hôtel, & grande Prévôté de France, préposé par ladite Faculté, à l'examen d'un Manuscrit intitulé : *Histoire d'un Remède très-efficace pour la foiblesse & la rougeur des yeux, & pour plusieurs Maladies du même organe, &c.* traduit de l'Anglois par M. CANTWEL, Docteur-Régent de la même Faculté,

& membre de la Société Royale de Londres ; ai lu avec autant de plaisir que d'attention , ledit Ouvrage ; je l'ai trouvé aussi utile par la découverte de remèdes choisis , qu'instructif par les notes judicieuses qu'y donne le Traducteur. Si la réputation bien méritée des célèbres Médecins qui ont l'honneur d'annoncer les premiers , des moyens sûrs contre la morsure des chiens enragés , & contre les maladies des yeux , fait l'éloge du livre : les sçavantes réflexions , & les recherches curieuses ajoutées par M. CANTWEL , achevent d'éclairer & d'assujettir la confiance du Public , qui lui a déjà l'obligation d'une nouvelle méthode de saigner , dont j'ai pu & dû connoître tous les avantages , l'ayant ordonné & vu pratiquer plusieurs fois par mon Collègue , toujours avec un égal succès ; ainsi je suis persuadé que cet Ouvrage sera reçu avec toute la reconnoissance qu'il mérite.

A Paris , ce 31 Août 1745.

LE THIEULLIER.

*****X*****

JE soussigné , Docteur-Régent & Professeur de la Faculté de Médecine de Paris , de l'Académie Royale des Sciences , préposé par la Faculté pour examiner un manuscrit qui a pour titre : *Histoire d'un Remède efficace pour la foiblesse & la rougeur des yeux* , &c. traduit de l'Anglois par M. CANTWEL , Docteur Régent de ladite Faculté , & de la Société Royale de Londres , ai lu avec attention ledit Manuscrit que je crois doit être très utile au Public. Le mérite de l'Auteur & du Traducteur sont également connus au Public. Ce dernier ne s'est pas tenu dans les simples bornes de la Traduction. Il y a joint des Notes qui méritent l'attention du Lecteur. Il y propose une sai-

gnée que je n'ai vû pratiquer à personne que lui à Paris. Elle est d'autant mieux indiquée pour les maladies des yeux & de la tête , qu'elle dégorge les vaisseaux même de la partie malade , avantage que nulle autre ne sçauroit avoir au même degré. Ainsi je ne doute nullement que le Public ne retire beaucoup d'utilité de cet Ouvrage.

Fait à Paris , ce 13 Septembre 1745.


BERTIN.



J'AI lû par ordre de Monseigneur le Chancelier, un Manuscrit qui a pour titre : *Histoire d'un Remède très efficace pour la foiblesse & la rougeur des yeux : &c.* traduit de l'Anglois par M. CANTWEL , à laquelle il a joint des Remarques : J'ai trouvé le tout digne de l'impression.

A Paris , ce 24 Septembre 1745.

POUSSE , fils ,



ÉPITRE DÉDICATOIRE

DE L'AUTEUR


AU ROI D'ANGLETERRE.



I R E,

J E viens de rendre public mon Remède pour la foiblesse & les maux des yeux ; j'en ai reconnu la grande efficacité , & le dédie très-humblement à V O T R E M A J E S T É , dont je suis ,


Le très-humble & très soumis Sujet
& Serviteur , HANS SLOANE.



HISTOIRE D'UN REMÈDE

TRES-EFFICACE,

POUR LES MAUX DES YEUX

 N E envie extrême de me rendre utile dans la pratique de la Médecine , profession que j'ai embrassée par goût , m'a toujours rendu attentif aux faits & aux vraies cures que j'ai eu occasion d'observer. De ce genre sont celles que j'ai vu faire par le Docteur *Luc Rugeley* sur des personnes affligées de maux des yeux.

Je tentai plusieurs fois inutilement de découvrir son remède. Dans ce dessein j'eus recours à un habile apoticaire , qui étoit fort son ami & le mien. Après la mort du Docteur , je parcourus tout ce qu'il avoit fait imprimer ; j'examinai soigneusement ses manuscrits , & sur-tout un traité de *Matière Médicale* qu'il a laissé.

Après bien de tentatives , l'homme que le Docteur employoit pour composer son remède , m'en apporta lui-même l'ordonnance écrite de la propre main de l'Auteur & me la vendit , en me faisant promettre de ne la communiquer à personne , ce qui pourroit lui porter préjudice.

J'ai éprouvé ce remède , je l'ai corrigé & perfectionné. Le voici tel que je le donne depuis plusieurs années.

Composition du Remède.

Prenez de *Tutie préparée* , une once ; de *Pierre hæmatite préparée* , deux scrupules ; du meilleur *Aloës préparé* , douze grains ; de *Perles préparées* , quatre grains ; mêlez-les avec une suffisante quantité de *Graisse de Vipere* dans un mortier de marbre ou de porphyre , dont le pilon soit de la même matière , & faites en un liniment dont le malade se servira le matin ou le soir , ou même deux fois par jour à sa commodité.

L'expérience me fit bientôt voir que ce remède étoit bon , & que si on le sçavoit bien employer , de cinq cens malades , pas un ne manqueroit d'être guéri , à moins que le mal ne fût causé par un *Virus vérolique*,

Il y avoit plusieurs années que j'étois en possession de ce secret , lorsqu'en feuil-

POUR LES MAUX DES YEUX II

letant quelques manuscrits du chevalier *Théodore Mayern*, je trouvai que cet onguent ne lui avoit pas été inconnu, & qu'il l'avoit inferé dans sa *Pharmacopée*, comme s'il en avoit fait la découverte. J'ai appris depuis qui lui avoit été communiqué par le chevalier *Mathieu Lister*, du collège des Médecins; que celui-ci avoit guéri *Mylady Saville* avec ce remède, & que cette cure avoit paru très-extraordinaire au chevalier *Théodore Mayern*. Il y a apparence que celui-ci en a dans la suite fait part au Docteur *Thamas Rugeley*, pere du Docteur *Luc Rugeley*; car ils étoient & contemporains & amis.

La méthode qui m'a le mieux réussi pour faciliter le succès de ce remède, est de faire une (a) *Saignée*, d'appliquer un

(a) Les saignées du pied & du bras font peu d'effet dans ces maladies, surtout lorsqu'elles sont invétérées, ou que l'inflammation est fort considérable. J'en ai vû faire jusques à vingt-cinq sans succès, & réduire les malades à la dernière foiblesse, sans diminuer leurs souffrances. L'extrême petitesse des vaisseaux obstrués, leur grand éloignement de celui où l'on fait la saignée, & la compression des veines naissantes de la partie affectée, par les arteres capillaires sanguines & lymphatiques, engorgées & dilatées au-delà de leur ton, en sont les causes physiques. Les deux premières causes jettent, pour ainsi dire; ces vaisseaux hors du chemin de la circulation, & la dernière empêche

12 HISTOIRE D'UN REMEDE
Vésicatoire à la nuque , ou derrière les

les veines d'être débarrassée par toute autre saignée que par celle qui change la direction du mouvement du sang dans les arterioles sanguines , & fait rétrograder les globules rouges qui ont été entraînés dans les arteres lymphatiques , indication que je n'ai encore vuë nulle part ; & que la saignée dont j'ai introduit depuis peu l'usage à *Paris* , remplit sans diminuer les forces du malade , aussi réussit-elle dans toutes les *Douleurs* , *Rougeurs* , *Inflammations & Ulceres* , aux yeux ; dans les *Douleurs* de tête (excepté celles qui sont causées par des vapeurs ou par le défaut des règles) dans la *Migraine* ; dans les *Etourdissemens* , les *Fluxions* , au visage , *Erésipelles* à la tête , & dans les *Parotides* , soit critiques , soit symptomatiques , qu'elle rend susceptibles de résolution. Je l'ai vuë réussir dans quelques cas de *Surdité* , & j'espere la perfectionner au point qu'elle pourra devenir d'un grand secours dans l'*Apoplexie* , & dans toutes les maladies *saporeuses* ; dans les *Esquinancies sanguines* ; dans les *Tintemens & bourdonnemens* d'oreilles ; dans la *Manie* , & dans le *Délire fébrile* , où la saignée du pied est à craindre , & notamment dans le délire qui accompagne la suppuration de la petite *Vérole*. Les anciens faisoient ouvrir la veine *Frontale* , l'*Angulaire de l'œil* , la *Nasale* , la *Sublinguale* , ou l'*Auriculaire* , & quelques-fois l'artere qui répond à cette dernière veine. Quelquefois aussi ils faisoient brûler l'une & l'autre , aussi bien que la veine *Frontale* , d'où vient sans doute la méthode de certains *Oculistes* , qui appliquent derrière les oreilles de grands emplâtres couverts de *Pierre infernale*. Tantôt ils se servoient de *Sangsues* ; tantôt ils appliquoient les *Ventouses* à la tête , à la nuque , ou aux épaules. *Vid. tabul.*

Thom. Corachin. de morb. Capit. Leonard. Botal. De curation. permissionem sang. Cap. 40. & Petrum Borell. observ. Centur. 1. observ. 38. 39, 61.

La découverte de la circulation du sang fit tomber toutes ces saignées particulières , peu s'en fallut qu'on ne regardât les sangsuës & les ventouses comme inutiles ; mais l'expérience ayant fait voir qu'il y a des engorgemens auxquels l'effet de la saignée du pied , du bras , & de la gorge ne s'étend pas , on a été obligé d'en continuer l'usage.

Les *Anglois* , dans les fausses *Pleuresies* , & autres douleurs *Musculeuses* , font appliquer les *Ventouses humides* aux parties souffrantes. Dans les *Inflammations* des yeux & du visage , & dans les *Douleurs* de tête , ils les font appliquer aux épaules. *Heister* les recommande dans les *Douleurs & Pesanteurs* de tête , dans les *Inflammations* des amygdales , de la luette & des yeux , dans la *Goutte serene* , & dans la *Cataracte*. *Adversus has etenim noxas , dici vix potest quam vehemens scarificatio , sæpe remedium sit , præscriptum si ubi res exigat , prudenter aliquoties fuerit repetita.* Il donne la figure du scarificateur ordinaire dont on se sert en *Angleterre* & en *Italie* , & veut qu'on rarefie l'air avec des étoupes ou avec une petite bougie. La méthode commune d'*Angleterre* , trop connue pour avoir besoin d'être décrite , vaut beaucoup mieux. *Morgagni* recommande l'ouverture des vaisseaux occipitaux dans l'*Apoplexie* & dans toutes les maladies *Soporeuses*. *Zacutus Lusitanus* en avoit fait l'expérience avant lui , & un sçavant Médecin de *Bath* en *Angleterre* , la louë dans le délire qui accompagne la petite *Vérole*. J'ai devers moi des exemples surprenans de *Coups* à la tête , de maladies *Soporeuses* , & d'accidens survenus aux *frictions mercurielles* mal administrées ,

14 HISTOIRE D'UN REMEDE
plus ou moins grande , à proportion du

guéris par la saignée que je propose. Le scarificateur de *Heister* me paroît insuffisant pour l'ouverture des vaisseaux occipitaux ; & le bistouri ou la lancette dont *Lusitanus* , *Morgagni* , & peut-être *Heister* se sont servis pour faire cette opération, seroit un outil dangereux entre les mains de bien d'autres.

A *Boubon les Bains* , à *Neri* , en *Allemagne* , en *Suisse* , & dans quelques endroits de l'*Afrique* , on applique les cornets d'écrites par *Celse* , lib .3. cap. 11. on les applique aussi à la tête aux gras des jambes. On imite en cela les scarifications des Egyptiens , rapportées par *Prosper Alpin*.

L'usage des *Sangsuës* est assez familier , même en *France* , pour les enfans & pour les femmes grosses & foibles dans les *Hémorroïdes* , dans les *Ophtalmies* , & dans les *Erisipelles* au visage , dans la Douleur de tête , & dans la Rougeur du nez. *Botal. ibid. Heister & Authores ab illo citati. Magnam vint habent veteres , & induratas inflammationes dissipare , dolores lenire , scabiosa ulcera reficcare , excedentia , & sordida retinere & detergere , suppressas hæmorrhoides revocare , & turgentes & induratas Mollire & dissolvere , partibus scilicet affectis appositæ & repetitæ. Verum aptiores effæminatis corporibus ferrum timentibus quam aliis.*

Parmi les *Oculistes* , les uns appliquent les *Sangsuës* aux *Temples* , les autres sous la *Paupiere* inférieure , & les autres aux angles des yeux. Il y en a qui craignant les mauvais effets de la grande dérivation que causent quelquefois ces petits animaux , sur les parties auxquelles on les applique ; tantôt enlèvent avec les ciseaux le *Bourlet* qui entoure la *Cornée* , ou la surface supérieure du *Blanc de l'œil* , engorgée & épaissie par une trop grande

POUR LES MAUX DES YEUX. 15
dégré de l'inflammation ou de l'acrimonie
des humeurs par un *Cautére* , ou par un
Emplâtre Vésicatoire perpétuel placé entre
les épaules. (b)

Je ne recommande ordinairement que
l'eau de fontaine pour laver les yeux. Je
la préfère à toute autre lotion , soit simple
soit composée.

Les remèdes internes les plus efficaces
sont la *Conserve des fleurs de Romarin* les

affluence de sang & de lymphe comme dans les for-
tes *Ophthalmies* ; tantôt barrent ou détruisent une
partie des veines sanguines de la *Conjonctive* trop
dilatée , comme dans des *Ophthalmies* moins con-
sidérables ; tantôt font une saignée à l'intérieure
des *Paupières* par le moyen d'un *Epi* d'orge ou de
seigle , ou d'un petit instrument d'acier fait en for-
me de *Brosse* , comme dans les *Rougeurs* des yeux.

Ces Opérations sont aussi dangereuses que les
Sangsuës , & l'on n'a pas moins vu de fâcheuses
suites des unes que des autres.

(b) La révulsion qu'on fait par la saignée dont
je viens de parler , est plus forte & plus considé-
rable que celle qu'on fait par le *Vésicatoire* ou par
le *Cautére* ; il y a cependant des cas où le *Cautére*
ou l'*Emplâtre vésicatoire perpétuel* , détournant le
cours des humeurs & servant d'égout, achève la cure.

Je fais faire le *Cautére* au bras : voici la com-
position de l'*Emplâtre vésicatoire perpétuel*.

*Recipe Emplast. vesicator. commun. unc. 1. Un-
guent. Basilic. drag. semis tento igne liquefiant , &
add. pulv. lent. unc. semis.*

On le fait d'environ la largeur d'un écu de six
francs. On le nettoie tous les jours , & on le re-
nouvelle de tems en tems.

Poudres Anti-épileptiques, comme celle de *Guttette*, la *Betoine*, la *Sauge*, le *Romarin*, l'*Euphraise*, la racine de *Valeriane sauvage*, & l'*infusion* desdites Plantes ; le *Castor*, l'*Esprit composé de Lavende*, & le *Sel Volatil huileux*.

Si l'inflammation revient, une petite saignée aux *Temples (c)* par le moyen des *Sangsuës*, ou aux *Epaules* par le moyen des *Ventouses* sera fructueuse.

J'applique l'onguent avec un petit peinceau de crin, les yeux clignotans ou fermés à demi.

Une Fièvre intermittante presque imperceptible arrête quelquefois le succès du remède. Chaque accès affecte les yeux, & rend le mal plus opiniâtre. J'ai souvent vu arriver de pareils accidens ; mais ayant dompté la Fièvre par le secours du *Quinquina*, la maladie devenoit d'abord traitable.

J'ai fréquemment ôté avec ce remède des *Tayes (d)* qui couvroient la vuë, aussi

(c) La saignée dont je viens de parler dans la note A. est infiniment préférable aux deux moyens que nous propose ici le Chevalier, & n'est accompagnée d'aucun danger ni d'aucune incommodité.

(d) Un Oculiste étranger m'a assuré que le *Tabac de Brésil* soufflé dans l'œil, est un remède infailible dans ce cas-ci. Je ne l'ai pas encore essayé.

bien que des *Cicatrices* restées après des inflammations , ou des abcès à la *Cornée*. Il s'est présenté chez moi beaucoup de pauvres gens si affligés de ces maux , qu'ils avoient besoin d'un conducteur pour y venir ; mais ils se trouvoient bien-tôt en état de s'en passer , à mon grand contentement.

Le même remède convient fort dans les *Douleurs vives* (e) des yeux , qui causent des *Elancemens* dans la tête , & empêchent de dormir.

J'ai traité une Dame de grande condition qui étoit dans cet état. Elle avoit pris le jour que je lui avois fait ma première visite cent cinquante gouttes de *Laudanum liquide* en trois prises , pour appaiser les douleurs violentes qu'elle sentoit. Elle a été parfaitement guérie par mon remède , aussi bien que plusieurs autres , sans le secours d'*Opium*.

Monsieur *Anisson* qui étoit venu ici avec le Duc d'*Aumont* pour faire un traité de commerce avec l'*Angleterre* , ayant été guéri par l'application de mon remède d'une grande *Foiblesse* des yeux jointe à une *Rougeur* considérable & très incom-

(e) Je me suis souvent servi avec succès d'une fomentation faite avec les *Fleurs de Camomile* & le *Lait de Vache* , dans ces douleurs.

18 HISTOIRE D'UN REMEDE

mode, me proposa de me le faire acheter tout ce que je souhaiterois par le Roi son maître (c'est ainsi qu'en France sont récompensés ceux qui font quelque découverte utile) mais je lui répondis que j'avois donné ma parole de garder encore le secret quelque tems.

La pratique ordinaire conseille les *Purgatifs*, sur tout les (*f*) *Purgatifs mercuriels* dans le traitement des maux des yeux.

J'ai été autrefois de ce sentiment, & je l'ai fait imprimer dans *l'Introduction à mon Histoire naturelle de la Jamaïque*. Mais j'en reconnois aujourd'hui l'abus; les ayant souvent trouvé nuisibles dans les maladies que mon remède guérit.

Il est remarquable que les *Compresses*, les *Bandeaux* & les *Voiles* dont se servent ceux, qui ont les yeux foibles, pour les mettre à l'abri des impressions de la lumière, en retardent ordinairement la guérison, parce qu'ils y entretiennent trop de chaleur. Je les leur fais quitter, aussi-tôt qu'ils peuvent soutenir un peu le jour.

(*f*) Le *Calomelanos Turqueti* est fort vanté dans les maladies des yeux. Les pillules de *Chabert* dont on dit tant de bien, ne sont autre chose que du *Mercure* mêlés avec des purgatifs, ou quelque préparation mercuriele. J'en ai vu & de bons & de mauvais effets.

C'est du Docteur Guillaume *Stokeman*, Medecin de Guillaume III. Roi d'*Angleterre*, que j'ai appris les grandes vertus de la *Graisse de Vipere* pour les maux des yeux. C'étoit un homme d'esprit, qui avoit été en relation avec *Tachnius* de *Venise* un des plus célèbres Chimistes du dernier siècle, & avec tous les fameux Médecins de *Padouë*, où il avoit étudié quelques années. *Daniel Ludovicus* parle aussi très-avantageusement de cette graisse. Je l'ai substituée à l'*Axunge* ou à la *Graisse de Cochon*, qui étoit marquée dans l'ordonnance qu'on m'a vendue. Ce changement a produit des effets qui m'ont étonné, & les cures que je fis dans la suite, me parurent tenir du miracle.

Comme je n'étois nullement obligé au secret par rapport à cette partie, j'en fis part au Docteur *Arbuthnot*, qui après avoir très-souvent employé cette graisse pour guérir les maux des yeux, la regardoit comme aussi efficace que la composition entière du remède dont il s'agit.

Depuis ce tems là, j'ai lu dans quelqu'une des *Lettres édifiantes* des Missionnaires aux Indes que les Orientaux se servent de cette graisse pour le même usage.

Il y a des Auteurs qui assurent que les serpens muent tous les ans; & qu'au même tems ils quittent la peau des yeux. Mais

que cela soit l'effet de quelque qualité qui se trouve dans leur graisse , c'est ce que je ne prétends pas déterminer.

Les *Huiles* étant défenduës dans toutes les maladies des yeux par un des plus célèbres Auteurs qui ayent écrit sur la *Chirurgie*, je ne me suis jamais servi d'aucune espèce d'huile , soit à part, soit mêlée avec d'autres drogues , pour éviter toute espèce de remède douteux , & dont l'usage pourroit être nuisible. L'expérience m'a convaincu dans le suite que l'*Huile d'Olive* est de ce genre-là : car mon liniment que j'avois donné à des personnes , qui le laisserent trop sécher , ayant été mêlé avec l'*Huile d'Olive* , causa des accidens considérables. J'attribue cet effet à quelques particules acres & piquantes contenuës dans l'*Huile* , qu'on croit mal à propos très-adoucissante tant intérieurement qu'extérieurement. Monsieur (g) *Magnol* & d'autres personnes de ma connoissance à *Montpellier* m'ont assuré que les feuilles d'Olivier avec lesquelles on nourrit quelquefois les lapins domestiques faute de verdure , leur font faire des *Urines sanguinolentes*.

Jusqu'ici j'ai religieusement gardé la parole que j'ai donnée de ne communiquer

(g) Professeur de Médecine à Montpellier, pere de M. *Magnol*, Professeur dans la même Université.

ce remède à personne. Aujourd'hui que je me crois dégagé de cette promesse par plusieurs raisons , je le publie pour l'avantage du genre humain. J'ai eu quelques autres remèdes dont on ne m'avoit fait part qu'à la même condition , & ce sont les seuls que j'ai tenus secrets. Dans les consultations sur les cas les plus difficiles , j'ai toujours parlé ouvertement à mes confreres , sans imiter certains Médécins de bonnes mœurs & de grand nom , qui souvent jugent à propos de cacher ce qu'ils ne doivent qu'à l'étude ou à l'expérience , alléguant que *Artis est celare Artem*.

Voici un fait qui prouve évidemment que je n'ai jamais cherché à faire un monopole des grands remèdes.

Ayant appris du Chevalier *Robert Southvel* , alors Président de la Société Royale & Protecteur des gens de mérite , entr'autres de M. le Capitaine *Dampier* ; qu'il y avoit dans la famille de ce dernier à *Exmouth* en *Devonshire* , un secret infailible contre la *Morsure* des *Chiens* & autres animaux *enragés* ; je priai le Chevalier de se servir de son crédit auprès du Capitaine , pour en obtenir un mémoire des plus amples. Le Chevalier me mit entre les mains celui qu'on lui envoya , & ne consultant que le bien public, je le fis imprimer tout entier dans les *transactions philosophiques* n^o

237. & 443. (h) avec la façon de préparer & d'administrer le remède. Ceux qui ont abrégé ce mémoire dans la suite ont omis nombre de circonstances qui y sont marquées.

(h) Le Memoire de Monsieur Dampier peut se réduire à ce qui suit :

La Plante dont il s'agit est une espèce d'*Oreile de Judas* ; elle vient dans les terres sèches, steriles & sabloneuses. Il en vient aussi dans les bonnes terres, & celle-ci est préférable à toute autre. Elle ne s'élève guère de la terre ; au contraire. Elle paroît s'y attacher ou ramper dessus. Elle se confond avec la mousse & l'herbe.

On la fait sécher au four, au feu, ou au soleil. On la met en poudre fine, on la tamise, & on la mêle avec pareille quantité de poivre pulvérisé. L'animal à qui on veut administrer ce remède, doit être saigné & lavé avant de le prendre, pour emporter tout ce qui pourroit rester attaché à son corps, à la playe ou à ses habits, de la *Salive* ou de la *Bave* de celui dont il a été mordu. La dose doit être proportionnée à la grandeur de l'animal, & on peut le donner dans du lait, du bouillon, de la bière, ou dans une autre véhicule convenable tiède, le matin à jeun, pendant deux ou trois jours.

Lorsque dans un troupeau il se trouve plusieurs animaux atteints de ce mal, il faut faire passer tout le troupeau deux ou trois fois par une rivière, lui faire changer de paturage, & ne le plus laisser retourner dans les mêmes lieux où il avoit accoutumé de paître, jusques à ce que toute l'herbe ait été parfaitement bien lavée par deux ou trois grosses pluies, & qu'on ait lieu de croire qu'il n'y reste plus de la *Bave* des animaux mordus. Dans cet intervalle il faut donner le remède aux malades.

Dans le mémoire (i) original qu'on envoya au Chevalier Southwel , on fit mention de l'*Oreille de Judas* , comme de l'ingrédient principal du remède. Je n'ignorois pas que ce simple pris intérieurement étoit nuisible , c'est pourquoi je priai le Chevalier de nous faire envoyer en nature le simple qui entroit dans la composition du remède , & une prise du remède préparé pour nous mettre mieux au fait , & de sa qualité & de sa dose. Par ce moyen j'appris que la plante désignée étoit l'*Hépatique terrestre cendrée de Ray* , qui est le premier qui en ait fait mention dans son catalogue des *Plante ; d'Angleterre* imprimé en 1670. où il paroît fort surpris qu'elle

Un animal mordu d'un chien enragé , n'enrage lui-même qu'après une *Pleine Lune* & une *Nouvelle Lune*, ou après une *Nouvelle Lune* & une *Pleine lune*. C'est avant ce terme-la qu'il faut administrer le remède , qui prévient efficacement toute espèce de mauvaise suite. Un animal enragé est très-difficile à guérir.

(i) Il s'est glissé une erreur dans ce Mémoire de Monsieur Dampier. Le Chevalier Sloane l'a rectifié. C'est lui qui a fait marquer dans les *Transactions Philosophiques* , que Monsieur Dampier s'étoit trompé ; que c'étoit l'*Hépatique cendrée terrestre de Ray* , & non l'*Oreille de Judas* , qui faisoit la base du remède ; qu'on la trouvoit par tout dans les endroits stériles , & que la dose en étoit de quatre scrupules ; sçavoir , deux de la plante , & deux de poivre noir pulvérisé.

24 HISTOIRE D'UN REMÈDE
at échappé à la recherche des Botanistes,
qui l'ont précédé. (k)

(k) En 1721. Monsieur Mead Medecin du Roi d'Angleterre, fit insérer ce remède dans la *Pharmacopée de Londres* sous le titre de *pulvis antilyssus*.

Recip. Lichen. ciner. terrestr. & piper. nigr. vulverator. anna. part. æquales. m. f. pulvis.

Depuis ce tems-là il y a fait quelque changemens, & l'a donné au Public sous le titre de *Remède certain contre la morsure du Chien enragé*.

Faites tirer, dit-il, neuf ou dix onces de sang, d'un des bras de la personne mordue, donnez-lui ensuite pendant quatre matins à jeun, un demi-septier de lait de vache tiède, dans lequel on mêle un gros de l'*Hepatique terrestre cendrée*, bien épluchée, séchée & pulvérisée, & demi gros de *Poivre noir* en poudre. Le cinquième matin on fera baigner le malade à jeun dans l'eau froide, soit de fontaine soit de rivière, & on continuera de même pendant l'espace d'un mois, puis trois fois la semaine pendant quinze jours. Il faut qu'il s'y plonge entièrement, & qu'il n'y reste la tête hors de l'eau) au-delà de demi minute, si l'eau est fort froide.

Monsieur Mead assure qu'il y a trente ans qu'il employe ce remède, qu'il ne l'a jamais vu manquer, ni appris qu'il eut moins de succès entre les mains des autres Médecins de *Londres*, ou des Provinces, qu'entre les siennes; qu'il en a déjà éprouvé mille fois l'efficacité, & qu'il souhaiteroit avoir un remède aussi sûr contre quelque autre maladie, que celui-ci l'est contre les suites de la morsure du chien enragé, quand on l'emploie à tems, & avant que l'*Hydrophobie*, symptome indomptable, paroisse.

Le

Cet exemple fait voir le grand avantage qu'on pourra tirer de l'observation des sim-

Le témoignage d'un homme comme M. Mead, si versé dans la pratique de la Médecine, si connu dans la République des Lettres si remarquable pour son désintéressement, sa sincérité, sa probité & sa candeur, respecté des Grands, aimé de ses Confreres, adoré du Peuple, cheri de tout le Monde, indépendant de la Fortune, & nécessaire à sa Patrie, doit être un garant suffisant de ce qu'il avance, & une preuve incontestable de l'efficacité du remède qu'il annonce.

Monsieur J. Feiller le jeune, Ecuyer de la Société Royale, prouve, par plusieurs exemples qu'il a faites sur des chats & des chiens enragés, l'efficacité de cette poudre, & en 1737 il guérit un domestique qui avoit des symptômes déjà effrayans. *Transf. Philos.* ann. 1738. p. 289. Il est fait mention aussi dans les mêmes *Transactions* d'un homme qui fut guéri par le seul secours des saignées & des bains froids. Un jeune homme qui avoit pris cette poudre pendant 40 jours, mourut 15 mois après n'ayant point été mordu du depuis d'aucun animal, & il faut observer que dans cet espace de tems il fut taillé, & que jamais plaie ne s'étoit fermée avec plus de facilité, & que dans moins de cinq semaines il couroit les rues.

Tous les remèdes qu'on a jusques à présent prescrits avec quelques succès contre cette maladie, sont des diuretics chauds, dit Monsieur Mead dans sa dissertation sur la Rage. Tels sont la Cendre d'Ecrevisses de rivière, l'Eponge du Rosier sauvage, les Cantharides, les Escarbots, & les Hironnelles du règne animal.

La cendre d'Ecrevisses est le fameux remède d'Æschrion, rapporté par Galien. Cet empirique

ples dont on ne connoît pas encore les vertus , puisque rien n'empêche qu'on n'y dé-

faisoit bruler les écrevisses toutes vives dans une poêle d'airain , jufques à ce quelles fe puffent aifément mettre en poudre. Il ne faisoit jamais cette préparation , qu'après que le Soleil étoit entré dans le figne du Lion , & le dix huitième jour de la Lune. Il donnoit pendant quarante jours une cuillerée de cette cendre délayée dans de l'eau , lorsqu'il commençoit la cure , incontinent après la morsure ; mais lorsqu'on l'appelloit plus tard , il donnoit une autre dose. Il ajoutoit quelquefois fur dix parties de cette cendre , une partie d'encens , & cinq parties de la racine de Gentiane en poudre. *Galien* faisoit une estime particulière de ce remède , qu'il appelle *cerò sanans remedium* , de *composit. medicamentor. per gener. lib. 2. cap. 16. Nimirum cum nullus eorum qui illo fuerint usi mortuus sit. lib. undecim. de medicament simpl. facultat.* *Dioscoride* n'en faisoit pas moins de cas.

L'Eponge du Rosier sauvage est ce célèbre contre poison de *Boccone* (voyez son *Museo di piante rare*) que les *Siciliens* appellent *Sanatodos*. C'est une excroissance qui vient sur l'Eglantier , comme la Noix de Galle vient sur le chêne. Elle est le nid de certaines insectes , & renferme beaucoup de petits vers blancs , qui au printems se changent en mouches ou en papillons.

Or , toutes les Insectes contiennent un sel diuretic. Celui des *Cantharides* est très-actif. *Baccius* dans son *Traité de Poisons* les conseille en substance pendant plusieurs jours contre la morsure du chien enragé.

Il suit en cela l'autorité de *Rhazes* & de *S. Jean Damascène*. On les fait infuser vingt-quatre heures dans du lait aigri , qui reste après en avoir

couvre , comme dans celui-ci , des propriétés admirables.

Après m'être assuré de la nature de la Plante , j'ajoutai en mémoire original une

retiré le beurre On les sèche ensuite , & avec la fleur de lentilles & du vin ou en forme de trochisques d'un scrupule chacun. Le malade doit en avaler un tous les jours. Les Hongrois, dit *Boccone* dans son *Museo di fisica* , en donnent cinq à la fois aux hommes , & un plus grand nombre aux bêtes. Pour les inconvéniens de ce remède , *Caccius* fait boire copieusement de lait , qui dit guérir la *Stranguerie* & le *Pissement de sang* aussi efficacement que l'usage du remède prévient l'*Hydrophobie*.

Arnoldus Weikardus louë beaucoup les *Escarbots*. Il les fait étouffer dans du miel écumé , & les y laisse en infusion quelques semaines. Alors il en prend quatre qu'il fait broyer dans un mortier , y mêlant de l'eau distillée de *Mouron* & de celle de *Vervene* ; qu'il fait passer ensuite par un linge pour en donner chaudement à la personne morduë pendant plusieurs jours. *Vid. Thesaur. Pharmac.*

Franciscus Oswaldus Grembs regarde le bouillon d'Hirondelles comme un bon remède contre la morsure du chien enragé.

Le regne Végétal en fournit beaucoup. L'*Alisson* ou le *Marrube de Galien* , l'*Ail* , l'*Aigremoine* , le *Mourron* , l'*Oignon* , remède favori de *Paracelce* , & l'*Oseille* ; cette dernière plante & l'*Esprit de Vitriol* que *Jean Agricola* dit être admirable dans cette maladie sont des diuretics froids.

Ætius dit qu'un veillard de sa connoissance employoit l'*oseille* avec beaucoup de succès. Il lavoit la playe avec la décoction de cette plante , & la faisoit boire au malade en guise de ptisanne , ce qui lui

remarque sans laquelle il auroit été dangereux , ou du moins infructueux. Je don-

faisoit rendre beaucoup d'urine trouble. Le marc lui servoit pour faire des cataplasmes qui appliquoit à la playe , après l'avoir lavée. *Vid. lib. 6. cap. 24.*

L'*Hepatique* , dit monsieur *Mead* , est un diuretic chaud , & il y a apparence que l'on n'y ajoute du poivre que pour le rendre moins dégoutant. Monsieur *Ray* est le premier qui l'ait bien décrit. Il l'appelle *Lichens cinereus terrestris*. Elle n'apporte, dit-il , ni fleurs ni chapiteaux. Ses feuilles sont blanchâtres du côté qu'elles regardent la terre. Elles sont découpées en manière de franges , qui , comme autant de petites racines s'attachent à la terre & aux plantes voisines. On en trouve beaucoup dans les lieux secs & stériles *Catalog. Plantar. Angl. 1667.*

Monsieur *Dilenius* Médecin & célèbre Botaniste l'a depuis peu décrit avec plus d'exactitude. Il l'appelle *Lichnoides digitatum cinerem lactucæ foliis sinuosis*. Sa substance est molle , spongieuse & lanigineuse , tenant le milieu entre le champignon & la mousse. Elle croît dans les plaines , dans les bois , & dans les lieux couverts , auprès des racines & des troncs d'arbres parmi les plantes rampantes & moussueuses qui les environnent.

On la trouve dans tous les pays , & on en apporte de l'*Amérique* attachée à l'écorce du *Pérou*.

Ses feuilles sont petites lorsqu'elles sont tendres & ne surpassent jamais deux ou trois pouces en longueur , & un ou deux pouces en largeur. Elles sont divisées en plusieurs segments. On les trouve quelquefois simples, quelquefois couchées l'une sur l'autre , se terminant dans de petits corps durs & oblongs, que les Botanistes appellent en Latin *Peltæ* , & qui renferment sans doute la semence de la plante. Ces feuilles séchées sont cendrées , d'une

nai en même tems avis de cette découverte à Messieurs *Petiver*, *Doody*, *Rand* & autres Botanistes, leur recommandant de faire

couleur plus foncée du côté qu'elles regardent la terre, que de celui qui regarde le Ciel. On y remarque beaucoup de veines, d'où naissent çà & là des fibres blanches, qui s'enfoncent dans la terre, & forment des racines. On trouve cette plante dans toutes les saisons, mais sur-tout après les pluies depuis le commencement de l'automne jusqu'à l'hiver. C'est là le tems qu'elle est dans toute sa force, & la saison la plus convenable pour la cueillir. *Vid. Histor. Muscor.*

Quatre onces de cette plante ont fourni par distillation une once, cinq gros, un scrupule & deux grains d'une eau acide; deux gros, un scrupule & seize grains d'huile qui est spécifiquement plus pesante que l'eau; & une once, deux gros, un scrupule & onze grains de charbon, contenant un sel fixe. *Mead. Dissert. sur la rage.*

L'Hépatique n'est pas le seul remède qu'on a découvert de nos jours contre cette maladie formidable. Les expériences de Messieurs *Desault* Médecin François, & *James* Médecin Anglois, font voir que le *Mercur*e n'est pas moins efficace contre la morsure du chien enragé que contre les maladies secrètes.

Monsieur *Desault* a fait imprimer ses expériences parmi ses ouvrages, Monsieur *James* a présenté les siennes au célèbre *Boerhave*, au Chevalier *Hans Sloane*, & à la Société Royale de Londres. Le premier a employé les frictions mercurielles, l'autre le Turbit minéral avec tout le succès qu'ils pouvoient souhaiter. Il y avoit déjà plusieurs années que M. *Astruc* avoit donné la même idée dans sa these sur l'Hydrophobie; & le spécifique des Chinois contre

30 HISTOIRE D'UN REMEDE &c.
une fuffifante provifion de cette plante ,
pour en pouvoir fournir à tous ceux qui en
auroient befoin. On en fit alors nombre
d'épreuves , qui ont toujours réuffi.


cette maladie , n'est autre chofe que du *Cinnabre*
natif & *factice* mêlé avec un peu de *Musc*.

Monsieur *Boerhave* n'a nulle confiance dans l'*Hé-*
patique ; Messieurs , *Sloane* & *Mead* la difent in-
faillible ; Monsieur *Default* regarde l'onguent mer-
curiel & la poudre de *Palmarius* comme les meil-
leurs remèdes qu'on a encore trouvé ; Monsieur
James confeille l'ufage de l'*Hépatique* , des *frictions*
mercurieles & du *Turbit minéral* enfemble.

Pour s'affurer de la cure ne feroit-il pas prudent
de fuivre d'abord la méthode de Monsieur *Mead* ,
& quelque tems après de paffer par les remèdes ,
felon la méthode établie par Monsieur *Chicoynneau*
c'est-à-dire , par *extinction* ? le *Turbit minéral* ne
feroit-il pas inutile après ce traitement ? c'est un
remède violent , & feu Monsieur *Hollins* Médecin
extraordinaire du Roi , d'*Angleterre* , qui avoit
reçu ce remède de Monsieur fon pere comme un
fecret contre la *Maladie Vénérienne* , m'a avoué
qu'il lui avoit fouvent manqué.

F I N.

Triche monida p. 177.



May 20 1897

